



DANUSZA
SKAŁSKIEGO

1. / Von Lindern Tournefortii
Alfatiours

2. / Kimaugel Cyf und vns
Indisfel Karitaten Cabinet

3. / Lafforibung der Dornen
nos ja in Galland in den
Horden zoffen.



*) . (*

TRIGÆ

Celeberrimorum in Academia Re-
gia Argentorat. Medicorum,

VIRIS

Nobilissimis, Amplissimis, Excel-
lentissimis atq; Experientissimis,

DN. JOH. VALENTINO
SCHEIDIO, Serenissimi Prin-
cipis Palatino Birckenfeldensis,
ut & Illustrissimi Comitis Hanoi-
ci Consiliario & Archiatro, Med.
Doct. & Profess. Publico Ordin.
Seniori, Capituli Thomani prae-
posuo venerando, Civitatis Re-
giae Argentoratensis Physico &
Collegii Medici DECANO Per-
petuo, Botanices Pbiliatro Sum-
mo.

) : (*

DN.

DN. JOH. BOECLERO,
*Med. & Philos. Doct. Botanic.
Chimicæ atq; reliquæ Mariæ
Medicæ Profess. Ordin. celeberrimo,
Pharmacopœorum Visitatori atq; Examinatori perpetuo,
ut & Ordin. Capitul. Roman. Canonico meritissimo.*

DN. MARCO MAPPO,
*Med. Doctor. atq; Patriæ Practico
experientissimo, felcissimo,
simulq; in Botanica Scientia versatissimo.*

Ut Et

Celeberrimis atq; Spectatissimis,
*in Arte Chimico Pharmaceutica aque
ac Botanica peritissimis,*

DN

VIRIS

DN. JOH. JACOB. SPIELMANN,
Pharmacopœo Argentor. exercitatissimo.

DN. JOH. HENRIC. KOENIG,
*Buxovillano, Illustriss. ac Celsissimi
Comitis Hanoici Pharmacopœo Primario,
Affini meo honoratissimo.*

DN. NICOL. STRUVIO,
*diversorum Magnatum ac Principum
ut & Universitatis Argentorat. Hortulano dexterrimo.*

PRÆCEPTORIBVS, PATRONIS,
FAUTORIBUS atq; AMICIS,


Libelli hujus Editionem, in Signum debitæ
Observantiæ, Veneratione
omni,

dicat ac offert

AUTOR.

):(3

J. N. J.



J. N. J.

PRAEFATIO

Benevole Lector,

Sisto Tibi libellum,
quem ex privatis lucubrationibus, in gratiam Botanophilorum, ut quibusvis sub Excursionibus Botanicis, Enchiri-

dii

dii loco, ejus Usus esse possit, conscripsi, eundemque in finem *Tournefortium Alsaticum* appellavi, cum Nomina, quæ in hoc opusculo continentur serieque alphabetica recensentur, maximam in partem ad ejus Mentem sint imposita, & quod Plantarum harum denominatarum nostris in Oris saltem sit familiaris Proventus; Neminem enim latet,

quanta prolixitate Studium Botanicum primis temporibus fuerit tractatum, & quâ cum confusione in faciendis Nominibus antequam Tournefortiano Lumine, Doctrina atq; Ordine Plantarum Progenies reficeretur, Pristina Aetas fuerit occupata. Impossibile enim erat, ad Eorum ductum, infinitorum sibi invicem non correspondentium à tot diversis Au-

tori-

toribus Synonimorum descriptorum Epitheta memoria complecti, multo minus sibi polliceri, ad quamnam generis Familiam, hæc vel illa plantula pertineat; nunc autem, *Norma Tournefortiana*, quam prolixè atque perspicue suis in Institutionibus Rei Herbariæ, nunquam satis laudandis delineavit, Via cuius patula est, modo paucis hac in re instru-

): (5

Ave

ctus sit confestim, quamvis (puta florentem) sibi obviam antehac minime cognitam ad suum genus atque speciem rite reducendi. Hanc ob causam, ne confusio Nominum in posterum amplius produceretur, Plantas singulis mensibus florentes, numero Alphabetico, simul & Idiomate gallico, latino ac germanico, annexo characterē atque loco natali,

anq;

anque sint perennes vel annuæ, præter titulum Casp. Bauhin. unicè Tournefortii nomine designavi, quo eo melior, facilior, ac delectabilior earum Impressio fieri possit, Doctrinam hancce cuivis Medico summe utilem addiscendi. Accipe itaque hoc meum Institutum atq; Laborem, eo quo Tibi offertur animo & si dignus videbitur ad Tuos usus impende, sic

vo-

* (.) *


volente DEO, successu
temporis, aliud Opusculum
de plantarum officinali-
um Viribus & Usu juris
sum facturum Vale dab.

Argyropol. é Museo
Calend. Decembr.
M DCC XXVII.



Tabula

Tabula generalis continens Florum differe-
ncias fundamentales.




Literarum designatarum Clavis.

- a Qui præter stamina s. capillamenta petala habet, vel majora vel minora, equalia aut inæqualia in involucrium seminum plane non desinentia, ut in bellide, faba, antirrhino &c.
- b Ubi nulla adsunt petala, sed totus vel ex staminibus aut capillamentis constat, ut in sparganio equiseti &c.
- c Qui flosculis & semiflosculis caret, sed vel unico aut pluribus petalis donatur, ut flos hyoscyami, Salvia, cerasi &c.
- d Qui componitur ex flosculis & semiflosculis, ut cyanus, dens leonis &c.
- e Qui unicum tantum habet petalum, ut campanula, belladonna, stramonium.
- f Qui pluribus gaudet petalis, ut ranunculus, geranium &c.
- g Qui ex plurimis flosculis, s. petalis fistulosis tenuibus dense positis, eodem calice prehensis compositus est, ut in Santolina, Nicotia &c.
- h Qui ex semiflosculis, dense in orbem positis & eodem calice comprehensis concinnatus est, ut in chondrilla, Scorzonera &c.
- i Qui ex duabus partibus confectus disco flosculoso & circumferentia seu Corona semiflosculosa, ut in Jacobæa bellide &c.
- k Qui campanæ vulgaris formam obtinet ut campanula convolvulus.

- l Cuius inferior pars tubulata, superior vero in eorum inversum infundibuli instar diducta est ut in symphyto, Jalapa valeriana.
- m Ubi petala, rota in modum posita sunt, ut in anagallide, borragine veronica blattaria &c.
- n Qui faciem emulam cuiusdam personæ habet vel rostrum animalis, rictu & labiis representat. ut Linaria antirrh. Orobanth.
- o Cuius pars inferior fistulosa, superior vero labiata est, labio vel unico vel gemino & pistillum in fructum abire solet, ut in bormino salvia.
- p Qui ex 4. petalis cruciatim dispositis constat, & cuius calix pari petalorum numero donatur, pistillumque in fructum abit, ut brassica, leucosium &c.
- q Cuius petala quaternum numerum vel non attingunt vel superant, & in orbem posita sunt, ut in chamæxerio ranunculo, pyrola rana morsu.
- r Cuius petala ex ipso calice tanquam e tubulo emergunt, uti est Linum lychnis caryophyllus &c.
- s Qui ex 6. petalis raro tribus constat, aut in 6. partes, ad lilii formam accedens secatur & cuius pistillum in capsulam tripartitam abire solet.
- t Qui constat ex petalis dissimilibus, vexillo, alis atque carina cujusque pistillum transit in fructum siliquosum, uti patet in piso, lathyro vicia &c.

- u Si os lateraque fundo magis pateant & acetabuli formam exhibent ut Malva.
 vv Si fundus tubulatus est & latera angusta sint, ut videre est in polygonato, cerinthe.
 x Si os augustius est ventre.
 y Qui é cono in tubum coarctatur.
 z Qui tubum non in conum inversum, sed in discum instar hypocrateræ explicatum habet ut primula veris, psyllium.
 (Notandum in super, si Icones Tabernemontani sint evolvendi, B. L. illam evolvat Editionem, qua ab Auctore Idiomate Germanico Basilea conscripta ac divulgata est.)



PLANTA.

Corylus sativa, fructu rotundo maximo T. s. Avellana Lugdunensis major Camer. Hort. Römische oder Italianische Haselnuss, Strauch mit der größten Frucht / in verschiedenen Gärten der Stadt und des Landes. Avellanier.

Cornus hortensis mas T. sive domestica fructu rubro oblongo acerbo, flore simplici rosaceo luteo, foliis virgæ sanguineæ haud dissimilibus, zahmer Weisch, Kirschbaum Icon. Tab. p. 1459. Cornouiller mâle ou Cornier domestique, aller Orten in Gärten.

Cornus hortensis mas fructu ceracoloze T. gelber Weisch, Kirschbaum / cum præcedent.

Cornus hortensis mas, fructu albo T. weißer Weisch, Kirschbaum / in unterschiedlichen Gärten der Stadt.

Cornus sylvestris mas, T. s. spontanea, Eörnerbaum / wilder Weisch, Kirschbaum / Cornier Sauvage, in wilden Bergen und Hecken. Icon. Clus. hist. 13.

Helleborus niger fetidus, T. flore rosaceo herbaceo radice tenui nigra, foliis angustioribus profunde incisiss serratis, s. Helleboraster maximus flore & semine prægnans obs. & Icon. Lob. Lausttraut. Ellebore noir bastard ou puant. perenn.

Leucojum bulbosum, cum unico flore simplici liliaceo rarius bino pendulo, foliis oblongis splendentibus, s. Narcisso *Leucojum vulgare*, T. Dornungs, Blume in schattichten bergichten



bergichten Orten / sonst hin und wieder in Gärten.
Icon. 1. Tab. p. 1005. Perce-nege. perenn.

Leucojum bulbosum trifolium minus
præcox, tribus petalis albis minoribus cin-
gentibus, terna minora herbacei coloris,
foliis angustioribus pallide viridibus, s.
Narcisso leucojum minus trifolium T. Schnee-
Tröpflein / petite perle. ge. Icon. Clus. hist. p.
169. hin und wieder in Gärten.

MENSIS

MARTIVS & APRILIS.

B*ellis Sylvestris minor*, T. flore prorsus albo
composito radiato, foliis laciniatis, ra-
dice tenui, Pasquete ou petite marguerite. Kleine
wilde Maiglöckchen oder Zitter-Röschlein / hin und wieder
auf Wiesen. Icon. Tab. p. 708. perenn.
Eadem flore purpur.

Brassica campestris perfoliata flore albo T.
simplici cruciformi, foliis pallide viridibus,
corniculis longis quadrangulis. Durchwachs
mit Steckrüben-Blättern durchwachsender Feld-Kohl /
in denen Frucht-Feldern und andern sandigten Orten.
Icon. 2. Tab. p. 1140. ann. Chou sauvage.

Bursa pastoris capsula brevi cordata,
foliis sinuatis flosculis albis simplicibus cru-
ciformib. s. *Bursa pastoris major folio sinuato*.
T. Groß Täschel-Kraut / Tabouret ou Bourle à
berger, fast aller Orten. Icon. Tab. p. 512. ann.
Eadem



Eadem folio non sinuato T. atrovirente
ad radicem longis pediculis donatis capsulis
cordatis, groß Täschelkraut mit ungetriebten Blät-
tern / juxta vias aliusque in cultis & incultis
locis, ann.

Bursa pastoris media T. s. minor Tab.
Klein Täschelkraut in sandigen und dürrem Erdreich.
Icon. Tab. p. 512. ann.

*Buxus arborescens foliis pictis per limbum au-
reis* T. floribus imperfectis apetalis luteis
gemahlter Buchs. Buis peinte in Gärten. perenn.

Buxus arborescens T. floribus luteis im-
perfectis apetalis foliis oblongo rotundis
atrovirentibus & splendentibus. Buchsbaum /
Buis aller Orten in Gärten. Icon. 1. Tab. p. 1464.
perenn.

Buxus foliis rotundioribus, T. s. vulgarissi-
ma gemeiner Schnitt, oder Garten-Buchs / Buis
à pazerre. Icon. 2. Tab. p. 1464. perenn.

*Chelidonium minus foliis inferiori-
bus subrotundis, superioribus acuminatis*
pinguib. flore luteo simpl. rosaceo radice
tuberosa s. *Ranunculus vernus rotundifolius mi-
nor*, T. Feigwarzen oder klein Schöllkraut / auf
feuchten Orten. Couillons des prestre ou petite
esclere. Icon. Tab. p. 1134. perenn.

*Cupressus meta in fastigium convoluta, qua
femina Plinii*, T. perpetua fronde virens flo-
ribus amentac. foliis sabinæ æmulis atrovi-
rentibus, Cypressen in denen Gärten / le Cyprés
femelle. Icon. Tab. p. 1353. Cupressus

Cupressus vamos extra se spargens quæ Mas
Plin. T. Icon. Epit. Matth. p. 52. le Cyprés
mâle. cum præcedent.

Equisetum arvense longioribus setis, T.
floribus amentaceis s. Hippuris arvensis ma-
jor, gemein Ragenwadel oder Rannentrant / in de-
nen Gersten- und Haber-Feldern. Icon. 3. Tab.
p. 568. queue de Cheval. perenn.

*Fumaria radice amara tuberosa & ca-
va major*, flore simpl. purpurascence poly-
petalo papilionaceo, foliis pallide viridibus
aquileg. similib. s. *Fumaria bulbosa radice cava
major*, flore rubro dilutior T. vorhe grosse
Holzwurzel in denen Hecken und Bergen / allhier in
Gärten. Icon. 1. Tab. p. 92. perenn. Racme creuse.
Eadem flore albo T. weisse Holzwurzel.

Fumaria tuberosa major, radice non
cava, folio striato & calcari cristato, flore
purpureo simpl. polypetalo papilionaceo s.
Fumaria bulbosa radice non cava major, T. Hol-
zwurzel mit gangen Wurzeln in bergichten Büschen.
Icon. I. B. 3. 204.

*Gramen sylvaticum pilosum vel hir-
sutum latifolium majus* C. B. s. *Funcus
nemorosus latifolius major* T. haaricht Waldgras
in Wäldern und Büschen. Icon. 4. Tab. p. 537.

Helleborus niger hortensis, flore viridi, T.
simplici rotaceo, foliis atroviridibus digi-
tatis circumquaque serratis, schwarz Nies-
wurzel / hin und wieder in Gärten / perenn.
Icon.

Icon. 1. Tab. p. 1099. Elleboire noire à fleur
verd,

Helleborus niger tenuifolius, flore
buphtalmi luteo simplici rosaceo, alius hel-
leborus Hippocratis s. *Ranunculus feniculaceis
foliis hellebori nigri radice* T. kleine Nieswurzel mit
Fenchelblättern / gelbe Schnee-Köpflein. Icon. Tab.
p. 1097. perenn. Hellebore noir d'Hippocrate.

Hyacinthus vernus dumetorum, stel-
laris germanicus bitolius, flore simpl. coc-
ruleo lilaceo radice bulbosa, s. *Ornithoga-
lum bifolium germanicum coeruleum*, T. blaue
Hecken- Sternblümlein / Bauren-Hyacinthen /
Icon. Tab. p. 1015. perenn.

Laureola folio deciduo, flore simpl.
monopetalo intundibuliformi purpureo
quadripartito, s. *Thymelæa lauri folio deciduo
flore femina*, T. Laureole, Seidelbast / Kellerhals /
Brennwarz perenn. Icon. Tab. p. 1482. in
Wäldern und Büschen.

Eadem flore albo.

*Ornithogalum bulbosum flore simplici
luteo lilaceo foliis angustis linea lactea nota-
tis* s. *Ornithogalum luteum* T. große gelbe Feld-Zwie-
bel Icon. 1. Tab. p. 1020. perenn.

*Ornithogalum bulbosum arvense lute-
um ramosum præcedentis est varietas*. Weede
auf Aeckern und in Weinbergen.

Ornithogalum bulbosum luteum minus T. an-
gustifolium, kleine gelbe Feld-Zwiebel. Icon.

✱) : (✱
Clus. hist. sub nomine Ornithogol. panon.
luteo flore p. 189. perenn.

Populus alba majoribus foliis T. s. foliis vir-
gineis inferne albicantibus ac lanuginosis
floribus amentaceis weißer Pappelbaum oder Pap-
pelweiden in denen Hecken und Zäunen an den Flü-
ßen. Peuplier blanc Ic. Tab. 1. p. 1392.

Populus alba minoribus foliis T. cum præ-
cedente.

Populus nigra T. s. officinar. foliis hæde-
raccis per ambitum serratis, hyeme deciduis
florib. amentaceis, fructu racemoso, schwarz
Pappelbaum/ an denen Wassergräben Peuplier noir.

Populus tremula T. s. sterilis, folio rotun-
diore angulosoque punctum albis notis con-
sperso, tenuique pediculo appento continuo
fere se movente, Aspen oder Zitter-Baum in
feuchten Wäldern. Niesle ou Tremble Ic. 3. Tab.
p. 1392.

Primula veris pratensis, flore simpl. mo-
nopedalo hypocrateriformi & multifido
luteo, folio viridi rugoso, radice tenui can-
dicante fibrosa s. *Primula veris odorata flore*
simplici T. Himmelschlüssel mit wohlriechenden Blü-
men auf den Wiesen Ic. Tab. p. 699. perenn. Pri-
me vere.

Primula veris sylvatica major, floribus
ex singularibus pediculis majoribus simpli-
cibus pallide luteis monopetalis hypocra-
teriformibus, folijs latioribus rugosis & in
caecum;

✱) : (✱
caecumine rotundioribus, radice crassiore
fibrosa, s. *Primula veris pallido flore elatior*, T.
Walde Himmelschlüssel ohne Geruch. Icon. 4. Tab.
p. 700. perenn. Primevere sauvage,

Ranunculus nemorosus baccifer Mu-
schatellina dictus s. *Muschatellina foliis fuma-
rie bulbosæ*. T. odoratis flore herbido simpl.
monopedalo rotato & multifido, radicle
oblonga alba tuberosa, Bisam Hahnenfuß/
oder kleinste Holzwur. Icon. 11. Tab. p. 94.
perenn. Petite Musquée. in Wäldern.

Saxifraga rotundifolia aurea hirsuta,
flore monopetalo simplici rotato & multi-
fido, luteo calicis experte radice filamen-
tola, s. *Chrysosplenium foliis amplioribus auricu-
latis*, T. Gulden Nüsteraut. Icon. Tab. p. 1224.
in feuchten Orten / allhier in Gärten. Herbe St.
Christoffe. perenn.

Solanum quadrifolium nigra bacca
flore herbaceo simplici cruciformi radice
tenui multifida, s. *Herba Paris*, T. Einbeer in
buschichten Hecken und Wäldern. Raitin de Renard.
Icon. Tab. p. 1095. perenn.

Symphytum maculosum latifolium
pulmonaria dictum, flore simplici mono-
petalo infundibuliformi ex rubro coeruleo.
folio integro oblongo maculoso. s. *Pulmo-
naria Itatorum ad buglossum accedens*. T. Icon.
2. Tab. p. 948. Hirschmangold / gefleckte Lungen-
traut. Pulmonaire maculée ou marbrée, in duncten
bergichten Wäldern. perenn. Sym-

Symphytum non maculosum foliis non asperis, flore simplici monopetalo infundibuli formi rubente coerulesco, s. *Pulmonaria folio non maculoso*, T. Icon 2 Clus. hist. CLXIX. Hirschmangold ohne Flecken bey dem Vorhergehenden. Pulmonaire sans marque. perenn.

Trifolium hepaticum flore coerulesco simplici rosaceo radice nigra fibrosa, folius trilobatis, s. *Ranunculus tridentatus vernus* flore simplici coerulesco, T. Blau gulden oder Edel-Lebertraut in bergichten Orten. Icon. 1. Tab. p. 911. Hepatique bleu. perenn.

Trifolium hepaticum flore simplici coerulesco, s. *Ranunculus tridentatus vernus* flore simplici purpureo, T. roth gulden Lebertraut. Icon. 2. Tab. p. 911. Hepatique rouge. perenn.

Trifolium hepaticum, flore simplici albo rosaceo, s. *Ranunculus tridentatus vernus* flore simplici albo, T. weiz gulden Lebertraut. perenn.

Tussilago major Petasites dicta flore flosculoso tubrubente, folio rotundiore altera parte incano, radice longa crassa amara s. *Petasites major & vulgaris*, T. Pestilenzwurzel / Kospapeln / an sumpfichten und feuchten Orten. Icon. Tab. 1316. perenn. Petasite ou herbe aux teigneux.

Tussilago vulgaris T. flore composito radiato luteo ante folia erumpente, folius superne viridibus inferne subalbidis angulosis Duff. arsch / Kospub / auf feuchten Gruch. Aeckern und

und andern wässrichen Orten. Icon. Tab. 1316. perenn. Tussilage ou Pas d'asne.

Viola rotundifol. martia flore odoro purpureo polypetalo, s. *Viola martia purpurea* flore simplici odoro, T. wohlriechende Werg. Biolen in grasichten Orten. Icon. 1. Tab. p. 680. Violette de mars.

Eadem flore albo.

Viola rotundif. martia inodora sylvestr. flore coerulesco in cacumine semina ferens, s. *Viola martia inodora sylvestr.* Hundes. Biolen. Icon. 5. Tab. p. 681.

Eadem flore albo.

Viola Sylvestris inodora, T. foliis mucronatis oblongis & strictioribus flore coerulesco polypetalo anotalo papilionacei floris amulo. Wald. Biolen mit ablangen Blättern und ohne Geruch / in Wäldern und Büschen. perenn. Icon. 5. Tab. p. 682. Violette de bois.

Ulmus campestris & Theophrasti. T. folio lato scabro leviter serrato atque oblongo, floribus monopetalis campaniformibus, Rossbaum in feuchten tiefen Wäldern / Orme. Icon. Tab. p. 1394.

Acer montanum candidum, T. foliis inferne candicantibus latifoliis pediculis rubentibus annexis floribus rosaceis ex viridi flave scentibus, fructu alato gemello. Ahorn in hohen Wäldern. Erable. Icon. Clus. hist. p. 10.

MENSIS
APRILIS & MAJVS.

Acer campestre & minus, T. folius minoribus laevibus laciniatis seu angulosis floribus ex viridi flavescentibus rosaceis fructu gemino alato. Wässholder. Plane. in Büschen. Icon. Tab. 2. p. 1386.

Acetosa vulgaris pratensis folio oblongo, floribus stamineis in spicam congestis, s. Acetosa pratensis. T. Wiesenampfer. Icon. 1. Tab. p. 826. perenn. Oseille ou tureille.

Acetosa pratensis, folio crispo oblongo, T. Wiesenampfer mit langen krausen Blättern. Icon. 4. Tab. p. 827. perenn. Oseille à feuilles frises.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis, T. floribus amentaceis, fructus quamoso, Erlbaum / Aunée, an denen Wässern. Icon. Tab. p. 1395.

Alfne chamædryfolia serrata, flosculis monopetalis coeruleis multifidis rotatis longis pediculis insidentibus, s. Veronica flosculis pediculis oblongis insidentibus chamædryfolia. T. Ehrenpreß mit Gamenderlein-Blättern / hin und wieder auf den Frucht-Äckern. Icon. 6. Tab. p. 1089. ann.

Eadem flore albo.

Alfne hæderulæ folio hirsuto, flosculis monopetalis coeruleis rotatis, s. Veronica cymbalaria folio verna, T. Acker-Hünerrdarm mit Eyheublättern. Icon. 5. Tab. p. 1088. ann.

Alfne

Alfne hirsuta magno flore simplici rosaceo polypetalo valculo corniculato, Caryophyllus holosteus dictus, s. Myosotis arvensis subhirsuta, flore majore, T. weiß Degelengraß mit harichten Blättern / hin und wieder auf grasichten Hübeln und Aecken. Icon. Tab. p. 543. perenn.

Alfne triphyllos, folio profunde secto flore violaceo monopetalo rotato, s. Veronica verna trifido vel quinquifido folio, T. Hünerroute / Händleintraut / auf gebauten Frucht-Äckern. Icon. 4. Tab. p. 1088. ann.

Alfne verna glabro flosculis albis umbellatis. T. s. Caryophyllus arvensis umbellatus folio glabro simplici flore rosaceo albo, weiß Acker-Degelengraß / in denen Frucht-Äckern. Icon. 2. Tab. p. 543. ann.

Alfne veronica foliis hirsutis flosculis monopetalis coeruleis rotatis cauliculis adhaerentibus, s. Veronica flosculis cauliculis adhaerentibus, T. kleine falsche Hünerrdarm / kleiner Acker-Ehrenpreß. Icon. 7. Tab. p. 1089. ann.

Alfne vulgaris flore albo, rosaceo foliis ex adverso binis, s. Alfne media. 1. gemein Hünerrdarm oder Vogeltraut. Icon. 3. Tab. p. 1087. ann. Morgeline.

Amygdalus sativa, T. fructu majori dulci foliis perlico similibus, flore simplici rosaceo suave rubente, süßer Mandelbaum / Aman-der doux. Icon. Tab. p. 1410. perenn.

Idem

Idem fructu amaro, T. Amandier amer.
Asarum vulgare, T. flore apetalò folio subrotundo pingui atrovirente calice tripartito, Haselwurz / in schattichten Hölzern. Icon. Tab. p. 1129. perenn. Hard sauvage.

Caltha palustris flore aureo rosaceo polypetalò folio subrotundo radice alba subamara, s. *Populago flore majore*, T. Dotterblum / auf feuchten Wiesen und Rändern der Wasser. Icon. 1. Tab. p. 1128. perenn. Peuplier.

Caryophyllata flore parvo luteo rosaceo polypetalò, folus pinnatis radice tenui subrufo bene spirante, s. *Caryophyllata*, T. Benedikten oder Wergwurz. Icon. 1. Tab. p. 326. perenn. Benoite.

Caryophyllata aquatica flore nutante, T. purpuro pallescente rosaceo polypetalò radice minus fibrosa purpurascente amari uscula, Wasser-Benediktenkraut mit hangenden Blumen / auf hohen graslichten Bergen. Icon. 2. Tab. p. 326. perenn. Benoite aquatique.

Caryophyllus arvensis glaber, flore majore albo simplici rosaceo, folio gramineo rigido, longiore pediculo gaudente, s. *Alfine pratensis* gramineo folio ampliore, T. weißes Rägelein oder Blumengras / in Hölzern und Büschen. Icon. 1. Tab. p. 542. perenn.

Caryophyllus glaber arvensis, flore minore albo simpl. rosaceo, s. *Alfine pratensis* gramineo folio angustiore, T. klein Blumengras in denen Hecken. Icon. 2. Tab. perenn. Cera-

Cerasus major ac sylvestris fructu subdulci nigro coeruleo inficiente, T. flore albo simplici rosaceo, süßer wilder schwarzer Kirschbaum / in Hölzern und Büschen. Icon. 1. Tab. p. 1400. Merisier ou Cerisier sauvage.

Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli, T. nigro minore, schwarze Vogelkirschen / in Wäldern. Icon. 11. Tab. p. 1401. Merisier noir, ou Bois ou Sainte Lucie.

Cerasus pumila, s. *Chamaecerasus Clusii* fructu rubro, kleine saure wilde Kirschen / Erdwengel / in hohen Wäldern und Gebirgen. Icon. 12. Tab. p. 1401. Cerisier nain ou precoce.

Chamaedrys spuria major pratensis angustifolia, flore spicato simplici monopetalò unilabiato coeruleo facie Teucrit, s. *Chamaedrys frutescens Teucrium vulgo*, T. groß braun Wandlerlin. Icon. 2. Tab. p. 771. ann.

Clematis daphnoides minor, flore coeruleo simplici monopetalò infundibuliformi & multifido, s. *Pervinca vulgaris angustifolia minor*, T. Smingrün / Kränlein oder Toddenkraut / hin und wieder in Hecken und Bäumen. Pervenche. Icon. 1. Tab. p. 1270. perenn.

Cyperoides nigro luteum vernum majus floribus apetalis stamineis, T. in spicam congestis, s. *Graminis nigro lutei verni* varietas major IB. 2. 494. auf durren rauhen Orten. perenn.

Cyperoides nigro luteum vernum minus, T. s. *Graminis nigro lutei verni* varietas minor, I. B. 2. 494. Denz

Dens Leonis folio latiore, T. flore com-
posito luteo semistofculoso alias *Taraxacum*
officinar. Röhrlentkraut / Löwenzahn / auf allen
grasichten Orten. Icon. 1. Tab. p. 481. Pissen lit
ou dent de Lion. perenn.

Fragaria sterilis, T. s. *fragaria* non fra-
gifera flore simpl. albo rosaceo, fol. hirsut.
falsch Erdbeerkraut in sonnenreichen Bergen. perenn.
Icon. Lob. 698.

Geranium columbinum malvaceum
minus, folio rotundo protunde sinuato &
crenato flore simplici purpureo rosaceo. s.
Geranium folio malve rotundo, T. Storchenschnabel /
Zaubensfuß. Icon. 2. Tab. p. 123. Bec de Gue. ann.

Gramen exile hirsutum cyperoides
floribus stamineis in spicam congestis, s.
Juncus villosus capitulis psyllis sublaevigatis, T.
Haricht Cypergras / auf durren grasichten Dertern.
Icon. 2. Tab. p. 532. perenn.

Gramen montanum caryophyllatum
spica varia, s. *Cyperoides spicis variis nemorense*.
T. Melckengras in Büschen und Wäldern. Icon.
C. B. prodr. 2. p. 9. perenn.

Grossularia vulgarissima, foliis hirsutis
& late virentibus floribus rosaceis subluteis,
s. *Grossularia simplici acino vel spinosa sylvestris*,
T. wilde Stachelbeern. Icon. Tab. p. 1491. Gro-
sille sauvage. perenn.

Hedera terrestris major repens, flore
simplici purpureo monopetalo labiato folio
subro-

subrotundo, s. *Calamintha humilior folio rotun-
diore*, T. Donnerreben / Gundarmann. Icon. 2.
Tab. p. 1280. Lierre terrestre. perenn.

Eadem minor Icon. 2. Tab. p. 1280. perenn.

Eadem flore albo. Sed rarius.

Hesperis sepiaaria allium redolens, T. flore
albo simplici cruciformi, folio lato & per
ambitum serrato, radice longiuscula, s. Al-
liaria. Knoblauchkraut / hin und wieder in dunklen
Bäumen. Icon. Tab. 1144. Alliaire. ann.

Lamium alba linea notatum, T. flore pur-
pureo simplici monopetalo labiato, fo-
lio oblongo, radice fibrosa, todte Nesseln mit
bezeichneten Blättern / an den Bäumen. Icon. 1.
Tab. p. 923. Ortie morte. ann.

Idem flore albo.

Lamium foliis caulem ambientibus minus, T.
flore purpureo simplici monopetalo labiato,
todte Ackerneßeln / auf den Saamsfeldern. Icon.
12. Tab. p. 1090. ann.

Idem flore albo.

*Lamium folio oblongo non maculato, flore ru-
bro*, T. simplici monopetalo labiato, non
foetens. Taube Nesseln mit ungefleckten Blättern /
an den Bäumen. Icon. 1. Tab. p. 923. perenn.

Lamium folio oblongo luteum, s.
Galeopsis vel Urtica iners flore luteo, T. gelbe
taube Nesseln / in Hölzern und an den Bäumen.
Ortie jaune. Icon. Tab. 923. perenn.

Lamium non foetens, flore albo mo-
nope-

nopetalo labiato, folio oblongo non maculato, s. *Lamium vulgare album*, T. weiße todte Messen / an denen Wegen und Zäunen. Icon. 1. Tab. p. 923. ann.

Leucojum luteum vulgare, T. flore simplici cruciformi, folio viridi, s. Keiri officin. gelbe gemeine Negelblumen / hin und wieder in Gärten Icon. 1. Tab. p. 688, Girostier ou Violier jaune, perenn.

Leucojum sylvestre angustifolium, flore luteo minore inodoro simplici cruciformi, radice alba fibrosa, s. *Hesperis leucosi* folio non serrato, siliqua quadrangula, T. gelbe Waldviol / hin und wieder in Gärten und auf den Mauren. Girostier sauvage. ann. Ic. 4. Tab. p. 693.

Mercurialis montana testiculata T. s. repens mas, floribus apetalis. Waldbineltraut / Männlein in Wäldern. Ic. Matth. Epit. p. 998. Mercuriale sauvage.

Mercurialis montana spicata T. repens foemina. Waldbingeltraut Weiblein. Ic. Matth. Epit. p. 999.

Muscus squamo s. vulgaris repens clavatus T. s. Lycopod Tab. s. officin. Beerlapp / Wollstauden p. 1199.

Morus fructu nigro T. flore subluteo amentaceo conglomerato. Maulbeerbaum mit rother Frucht. Meurier, hin und wieder in Gärten. Icon. p. 1390.

Eadem fructu albo. Maulbeerbaum mit weißer Frucht.

Napus

Napus sativa T. flore perfecto simplici luteo cruciformi, radice rapacea alba Saatruben / Steckruben. Naveau Ic. Matth. Epit. p. 222. ann.

Napus sylvestris T. flore perfecto simplici luteo cruciformi Rubesaat. Icon. Fuchs. hist. plant. Naveau sauvage. ann.

Nasturtium, petraeum foliis bursa pastoris T. incis, flore perfecto simplici cruciformi, capsulis latis. Ic. Tab. p. 842. ann. Stenktresien.

Orobis sylvaticus vernus, flore purpureo perfecto simplici papilionaceo, siliquis erectis, foliis latioribus pinnatis s. *Orobis sylvaticus purpureus vernus* T. Ic. i. Clus hist. sub homin. orob. pannon p. ccxxx. Orobe. perenn.

Perchepier anglorum, floribus apetalis subviridibus s. *Alchimilla montana minima* Col p. i. 146. Tab. Scandix minore. Ic. 2. p. 288.

Persica molli carne, & vulgaris viridis & alba T. s. floribus rosaceis incarnatis, foliis oblongis serratis amaris, gemetner Pfirsichbaum. Pécher de montagne. Ic. 1. Tab. p. 1408.

Prunus sylvestris T. s. *Acacia germanica* flore simplici rosaceo albo fructu nigro Schlehdorn Prunier sauvage. Icon. 1. Tab. p. 1405.

Pulsatilla folio crassiore & majore flore T. purpureo simplici rosaceo, radice ob-

B 2

lon.

longa & fibrosa, gemetne blaue Ruchenschelle/
oder Osterblum / hin und wieder auf grasigten dör-
ren Orten lc. i. Tab. p. 80. Coquelurde perenn.

Eadem flore rubro obtuso T. Ruchenschelle
mit röthlichen Blumen lc. 2. Tab. p. 80. Coque-
lourde à fleur rouge.

Eadem flore albo T. potius cinereo weisse
Ruchenschelle. Coquelourde à fleur blancheatre.

Quinquefolium majus repens T. s. vulgare
floribus rosaceis, auri æmulis radice sub-
rubra oblonga, funff Fingerkraut. quinte feuille.
lc. 4. Tab. p. 351. perenn.

Quinquefolium minus repens lanuginosum lu-
teum T. klein kriechend funff Fingerkraut / hin und
wieder an den Strassen und Hügelcn lc. 13. Tab. p.
354. petite quinte feuille. perenn.

Ranunculus nemorosus; flore albo ma-
jore simplici rosaceo s. *Ranunculus phragmites*
albus vernus T. wilder weisser Wald oder Hecken-
Hahnen-Fuß lc. 8. Tab. p. 109. Renoncule des
bois à fleur blancheatre. perenn.

Ranunculus nemorosus flore purpureo
vernus s. *Ranunculus phragmites purpureus ver-*
nus T. rother wilder Wald- oder Heck- Hahnen-Fuß/
lc. 9. Tab. p. 109. perenn. Renoncule des bois
à fleur purpurin.

Ranunculus nemorosus vel sylvaticus,
foliis interioribus rotundis, superioribus flo-
ribus proximis, valde angustis, laciniis dis-
sectis luteis, radice subdulci s. *Ranunculus ne-*

VIIT.

morosus folio rotundo T. Gold- gelber Wald-Hah-
nen-Fuß. Renoncule des bois à feuilles rondes. lc. 2.
Tab. 117. perenn.

Ranunculus nemorosus vernus, flore
luteo minore, modo simplici modo gemel-
lo s. *Ranunculus nemorosus flore luteo* T. gelber wils-
der Hahnen-Fuß. lc. 7. Tab. p. 108. perenn. Re-
noncule des bois jaune.

Ranunculus pratensis erectus non re-
pens, flore luteo simplici, folio Napello si-
mili, macula nigra notato, radice acris s.
Ranunculus pratensis erectus acris T. brennender
weisen Hahnen-Fuß. lc. 2. Tab. p. 107. Renon-
cule des prez piquant perenn.

Salix latifolia rotunda T. vñ caprea rö-
tundi folia foliis inferne hirsutis Palm-, oder
weiß Weiden. lc. 3. Tab. p. 1452.

Rapa sylvestris s. Rapum sylvestre non
bulbosum, flore simplici cruciformi luteo,
Weissamen. Icon. Matth. epit. p. 220. ann. co-
piose seritur nostris in agris ad exprimen-
dum ejus oleum.

Sambucus racemosa rubra T. 2. montana
acinis rubris, floribus ex albido flavescenti-
bus monopetalis, rotatis multifidis Hirsch-
holder in feuchten dunklen Wäldern. lc. 3. Tab.
p. 1440. Sureau de cerf. perenn.

Saxifraga alba rotundifolia T. flore albo
rosaceo polypetalo foliis subrotundis pin-
guibus radice granulosa. weisser Strauch auf

rockenen Wiesen und aufgeworffenen Hügeln. Saxi-
frage blanc. perenn. Icon. 1. Tab. p. 1222.

Sedum tridactylites tectorum, flore
albo simplici rosaceo, folio rutaceo s. Saxi-
fraga verna annua humilior T. 1088. sub nomine
traut / Bröschtraut auf Zäthern und abgeworffenen
alten Mauern lc. 2. Tab. p. 1088. sub nomine
alsines petreae rubr.

Sinapi cruce folio T. laciniato sylvestre,
flore simplici cruciformi siliquoso luteo
wilder Senf. Moutarde sauvage. lc. 1. Tab. p. 858.
ann.

Taxus T. floribus amentaceis lu-
teis, foliis abietis similibus pinnatis, fructu
rubro glutinoso, Zapfbaum / Jvenbaum. Icon.
Matth. Epit. 840. perenn. lf. in hohen Wäldern.

Thlaspi arvense perfoliatum majus T.
flosculis albis cruciformibus, grosser Bauren-
Senf mit Durchwachs. Blättern auf steinichten Ae-
dern und in Weinbergen. Thlaspi lc. 9. Tab. p.
851. cujus nomen Thlaspi oleraceum. ann.

Thlaspi arvense perfoliatum minus T. flo-
sculis albis cruciformibus, kleinster Bauren-
Senf mit Durchwachs. Blättern/beym vorherge-
henden. lc. 19. Tab. p. 854. ann.

Tithymalus cyparissias T. vel Cupressinus, s.
Esula officinar. foliis cupressi, floribus lu-
teis monopetalis campaniformibus. Cypres-
sen Wolffe / Milch / auf ungebauten Derrern. Icon.
Tab. 12. p. 990. Titimale usuelle. perenn.

Tithy-

Tithymalus cyparissias, foliis punctis
croceis notatus s. Esula scabiosa. Wolfsmilch/
mit punctirten Blättern / prioris est degenera-
tio: enim ex eadem radice nasci solet. Bey der
vorhergehenden Titimale tacheté. perenn.

Trifolium acetosum aut *acetosella* of-
ficinarum, flore ex albo purpurascente mo-
nopetalo campaniformi multifido s. Oxy-
flore albo & purpurascente T. Sautflee Buch-
ampfer / an feuchten schattichten Derrern / lc. 1.
Tab. p. 910. perenn. pain à Coucu.

Turritis vulgaris ramosa T. s. Bursa pa-
storis vel pilosella siliquosa, foliis majoribus
hin und wieder auf den Aeckern. lc. J B. 2 870.

Valeriana palustris major T. foliis latioribus
laciniatis floribus monopetalis infundibu-
liform. albicantibus divisis, radice crassa sub
flava, odoris gravis, groß wilder Baldrian oder
Ragewurz in feuchten Orten. lc. 2. Tab. p. 454.
Valeriane perenn.

Valeriana palustris minor T. radice albi-
cante fibrosa kleiner Baldrian an feuchten Orten.
petite Valeriane. perenn. lc. 4. Tab. p. 455.

Valerianella arvensis praecox humilis semine
compresso T. flore simplici albo monopeta-
lo infundibuliformi, folio integro, aliis La-
tuca agnina. Lämmer Lattich auff den Reiten der
Acker. Icon. 1. Tab. p. 460. ann. Maché.

Valerianella arvensis praecox humilis foliis ser-
ratim

ratis T. s. *Lactuca agnina* s. *valerianella* foliis serratis Ray. hist. 392. cum præced.

Valerianella arvensis serotina altior, semine turgidiori T. flosculis albis monopetalis infundibuliform. multifidis parvis, später eämmer. Latuch auf denen brachtlegenden Feldern. Moris. Umb. cum præced.

Viola bicolor arvensis T. flore candido & luteo simplici polypetalo anomalo papilionacei floris amulo wild. Acker Freysamen-Kraut in denen Frucht-Feldern. Ic. 3. Tab. p. 690.

Eadem flore coerulco & luteo. T.

Eadem flore coeruleo & candid. T.

MENSIS

MAJVS. & JUNIVS.

Abies alba s. foemina quæ fragilis, floribus apetalis in julos congestis foliis planis mucronatis pungentibus, superne viridibus interne cineraceis. Sabin weis Thannenbaum in hohen Wäldern Ic. 1 Tab. p. 1347.

Abies mas conis sursum spectantibus folis pectinatum dispositis utrinque virentibus s. *Abies Taxi folio*, fructu sursum spectante T weis Thanne Mäntlein. Sabin male / bey der vorhr. gehenden. Icon. Clus. hist. 34.

Abies picea rubra, foliis nigrioribus ac lævioribus mollioribusque ac minus acule-

aculeatis s. *Abies tenuiore folio fructu deorsum inflexo* T. roth Thannenbaum/wie die vorigen. Pesse. Ic. 2. Tab. p. 1347.

Acetosa arvensis lanceolata T. repens, foliis pingui usculis hammaris lævibus. flosculis apetalis rubentibus, fleiner Sauerkampfer/auf durren grasichten Orten. petite Ozeille. Ic. 5. Tab. p. 827. perenn.

Aconitum racemosum bacciferum, flore simplici rosaceo s. folio dissecto s. *Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa* T. Christoffels. Kraut in Wäldern Ic. Tab. p. 1163. herbe de Saint Christoffe. perenn.

Acorus verus s. *Calamus*, aromaticus, flosculis luteis cruciformibus, radice geniculata acri atque amaricante, foris ex flavo rufescente, intus alba fungosa, foliis graminis. Ackerwurk. Callmus hin und wieder in Gräben und Fischpfuden. Ic. Tab. p. 1031. perenn. *Acorus*.

Allium sylvestre, foliis binis latis splendentibus flore albo liliaceo s. *Allium sylvestre latifol.* T. Hecken Knoblauch. Ail sauvage ou Aulx d'ours. Ic. Tab. p. 875. perenn.

Alnus nigra baccifera, bacca nigra, foliis latis subrotundis, floribus rosaceis albis. s. *Frangula* T. Zapfen-Holz / Saulbaum in Hecken und Hölzern. Ic. Tab. p. 1461. Aune noir. perenn.

Alfne palustris uliginosis locis proveniens, folio oblongo, floribus albis rosaceis

faceis s. *Alfine aquatica media* T. Wasser, oder Brunn, Hinderdarm / an denen Quell, Wassern. Ic. 8. Tab. p. 1089. perenn. Morgeline.

Alfine spargula dicta major T. flore albo simplici rosaceo Spurey in sachtigen Feldern. ann. Icon. J. B. 13. 3. 722.

Alfine palustris portulacæ aquaticæ similis Raj. hist. 1035. potius serpillifolia. Icon. Bocc. rar. plant 48. T. an hellen Wasser, Wäldlein.

Anagallis flore coerulescens T. simplici monopetalo multifido, foliis ex adverso binis vel ternis nascentibus, blauer Gauchheil in Gärten und auff den Aedern. Ic. 2. Tab. p. 1092. Mouron, femelle. ann.

Anagallis flore phæniceo T. rother Gauchheil. Ic. 1. Tab. p. 1092. Mouron mâle ann.

Eadem flore carneo & albo.

Anagallis lutea nemorum, flore simplici monopetalo rotato & multifido s. *Lysimachia humifusa folio sub rotundo acuminato flore luteo* T. gelber Gauchheil in feuchten und finstern Wäldern. Icon. 3. Tab. 1092. Mouron à fleur de jaune, ann.

Anemone sylvestris major, flore albo simplici rosaceo s. *Anemone sylvestris alba major* T. grosse weisse wilde Anemonien Köpflein. Ic. 1. Tab. p. 73. perenn. Anemone sauvage.

Anethum hortense T. s. vulgare, foliis foeniculaceis, floribus luteis rosaceis umbellatis

tis suaveolentibus, Dillen / Till. auf den Gärtners Feldern und in Gärten. Icon. Tab. p. 165. perenn. Anet.

Antirrhinum arvense majus T. foliis angustioribus, flosculis monopetalis anomalis tubulatis perforatis, obsolete purpureis. Dorn auf ungebauten Feldern. Icon. 4. Tab. p. 1236. Musse de veau.

Aparine latifolia humilior montana T. s. matrisylva officinarum, flosculis albis campaniformibus multifidis solis stellatis, Waldmeister. Icon. Tab. p. 1201. perenn. Muguet.

Aparine vulgatio, foliis stellatis asperis, flosculis albis campaniformibus multifidis s. *Aparine vulgaris* T. groß Rebtraut an denen Zäunen. Icon. Matth. epit. p. 557. Grateron ou Reble.

Aquilegia sylvestris T. flore simplici coerulescens polypetalo pendulo, wilde blaue Agley in Wäldern. Icon. 1. Tab. p. 97. Ancolie sauvage perenn.

Eadem flore rubro.

Arum maculatum, maculis nigris T. flore monopetalo cucullato, baccis rubris. gesteckt Zehrwurz, Pfaffenpfeil in schattichten Wäldern. Ic. 1. Tab. p. 1124. perenn. pied de veau marqué.

Arum vulgare non maculatum T. Aron, oder Zehrwurzel in Hecken. Ic. Tab. p. 1123. perenn. pied de veau ou Vit de chien, sans marque.

Asilepias flore albo T. s. Hirundinaria vel Vin-

Vincetoxicum, flosculis albis monopetalis campanif. multifidis, Schwalben, Wurzel in Hölzern. Ic. 1. Tab. p. 1105. Dompveenin. perenn.

Bellis coerulea caule folioso, flore composito flosculoso unilabiato s. *Globularia vulgaris* T. blau Maslitten. Marguerite bleu. Icon. Tab. 6. p. 708. perenn.

Bellis sylvestris, caule folioso major, flore albo composito radiato. s. *Leucanthemum vulgare* T. grosse Maslitten auf denen Wiesen. Icon. 1. Tab. p. 710. Oeil de beuf.

Berberis dumetorum T. flore simplici rosaceo luteo. Saurdorn / Saurach in denen Hecken und Zäunen. Icon. 2. Tab. p. 1448. Epine vinette.

Betula T. flore amentaceo sub luteo, folio subrotundo late virenti, per ambitum serrato. Birckenbaum. Ic. Tab. p. 1398. Bouleau.

Blitum sylvestre spinachiae facie, Bonus Henricus dictum, floribus stamineis luteis s. *Chenopodium folio triangulo*. T. Stolzher Heinrich / wilder Feld-Spinat an denen Wegen. Icon. Tab. p. 810. bon Henry. Espinat sauvage. perenn.

Brassica alba crispa T. folio rugoso patulo, flore simplici cruciformi, trauser oder welscher Kobl. Icon. 6. Tab. p. 784. in Gärtners Feldern. Chou frise blanc. ann.

Bras-

Brassica arvensis T. s. *Sylvestris* Crambe dicta, Schnitt-Kobl. Icon. 15. Tab. p. 787. ann. cum praecedent.

Brassica capitata alba Tab. flore simplici cruciformi luteolo. Sauer oder weiß Kraut / in Gärtners Feldern. Ic. 4. Tab. p. 784. Chou pomme blanc. ann.

Brassica capitata rubra T. roth oder Salat-Kraut. Ic. 5. Tab. p. 784. Chou rouge.

Brassica cauliflora T. flore tetrapetalo luteolo, Blumen-Kobl. Icon. 9. Tab. p. 785. Chou fleur.

Brassica fimbriata s. *crispa laciniosa* T. Wirsching / Chou frise à feuilles fendues.

Brassica gongylodes T. caule rapum gerens rotundum, Kohlraben runder Ruben-Kobl / Chou rave. Ic. 1. Tab. p. 789.

Eadem rapo longiore, langer Ruben-Kobl. Icon. 2. Tab. p. 789.

Brassica lativa vel *viridis vulgaris* aperta laevis. flore simpl. cruciformi luteolo s. *Brassica alba vel viridis* T. gemetter Kobl. Ic. 1. Tab. p. 783. Chou blond.

Bryonia aspera s. *alba baccis rubris* T. s. *Vitis alba*, foliis asperis baccis rubris, floribus monopetal. campaniform. albis, radice rapacea alba amara s. Zaun-Ruben / Scheiß-Ruben / in denen Hecken und Zäunen. Bryone ou couleuvrée. Ic. Tab. p. 1291.

Bryonia laevis s. *nigra*, fructu racemoso

so flore monopetalo viridante campaniformi s. *Bryonia alba baccis nigris* T. schwarze Zaun-Ruben in Hölzern und Hecken. Ic. 1. Tab. p. 1288. *Bryone noir*. perenn.

Castanea T. *fativa*, fructu majore dulci floribus stamineis amentaceis in julum congestis foliis late, virentibus ac splendentibus acuminatis rigidis. *Castanten*. Baum. Ic. 1. Tab. p. 1385. Chateigner.

Castanea sylvestris quæ peculiariter *castanea* T. fructu dulci minore, folio multifido. wilder Kästen-Baum. Marronier sauvage.

Castanea equina flore simpl. rosaceo in spicam congesto, folio multifido fructu amaricante s. *Hippocastanum vulgare* T. Roß-Castanten hin und wieder in Gärten. Marronier d'Inde. Icon. 2. Tab. p. 1385.

Chamecerasus dumetorum; fructu gemino rubro T. s. *Periclymenum rectum* fructu gemino rubro, flore simplici monopetalo labiato, aufrechter Zümtig / Hunde-Kirschen. Cerisier bas. Icon. 4. Tab. p. 1299. perenn.

Chamadrys spuria minor, foliis imis rotundioribus flosculis coeruleis cruciform. quæ *Teucrium officinarum pratense* s. *Veronica minor* foliis imis rotundioribus T. falsch wiesen Chamanderlein. Ic. 3. Tab. p. 773. ann.

Chamæmelum vulgare odoratum, flore composito radiato, foliis tenuissime dissectis, *Chamemelum vulgare leucanthemum* T. A. pothe

pothecker Chamillen auf den Winter Feldern. Ic. 1. Tab. 58. Camomille. ann.

Chærefolium sativum flosculis albis rosaceis umbellatis s. *Charophyllum sativum* T. Garten- oder Kuchen-Rösel. Icon. 1. Tab. p. 283. Cerfeuil. ann.

Chelidonium majus vulgare T. flosculis cruciformibus luteis, radice croceo succo madente, groß Schöllkraut an den Zaunen und Mauern. Eclaire, grande chelidoine. Icon. 1. Tab. p. 101. perenn.

Cirsium singularibus capitulis parvis T. foliis non laciniatis floribus flosculosis purpurescentibus s. tertium montan. Clus. hist. CXLIX. perenn.

Consolida media Genevensis s. *Bugula sylvestris villosa* flore speciosiore coeruleo T. monopetalo unilabiato, groß gulden Günsel an aufgeworfenen sonnenreichen Hügeln. Bugle de Geneve. Ic. J. B. 3. 432. perenn.

Consolida pratensis media flore coeruleo monopetalo unilabiato s. *Bugula* T. gulden Günsel auf den Wiesen. Ic. 1. Tab. p. 945. Bugle ou Consoude moyenne. perenn.

Eadem flore purpureo.

Consolida media pratensis cinerea vel alba s. *Bugula flore cinereo vel alba* T. weißer gulden Günsel. perenn.

Consolida media genevensis flore rubello, s. *Bugula sylvestris villosa* flore suave ruben-

re T. gulden Sunkel mit Fleischfarben Blumen.
Icon. Clus. Hist. XLIII.

Eadem flore albo. perenn.

Cornus famina T. s. *Cornus sylvestris* famina, putata *Virga sanguinea*, floribus cruciformibus sub albicantibus, fructu nigro amaro ac acerbo, foliis nervosis corno proximis. Hartriegel sanguine in denen Hecken und Zäunen. Ic. Tab. p. 1459.

Cucumis vulgaris sativus T. floribus monopetalis luteis campaniformibus multifidis, foliis angulosis, Cucumern in Gärten und Feldern. Ic. 1. Tab. 364. Concombre. ann.

Cyanus segetum flore coeruleo T. composito flosculoso, foliis integris. Bluet. Kornblumen. Icon. 1. Tab. 428. ann.

Cydonia fructu brevior & rotundior T. s. *Mala cotonea* minora, floribus albis rosaceis. Apfel Quitzen-Baum in Gärten. Icon. 1. Tab. 1412. Coignier male ou pommier de Coing.

Cydonia fructu oblongo & levior T. s. *Mala cotonea* majora, Birn-Quitzen-Baum. Coignier femelle. Icon. 2. Tab. p. 1413.

Cydonia vulgaris angustifolia T. s. *Cotonea sylvestris*. Coignassier, wilder Quitzen-Baum in Hecken.

Cynoglossum majus vulgare T. floribus monopetalis infundibuli formibus multifidis purpureis, foliis oblongis. Hunds-Zung an den

den Strassen. Icon. Tab. p. 1113. Langue de Chien. ann.

Idem flore albo. T. weisse Hunds-Zung.

Dens leonis folio angustior T. schmahl blättriche Löwen-Zahn.

Dens leonis minimus. s. *Cichorium pulmilum sylvestre* vel *Hedypnois* Clus. cur. post. auf dörren grasichten Orten.

Dens leonis minor, foliis radiatis T. pect. terram spartis laciniatis, radice parva nigricante.

Dentaria heptaphyllos baccifera T. flore cruciformi, ex candido leviter purpureo scenec. siliqua corniculata. Schuppen-Wurzel in Wäldern. Clus. Hist. CXXI. Icon. Tab. 4. p. 324.

Equisetum foliis nudum non ramosum s. *Juncum* T. floribus apetalis stamineis spicatis. Schachtelhalm; Handwerks-Kraut. Queue de Cheval ou Piele. Icon 1. Tab. p. 568. in feuchten stillen Wasser. Gräben. perenn.

Equisetum sylvaticum tenuissimis setis T. s. *Equisetum sylvaticum non asperum*, Waldschaffe. Hau in feuchten und sumpfichten dunklen Wäldern. Ic. 6. Tab. p. 569. perenn.

Eruca palustris latifolia, flore luteo cruciformi, foliis latiusculis splendentibus s. *Sisymbrium eruca folio glabro*, flore luteo T. alias *Barbarea*. Wasser-Kresse / St. Barbara-Kraut an denen Gräben und andern feuchten Orten. Ic. 1. Tab.

Tab. p. 843. herbe aux charpentiers ou St. Barthe. perenn.

Eruca palustris minor & nasturtii folio, siliqua longa, floribus cruciformibus luteis s. *Sisymbrium palustre repens, nasturtii folio* T. kleine Wasserrauche / auf sandigen Ufern des Wassers. Icon. 2. Tab. p. 836. Roquette.

Euonymus vulgaris granis rubentibus. T. floribus albicant. rosaceis male olentibus. Hanhölein / oder Spindelbaum / in denen Hecken. Ic. 1. Tab. p. 1462. Fusain ou Bonnet de Prêtre.

Euphrasia vulgaris, flosculis monopetalis anomalis personatis luteis, parvis ac labiatis, foliis crispis s. *Euphrasia officinarum* T. Augen / Trost / auf denen Wiesen. Ic. Tab. p. 1246. Eufraise. ann.

Fagus T. flore amentaceo glomerato, Buchen. Hêtre, in Wäldern. Ic. Tab. p. 1388.

Ferrum equinum germanicum siliquis in summitate T. florib. luteis papilionaceis s. *Hedysarum minus*. Ic. 2. Tab. p. 901. Unser steben Brauen / Schüßeln / gelbe Steinwicken. Fer de cheval.

Filipendula vulgaris T. floribus ochroleucis rosaceis, foliis pinnatis serratis, radice tuberosa, rother Steinbrech auf trocknen Wiesen. con. 1. Tab. p. 419. Filipende. perenn.

Fragaria vulgaris T. trifolia, flore simplici albo rosaceo. Erdbeeren / auf denen grasigen Hügel / an denen Büden. Ic. 1. Tab. p. 346. Fraizier. perenn.

Geni

Genista angulosa & scoparia trifolia s. vulgaris, floribus amplioribus inodoris luteis papilionaceis, foliis summe viridibus non aculeatis. s. *Cytiso scoparia vulgaris* T. Psrummen / in Wäldern. Genet commun. Icon. 1. Tab. p. 1509. perenn.

Genista spinosa major, longioribus aculeis, flore luteo papilion. s. *Genista spartium spinosum majus*, brevioribus & longioribus aculeis T. großstehende Psrummen Scorpions. Kraut. Genet piquant. perenn. hin und wieder in Gärten.

Genista spinosa minor germanica aculeata, caliculis aculeatis foliosis. s. *Genista spartium minus germanicum* T. klein stehend Psrummen. Kraut. Petit genet piquant. Icon. 5. Tab. p. 1510. perenn.

Geranium columbinum majus; folio malvæ rotundo, multum serrato, flore ex coeruleo purpurascente rosaceo. s. *Geranium folio malvæ rotundo*. T. Storchschnabel / in denen Korn / Feldern / auch an denen Büden. Ic. 2. Tab. p. 123. ann.

Geranium robertianum T. flore dilute rubello striato simplici rosaceo. St. Ruperts. Kraut / stinkender Storchschnabel / auf den Mauern und andern schattichten steinichten Orten. Icon. Tab. p. 122. Bec de cicogne, ou herbe Robert. ann.

Gladiolus minor, floribus uno versu dispositis T. purpureis monopetalis liliaceis radice bulbosa.

bosa. Glais. Icon. Tab. p. 1024. auf Bergsteden Orten und Wiesen. perenn.

Gnaphalium montan. flore rotundiore, suave rubente composito flosculoso, folio incano s. *Elichrysum montanum*, flore rotundiore subpurpureo T. *Rosenpfölein* / *Engelblum* / an durren Orten / auf denen Heiden. Icon. 7. Tab. p. 781. Pied de chat, ou Immortelle rouge. perenn.

Idem flore albo. Icon. 6. Tab. p. 781.

Gnaphalium montanum, longiore & folio & flore purpureo T. beyhm vorhergehenden. Icon. 7. Tab. p. 781. perenn.

Flore etiam variat.

Gramen Cyperoides, spica parvis longissime distantibus T. auff feuchten Wiesen. Raij. Hist. 1295,

Gramen Cyperoides sylvarum tenuius spicat. T. in Wäldern. Parckins. theatr. 1171.

Gramen Cyperoides spica pendula brevior. T. nigra, an denen Ufern.

Gramen cyperoides vel cyperinum palustre majus, spica compacta nigra, floribus apetalis stamineis, foliis sparganio similibus, caule triquetro. s. *Cyperoides latifolium* spica rufa sive caule triangulo. T. groß Cyper. Gras. Icon. 6. Tab. p. 533. an den Ufern der Wasser. perenn.

Gramen cyperoid. vel cyperinum palustre,

lustre, spica minus compacta, radice fibrosa, foliis gramineis angustis, caule triquetro subaspero, s. *Gramen cyperoides lilifolium*, spicis teretibus erectis T. beyhm vorhergehenden. Ic. 4. Tab. p. 532. perenn.

Gramen pratense tomentosum, panicula sparsa, summe candida. s. *Linagrostis*, panicula ampliore T. *Glachs*. Gras / auf feuchten Wiesen und Mosichten Orten. Ic. Tab. p. 540. perenn.

Grossularia hortensis, majori fructu rubro & albicante, T. non spinosa, flore simpl. rosac. subviridi, foliis amphioribus. große St. Johannes Traublein. Staude / St. Johannes Beerbaum. Groselier rouge & blanc de Jardin. Icon. 1. Tab. p. 1492.

Grossularia multiplici acino s. non spinosa hortensis rubra, foliis crenatis ac triangularis s. *Ribes officinarum* T. gemeine rothe St. Johannes Traublein. Staude. Groselier rouge. Ic. 1. Tab. p. 1492.

Grossularia non spinosa fructu nigro T. s. *Ribes nigrum* vulgo dictum, folio olente. Schwarze St. Johannes Beeren. Stauden / Wendelbeeren / in Hecken und Büschen. Icon. 2. Tab. p. 1492. Groselier noir.

Hedera arbores. T. scandens & corymbosa, floribus rosaceis albis, foliis triangularis. große Epheu / an denen alten Mauern und Bäumen. Icon. 1. Tab. p. 1278. Lierre. perenn.

Hedera major sterilis s. *hedera helix*.

Ephedra in denen Bäumen und an denen Bäumen. Ic. 2. Tab. p. 1278. perenn.

Helianthemum vulgare, flore luteo T. simpliciter rosaceo. Sonnen. Günsel / auf grasigten dörren Orten. Icon. 2. Tab. p. 1474. Elanteme. perenn.

Horminum pratense, foliis ferratis, flore coeruleo monopetalo labiato. s. *Sclarea pratensis foliis ferratis*, flore coeruleo. T. Wilder Scharlach. Icon. 4. Tab. p. 765. Toute bonne. perenn.

Idem flore albo & suaverubente.

Ilex aculeata baccifera, folio sinuato spinoso, flore monopetalo rotato albo, s. *Aquifolium* T. Streh. Eiche / Stachpalmen / in Wäldern. Icon. Tab. p. 1382. Houx. perenn.

Iris palustris lutea. T. *Iris palustris*, flore luteo monopetalo liliaceo, folio ensiformi, radice tuberosa. Gelber Wasser. Schwertel / Sumpff. Lillen / in Wasser. Gräben. Ic. 1. Tab. p. 1032. La flambe, ballardé. perenn.

Iris pratensis angustifolia, flore elegantissime coeruleo liliaceo striato. s. *Iris pratensis angustifolia*, non foetida altior. T. blaue tiefen Schwertel / auf denen dunklen wassertichten Wiesen. Icon. 12. Tab. p. 1037. Clajoul des prez. perenn.

Isatis sativa latifolia T. flosculis luteis cruciformibus. Wend / auf denen Feldern. Icon.

Icon. 2. Tab. 1114. Pastel ou Gnesde, à feuilles larges. perenn.

Isatis sylvestris vel angustifolia T. schmalblättrichte Wend / hin und wieder auf der Contrescarpe. Ic. 1. Tab. p. 1114. perenn. Pastel ou Gnesde à feuilles étroites.

Juncus aquaticus maximus, caule meduloso, floribus apetalis stamineis s. *Scirpus palustris altissimus* große Böhmer Bingen / in stillen stehenden Wassern und Gräben. Ic. 1. Tab. pag. 365. Junc perenn.

Lamium montanum melissae folio, flore monopetalo amplo labiato, suave rubente, grati odoris, folius ex opposito binis latioribus, in ambitu serratis s. *Melissa humilis latifolia*, maximo flore purpurascence T. Berg. Nessel mit Melissenblättern / auf hohen Bergen und Wäldern. Ic. Clus. hist. sub nomin. Lamii Pannon. p. XXXVII. Melisse de Montagne. perenn.

Lathyrus arvensis repens tuberosus. T. floribus papilionaceis, elegantissimis purpureis odoratis s. *chamaebalanus leguminosa*. Erbsen / in denen fetten Korn. Feldern. Icon. Tab. p. 891. Gesse. perenn.

Lathyrus sylvestris dumetorum, flore luteo papilionaceo, foliis viciae, radice fibrosa s. *Lathyrus latifolius luteus*, foliis viciae T. gelbe Wiesen auf truckenen Wiesen. Ic. Tab. p. 890. perenn.

Leucojum bulbosum triphyllon majus,
flore lilaceo campaniformi pendulo. s. Nar-
nesso *leucojum trifolium majus* T. grosse Schne-
Tropfen in Gärten. Perceage. perenn. Icon. 2.
Tab. p. 1005.

Lilium convall. album T. flore monopeta-
lo campaniformi. Mähenblümlein. Muguet à
fleur blanche. perenn.

Lilium convallium minus, flore rosaceo
monopetalo albicante, folio nervato cor-
dato s. *Smilax unifolia humilima*. T. Ein Blatt in
denen Büschen. Icon. Tab. p. 1134. perenn.
Smilax.

Linaria montana flosculis subluteis apetalis
stamineis s. *Alchimilla linariae folio*, calice
florum subluteo, T. alias *Linaria adulterina*.
Falsch-Leintraut / auf dörren grasichten Orten. lc.
5. Tab. p. 1209. perenn. Faux linair.

Lotus pentaphyllus, flore majore luteo papilio
naceo splendente T. foliis & siliquis hirsutis
longioribus. Vogelwicken auf den Wiesen. pe-
renn. Lotier. Icon. J B. 2. 355. ann.

Lychnis montana viscosa alba latifolia T. flo-
rum petalis supra albis, subtus virefcenti-
bus, interdum se contrahentibus. Wilde weisse
Marten-Rößlein. Icon. 6. Tab. p. 674. perenn.

Lychnis pratensis flore admodum laciniato
simplici T. s. *Caryophyllus pratensis*, flore la-
ciniato simplici purpureo caryophyllæo,
Flo. Cuculi dictus. Bauchblumen auf denen Wie-
sen.

sen. Icon. 15. Tab. p. 677. perenn. Girofle
des prez.

Eadem flore albo.

Lychnis sylvestris alba simplex T. s. hirsu-
ta major perennis, flore simplici caryo-
phyllæo bifido, foliis latis, alias *Ocimo-*
ides album. weisser Wiedersloss / Wätschen-Kraut /
auf der Contrescarpe, und andern grasichten Orten.
lc. 1. Tab. p. 679. Basilic sauvage. perenn.

Lychnis sylvestris, minus hirsuta perennis,
flore rubello simplici. T. caryophyllæo. s. *Lychnis*
purpurea aquatica, *Ocymastrum dicta*
multis *Ocymoides purpureum*. rother Wieders-
loss / an feuchten waldichten Orten. Basilic sauvage
à fleur rouge lc. 2. Tab. p. 679. perenn.

Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia
T. foliis caryophyllaceis. wilde purpurothe Ma-
rien-Rößl. auf grasichten dörren Orten / und in Höl-
dern. Icon. 7. Tab. p. 675. perenn.

Eadem flore albo.

Malus sylvestris minor, fructu valde acer-
bo. T. flore albo rosaceo, fructu albo atque
rubente; wilder Apfelbaum / in Büschen und an-
dern Strassen. Icon. 23. Tab. p. 1420. Pommier
sauvage.

Matricaria vulgaris s. sativa T. graveolens,
floribus compositis radiatis, foliis latioribus
incisis. Mattram / in Gärten und an den Zäunen.
lc. 3. Tab. p. 28. Matricaire. perenn.

Mercurialis spicata s. samina T. flore ape-
talo.

calo. Wingel • Kraut Weiblein / in Gärten / auf Feldern und andern gebauten Orten mehr. Ic. 2. Tab. p. 941. Mercuriale femelle. ann.

Mespilus apij folio sylvestris, spinosa laciniato T. s. flore simpl. rosaceo subviridi. *Oxyacantha vulgaris*, weisß Dorn / Hagendorn / in Gärten und Büschen. Icon. 1. Tab. p. 1448. Epine blanche.

Mespilus apij folio sylvestris, non spinosa flore simpl. rosaceo. s. *Sorbus Tormentalis* vel *Crataegus folio laciniato* T. Eschölzelbaum / in Hölzern und Bergen. Icon. 3. Tab. p. 1427. Aliser.

Mespilus sylvestris s. germanica, folio laurino non serrato, T. flore simpl. rosac. Ressel-Baum / in Bergen und Gärten. Icon. 1. Tab. 1447. Nélier.

Miliosolium vulgare album T. foliis pinnatis, floribus albis compositis radiatis umbellatis. Schaf-Barbe / Tausend-Blatt / an denen Wegen und Strassen. Icon. Tab. p. 372. Mille feuille. perenn.

Idem, flore purpureo. Ic. 3. Tab. p. 374.

Myagrum sylvestre, capitulis minoribus, flosculis albis cruciformibus, foliis glastii, wilder kleiner Leindotter. Ic. 2. Tab. p. 1194. sub nomine paronych. 2d. *Myagrum*. ann. in Glasesstücken.

Myrrhis femine longo nigro, laevifriato, flosculis albis rosaceis umbellatis. s. Chero-

Cherophyllum sylvestre perenne, cicutæ folio, T. wilder oder Eselstörkel / an denen Zäunen. Ic. 2. Tab. 254. Cerfeuil sauvage. ann.

Nasturtium aquaticum erectum majus & amarum, folio longiore flore simpl. cruciform. albo, s. Cardamine flore majore elatior. T. Ic. J. B. 2. 885. in denen Wassergräben / perenn. Cresson d'eau.

Nasturtium siliquosum s. Cardamine magno, flore albo pleno T. gefüllter weißer Wiesentresse. perenn. in feuchten Orten. Cresson a fleur double.

Nasturtium siliquosum pratense, magno flore simplici purpurascente cruciformi s. Cardamine pratensis, magno flore purpurascente. T. Wiesen-Kresse. Ic. 1. Tab. pag. 844. Cardamine ou Cresson, des Prez. perenn.

Idem flore albo.

Nasturtium sylvestre siliquosum, flore luteo minimo cruciformi, foliis tenuissime divisis, Sophia chirurgorum dictum s. *Sisymbrium annuum, absynthii minoris folio*. T. Sophien-Kraut / Wollsaamen / an denen Strassen und aufgeworffenen Gräben Ic. 1. Tab. p. 26 ann.

Nux Juglans s. Regia vulgaris T. floribus amentaceis, ex julo pendentibus. Weisscher Nußbaum. Ic. Tab. p. 1382. Noyer. Icon. Tab. p. 1382.

Orchis abortiva fusca, caule & flore majore polypetalo galeato luteo, s. fusco. *Nidus avis* T. Wagensbrunnen / Vogels-Nest / hin und

wieder auff durren Orten zwischen den Hecken. Ic. 1. Tab. p. 1062. Nied d'oiseau. ann.

Orchis abortiva violacea, vel *Orobanchae sub coeruleo flore polypetalo galeato*. s. *Limodorum Austriacum*. T. bey der vorher gehenden.

Orchis alba bifolia minor calcari oblongo. T. weiß Knabentraut / Buchshölein / mit langen Sporen in Hecken. Ic. 1. Tab. p. 1053. perenn.

Orchis bifolia latissima T. s. foliis binis splendidibus amplissimis quæ prima Clus. hist. 267. groß Knabentraut in Wäldern. perenn.

Orchis bifolia altera. T. bey der vorher stehenden. Icon. 5. Tab. p. 1054. perenn.

Orchis bifolia, flore herbaceo major. s. *Ophrys bifolia*. r. Zweyblatt / an feuchten Orten. Icon. 1. Tab. p. 1101. Double feuille. perenn.

Orchis foliis sessilibus non maculatis, f. *Orchis trifolia major*. Tab. Ic. 8. p. 1057. perenn.

Orchis fucum referens, colore rubiginoso. T. flore subvirente, auf durren Wiesen. Icon. 3. Tab. 1158. perenn.

Orchis hirci odore, brevior latioreque folio. T. s. Testiculus hircinus. große Buchshölein / oder stinkende Gell. Wurzel / mit breiten Blättern / an durren Orten zwischen den Hecken. Ic. 1. Tab. p. 1055. perenn.

Orchis hirci odore minor. T. flore cimum instar fuliginoso, stinkend Wanzknaben.

Knaben Kraut / auf durren Orten. Ic. 1. Tab. p. 1053. perenn.

Orchis latifolia, biance cucullo major T. galea & alis fere cinereis s. *Satyrium triphyl- lum*. auf Bergichten Orten und Wiesen. Icon. 8. Tab. p. 1057. perenn.

Orchis militaris magna, foliis latis, flore albo punctato, galea fusca. s. nigricante que altera Clus. hist. 267. s. *Orchis militaris major* T. groß Knaben Kraut mit breiten Blättern / in Hölzern. perenn. Ic.

Orchis militaris pratensis, minor, floribus parvis albis, multis punctis purpureis notatis, foliis angustioribus. s. *Orchis militaris pratensis humilior*. T. schmalblättrichtes klein punctirtes Knaben Kraut / an durren grasichten Dertern. Icon. Clus. hist. sub nomin. *Orchis pannon*. 4. perenn.

Orchis militaris montana, spica rubente conglomerata T. odoris suavissimi, ganz roth wohlriechend Stendel Wurzel / in ausgestockten Sonnenreichen Hölzern. Icon. 8. Tab. p. 105. perenn.

Orchis minor palmata radice repente. s. *Helleborine sylvatica*, radice repente Pseudo orchis C. B. p. in schattichten Wäldern. perenn. Icon. Eyst.

Orchis morio mas, foliis maculatis. T. flore purpureo violaceo, Knaben Kraut mit Violettothen Blumen und gefleckten Blättern / auf durren grasichten Orten und brachliegenden Feldern. Icon. 6. Tab. p. 1048.

Orchis

Orchis morio femina T. tota purpurea, foliis non maculatis, Knabentraut mit rothen Blumen / und Blättern ohne Flecken / bey der vorhergehenden. Icon. 7. Tab. p. 1048.

Orchis minor, foliis sessilibus maculatis, s. *Orchis delphinia maculosis foliis*. T. klein braun Knaben - Kraut bey der vorhergehenden. Ic. 5. Tab. p. 1048.

Orchis palmata maxima montana. s. *Orchis palmata montana maculata*. T. Berg. Händlein. Wurzel. Icon 6. Tab p. 1060. sub nomine Palm. Christ. macul. mont. in Bergischen Hölzern und Wiesen.

Orchis palmata pratensis maculata T. s. *Palma Christi maculata*. Icon. 5. Tab. 1000. auf Wiesen.

Eadem flore albo.

Orchis palmata pratensis latifolia non maculata, floribus purpureis, longis calcaribus praeditis. s. *Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus, folio non maculato*. T. Wasser. Händlein. Wurzel / mit nicht gesteckten Blättern. Icon. 1. Tab. p. 1057.

Orchis palmata pratensis angustifolia minor. T. flore purpureo odoratissimo longo calcar praedito. Wohlriechend Händlein. Wurzel. Icon. 3. Tab. p. 1060. auf feuchten Wiesen.

Orchis palmata palustris latifolia T. flore albo subpurpurascente folio maculato. Händlein. Wurzel mit röthlichen Blumen / auf feuchten Wiesen. Icon. 7. p. 1061.

Orchis

Orchis palmata palustris altera. T. latifolia flore violaceo, foliis maculatis. Wasser. Händlein. Wurzel mit punctirten Blättern. Icon. 9 Tab. p. 1061.

Eadem non maculata.

Orchis palmata palustris angustifolia s. *Orchis palmata palustris tertia* T. Wasser. Händlein. Wurzel mit schmalen Blättern. Ic. 8. Tab. p. 1061.

Orchis palmata palustris tota rubra T. foliis & floribus rubris s. *Palma Christi palustris 2da* Tab. p. 1061.

Pedicularis pratensis, flosculis monopetalis personatis purpureis, foliis profunde dissectis, s. *Pedicularis pratensis purpurea* T. rother Hahnen - Ramm / auf feuchten Orten und Wiesen. Icon. 1. Tab. p. 1180. ann. Pediculaire des prez.

Pedicularis palustris rubra elatior Ray hist. T. beyhm vorhergehenden. ann.

Pedicularis pratensis major. s. *femina*, flosculis luteis monopetalis personatis, Crista galli dicta. s. *Pedicularis pratensis lutea* T. selber Hahnen - Ramm. Icon. 2. Tab. p. 1180. ann. Crête de coq.

Pentaphylloides argenteum alatum vel Potentilla T. Anserina officinar. flore luteo simplicifloro, foliis serratis, subtus incanus. Gänserich / an denen Wegen. Icon. Tab. p. 342. perenn. Argentine.

Peri-

Periclymenum vulgare germanic. non
perfoliatum, flore monopetalo tubuloso di-
vifo, folius ex geniculis ad intervalla binis
oppositis. s. *Caprifolium germanicum*. T. Speck-
oder Zaun. Ästlein / in denen Hecken. Icon. 1. Tab.
p. 1299. perenn. Chevre feuille.

Phalangium parvo flore albo liliaceo s.
Phalangium ramosum T. Spinnen Kraut in
Hölgern und andern dürrn grasichten Orten. Icon. 1.
Tab. p. 557. perenn. Phalangium.

Phalangium flore majore s. minus ra-
mosum s. phalangium aliud pulchrius ema-
culato lili candore conspicuum Chabraei
sciagr. p. 222. In Wäldern. perenn.

Pilosella major repens hirsuta, flore
composito luteo vulgaris. f. *Dens Leonis qui*
pilosella officin. T. Mäusohrlein auf trockn grasich-
ten Orten. Icon. 1. Tab. p. 506. perenn. *Pilosella*
ou *Oreille de Rat*.

Pilosella major repens, minus hirsuta &
erecta. f. *Dens Leonis qui pilosella folio minus hir-*
suto T. auff sandigen Boden. Icon. 2. Tab. p. 507.
perenn. *Piloselle* ou *Oreille de Souris*.

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. T. Klei-
Sperber. Kraut. Pimpernell. Icon. 2. Tab. p.
316. Petite pimprenelle. auff trocknen Wiesen.
perenn.

Pimpinella saxifraga major, umbella
candida, florib. alb. rosaceis umbellatis. s.
Tragoselinum majus umbella candida. T. Steins-
bock

bocks Pimpernell / auf dürrn Auen und sonstn auf
grasichten Orten. Icon. 1. Tab. p. 255. perenn.
grande boucage.

Pimpinella saxifraga major, umbella
rubente. s. *Tragoselinum majus, umbella rubente*. T.
beym vorhergehenden. Boucage rouge.

Pimpinella saxifraga minor, foliis cri-
spis, floriculis albis rosaceis umbellatis f.
Tragoselinum minus T. Krauß. Steinbockspeterlein /
auff dürrn Orten. Icon. 2. Tab. p. 255. perenn.
Petite boucage.

Pinus sylvestris vulgaris T. coma brevi, fo-
liis rudioribus & acutioribus, florib. apeta-
lis. Nichtenbaum / wilder Bergayrbelbaum. Icon. 5.
Tab. p. 1345. Pin sauvage.

Pistacia sylvestris, flore albo rosaceo,
ex racemo oblongo pendente, foliis fraxi-
ni s. *Staphylodendron Matthiol.* T. Pimpernell-
Baum / hin und wieder in Gärten. Icon. Tab. p.
1430. Pistachier ou Nez coupez. perenn.

Pisum hortense, flore candido papilio-
naceo, fructu rotundo albo f. *Pisum hortense*
majus. T. Garten. Erbsen. Pois. ann.

Idem flore purpureo.

Pisum arvense. T. s. *Pisum vulgare*, par-
vum album arvense, floribus albis papilio-
naceis, foliis latioribus pinnatis. kleine Feld-
Erbsen. Icon. 4. Tab. p. 883. ann.

Plantago angustifolia major T. flore mono-
petalo hypocrateriformi quadripartito. Sp.

her Wegertsch / auf den Wiesen und Ketten der Acker. Icon. 1. Tab. p. 1111. Plantain à feuille étroite. perenn.

Plantago latifolia glabra minor. T. kleiner breiter Wegertsch. Icon. 2. Tab. p. 1107. perenn.

Plantago latifolia incana. T. Schaaf. Zunge auf den Wiesen und an denen Wegen. Ic. 4. Tab. p. 1107. perenn. Plantain à large feuille. perenn.

Paeonia folio nigricante splendido quae Mas. T. flore intense purpureo rosac. foliis latioribus dissectis. Nicht- oder Pfingst-Rosen. Pivoine mâle. in Gärten und Feldern. Icon. 1. Tab. p. 1171. perenn.

Eadem flore simplici. perenn.

Paeonia communis vel femina T. flore simplici & pleno rubro. einfache und gefüllte Eickrosen. Pivoine femelle. Icon. 2. Tab. p. 1171. perenn.

Polygonatum latifolium vulgare T. flore albo simplici. monopetalo campaniformi tubulato diviso s. Sigillum Salomonis, Weisswurz / in schattichten Hölzern. Icon. 1. Tab. p. 1137. perenn. Seau de Salomon.

Polygonatum latifol. flore majore T. polygonatum, floribus ex singularibus pediculis. Weisswurz bey der vorhergehenden. Icon. 2. Tab. p. 1137. perenn.

Prunus sativa vulgaris, fructu magno crasso subacido T. vulgo damascena, flore rosaceo albo, folio oblongo serrato. Pflaum. Baum / Quetschenbaum. Prunier. Pyrus

Pyrus sativa T. floribus albis rosaceis. zahmer Birnbaum. Poirier.

Pyrus sylvestris. T. wilder Birnbaum / an denen Dörffern und Strassen. Poirier sauvage. Ic. 2. Tab. p. 1425.

Pyrus sylvestris, fructu majore T. s. Pyra sylvestria majora Tab. Icon. 1. p. 1425

Quercus latifolia mas, qua virevi pediculo est T. flocculis rubentibus amentaceis. Eickbaum. Chene.

Quercus vulgaris cum longo pediculo T. gemeiner Eickbaum. Icon. Tab. p. 1374.

Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo T. flore albo rosaceo. Fuchshahnen-Fuß. Icon. Tab. p. 119. perenn.

Ranunculus aquaticus, folio tantum capillaceo, tam supra quam infra aquas tenuissime diviso, flore albo, medio luteus s. *Ranunculus aquaticus capillaceus.* T. in denen Gräben. perenn. Ic. J. B. 3. 781.

Ranunculus aquaticus, foliis circinatis nondum descriptus. in ausgetretenen Flußwässern. perenn.

Ranunculus montanus, folio aconiti, magno flore luteo globofo. T. valde hirsuto. in Bergichten schattichten Dörfern. Icon. II. Tab. p. 109. perenn.

Ranunculus pratensis erectus dulcis T. flore luteo rosaceo. gelber süßer Hahnen-Fuß auf denen Wiesen. Icon. 1. Tab. p. 117. perenn.

Ranunculus pratensis minor, radice verticilli modo rotunda T. s. *Ranunculus pratensis minor* radice tuberosa rotunda. kleiner Hahnen-Fuß / Sanct Antonius Rüblen auff trocknen Wiesen. Icon. 4. Tab. p. 108. perenn.

Ranunculus pratensis repens hirsutus. T. s. kleiner harichter Hahnen-Fuß / auf den Wiesen. Icon. 6. Tab. 118. perenn.

Raphanus aquaticus alter, foliis ferratis, floribus luteis cruciform. alius *Rapistrum aquaticum* s. *Sisymbrium aquaticum* raphani folio, siliqua breviori. T. Wasser-Kresse / in denen Wasser-Gräben. Icon. 2. Tab. p. 792. perenn. *Sisymbrium*.

Raphanus aquaticus, flore luteo cruciformi, foliis in profundas lacinas divisus s. *Sisymbrium aquaticum*, foliis in profundas lacinas divisus, siliqua breviori. T. Wasser-Kresse / bey dem vorhergehenden. Ic. 3. Tab. p. 797. perenn.

Raphanus major oblongus T. cortice albo & nigro, flore albo cruciformi. grosse Sauren Kresse. Raifort. ann.

Raphanus minor oblongus T. crusta rubra vel alba cruciform. siliqua cornuta. Radischgen / frühe rothe und weisse Kresse in Gärten. ann.

Rapistrum arvense, flore albo striato cruciformi, foliis crucae, siliqua articulata s. *Raphanistrum* flore albo striato, siliqua articulata striata minore T. Heyd. Kresse / Hederich auf den Feldern. Icon. Tab. p. 800. ann.

Ra-

Rapistrum flore luteo, foliis incisus vel sinuatis s. *Raphanistrum segetum*, flore luteo vel pallido. T. Hederich / bey dem vorhergehenden. Icon. Tab. p. 793. ann.

Rapunculus corniculatus, flore coeruleo monopetalo campaniformi, folio oblongo s. *Rapunculus* folio oblongo, spica orbiculari. T. Wald. Rapunzel mit runder Blum / in Hölzern. Reponse de bois. J. B. 2. 810.

Rhamnus catharticus s. *Rhamnus* T. flore ex albo viridescente monopetalo, foliis pyri, baccis nigris, Officinis, Spina cervina vel insectoria. Kreuzbeer / Wegdorn / him und wies der in denen Hecken. Icon. 1. Tab. p. 1489. Nerprun. ou Bourgepine.

Rapunculus corniculatus spicatus s. *Alopecuroides* folio Urticae, flore coeruleo monopetalo spicato s. *Ranunculus spicatus* T. Wald. Rapunzel in Hecken. Ic. 5. p. 795. perenn.

Quandoque & flore albo.

Rapunculus esculentus s. *Campanula* radice esculenta, flore monopetalo coeruleo T. foliis inferioribus. bellid. similib. humi accumbentibus, superioribus angustis & glabris, radice longiulcula alba subdulci. in grasichem Dren und Hecken / Rapunzel. Fürwieslein. Reponse. Icon. 1. Tab. 793.

Rosa sylvestris s. *vulgaris* flore odorato incarnato folio glabro. T. Hecken. Rosen / wilde Rosen. Icon. Tab.

D 3

Eadem

Eadem & flor. albo.

Rubia s. *Aparine montana angustifolia* T. foliis longioribus & angustioribus, floribus albicantibus campaniformibus, radice rufescente fibrosa, auf bergichten trocknen und rauhen Orten, perenn. C.B. prodr. p. 145.

Rubus Idaeus spinosus T. flore albo rosaceo, fructu rubro odoro. Hohlbeer/ Hundbeer- Strauch, in Pfaffen und Bergen. Icon. Matth. p. 752. Framboisier, perenn.

Idem fructu albo.

Rubus repens, fructu caesio T. flore rosaceo, s. *Rubus minor*, fructu coerulesco. J. B. 2. 59. Klein kriechender Krag- oder Brombeer- Strauch/ in ausgestockten Aesten/ auch zuzeiten an Rändern derselben.

Rubus vulgaris, fructu nigro T. flore albo rosaceo. Brombeer in Hecken. Ic. Tab. p. 1297. Ronce, perenn.

Idem flore purpurascens.

Ruta hortensis latifolia T. floribus rosaceis luteis, foliis colore saturate viridibus ac graveolentibus. Garten- Kraut. Ruc. Ic. 1. Tab. p. 387

Scabiosa pratensis hirsuta qua officinar. T. flore ex coerulesco purpurasc. composito, folio laciniato. Apostem- Kraut, Wiesen Scabiosa. Scabieuse. Icon. 2. Tab. p. 441. perenn.

Sambucus aquatica flore simpl. monopetalo albo umbellato, folio viridino s. *Opulus*

Opulus T. Schwebel- Baum/ Hirschholzer/ in feuchten Wäldern und sonst in denen Bäumen. Icon 4. Tab. p. 1440. Obier ou Opier.

Sambucus aquatica, flore monopetalo globoso pleno s. *Opulus flore globoso* T. Schnebellen in Gärten. Icon. 5. & 6. Tab. p. 1440.

Sambucus humilis s. *Ebulus* T. flore albo monopetalo rosaceo multifido. Auch. Yeble. Icon. Tab. p. 1160.

Sanicula officinar T. flore rosaceo umbellat. subvirid. Sanctel. Sanicle. in Hölkern. Icon. Tab. p. 244.

Satureja sativa T. s. hortens. Saturen/ Bohnen- Kraut/ flore barbato & galeato purpurascens. Sarriette. Icon. Tab. p. 744.

Standix semine rostrato vulgaris T. folio tenuiore, floribus albis rosac. Stadelstörfel in denen Frucht- Aesten. Icon. 1. Tab. p. 288. Peigne de Venus. ann.

Senecio minor vulgaris T. flore composito luteo flosculoso. Crenkel- Kraut/ Canarien- Vogel Kraut/ auf Kraut- und Gärtners- Feldern. Ic. 1. Tab. p. 462. Petit Senecion. ann.

Sideritis vulgaris hirsuta erecta, flore ochroleuco monopetalo labiato, s. *Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis*. T. Zeisgen- Kraut. Berus- Kraut. Icon. 5. Tab. p. 370. Crapaudine. ann.

Sinapi sativum, folio rapæ, flore subluceo cruciform. s. *Sinapi rapifolio* T. rechter Senf in

in Gärten und auff Gärtners Aedern. Moutarde.
Icon. 1. Tab. p. 838. ann.

Solanum scandens T. floribus violaceis graveolentibus monopetalis rotatis divisis, baccis rubris s. Dulcamara Hundsch. Kraut / an Wasser gestaden. Icon. Tab. p. 1290. Morelle, perenn.

Sorbus sylvestris, foliis domestica similibus T. s. *Sorbus aucuparia*, floribus albis cruciform. foliis pinnat. serratis, baccis rubris. grosser Weelbaum / Vogelbeerbaum / in bergichten Wäldern. Icon. 2. Tab. p. 1426. Sorbier.

Symphytum majus vulgare T. s. *Consolida major* flore purpureo monopetalo intundibuliformi, foliis oblongis hirtutis, quæ Mas schwarze Schmeer oder Wall. Wurzel. Icon. 2. Tab. p. 949. Grande Consoude ou Oreille d'Asne. perenn.

Idem flore albo quod foemina & incarnato.

Syringa flore coeruleo monopetalo infundibuliformi diviso major s. *Lilac* T. hin und wieder in Gärten. Icon. 1. Tab. p. 1459. *Lilac*. perenn. Strindken.

Eadem flore albo.

Thlaspi arvense vaccariae incano folio majus, flosculis albis cruciform. s. *Thlaspi vulgatum* T. Bauren. Kresse / in Kraut. Aedern. Moutarde ou Seneve sauvage. Icon. 2. Tab. p. 849. ann.

Thlaspi

Thlaspi arvense & vaccaria folio lato laviq., *siliquis latis* T. Bauren. Sene/beym vorhergehenden. Icon. 3. Tab. p. 850. ann.

Thlaspi arvense siliquis latis T. flosculis albis s. *Thlaspi Drabæ folio*, grosser Bauren. Sene in Gärtners Feldern. Icon. 1. Tab. 849. ann.

Thlaspi incanum, *Alyssum dictum*, campestre majus folio polygoni, flosculis subluteis cruciform. siliculosis, tenui radice alba s. *Alyssum incanum luteum, serpilli folio majus* T. groß Schild. Wesen. Kraut / an durren Orten. Alysson. Icon. 4. Tab. p. 850. ann.

Thlaspi incanum Alyssum dictum campestre minus s. *Alyssum incanum luteum serpilli folio minus* T. klein Schild. Wesen. Kraut / beyhm vorhergehenden. Icon. 18. p. 853. ann.

Tilia foemina folio majore T. flore rosaceo luteolo. Linden. Baum mit breiten Blättern. Tilleul. Icon. 2. Tab. p. 1397.

Eadem folio minore s. *sylvestris* vel *Mas foliis Ulmi*. Ic. 1. Tab. p. 1396.

Trifolium arvense lupulinum, flore luteo papilionaceo majus s. *Trifolium pratense luteum capitulo lupuli* s. *Agrarium*. T. gelber Seiden oder Hopfen. Klee / auff denen Wiesen. ann.

Trifolium arvense flore luteo lupulino minus s. *Trifolium pratense luteum capitulo brevior*. T. kleiner Hopfen. Klee / beyhm vorhergehenden. Icon. 13. Tab. p. 908. ann.

D 5

Tri-

Trifolium montanum lupulinum T. capitulis spadiceis. Unser Frauen Hopf. Klee / Berg-Hopfen. Klee / in Bergen. ann.

Trifolium pratense, flore albo minus & semina glabrum T. foliis subrotundis maculatis floribus suaveolentibus, wohlriechender Bisam- oder Wiesen. Klee. Treffe des prez. perenn.

Trifolium pratense album, flosculis papilionaceis foliis oblongis imis cordatis s. *Trifolium pratense album* T. weiser langblättrichter wiesen Klee / anten zu mit runden Herzblättern / auf den Wiesen. lc. 1. Tab. p. 907. perenn.

Trifolium pratense fibrinum flore monopetalo coeruleo, radice amarissima succulenta s. *Menyanthes palustre* T. Biber. oder Sumpff. Klee / auf feuchten Wiesen und in sumpftichten Gräben. Icon. 2. Tab. p. 906. Menante. perenn.

Trifolium pratense album inodorum folio subrotundo non maculato. kleiner weiser Wegklee ohne Geruch. perenn.

Trifolium pratense flore monopetalo T. purpureo papilionaceo. Fleischblum / brauner wiesen Klee. lc. 2. Tab. p. 908. perenn.

Trifolium filiquosum s. *Lotus pratensis* filiquosus luteus T. pentaphyllos flore papilionaceo. Schotten. Klee / auff denen Wiesen und andern grasichten Orten. lc. 1. Tab. p. 904. perenn.

Typha palustris major. T. floribus apetalis exiguis, folio triangulo. grosse Kieſch. oder Nar-

Narren. Kolben. Grande masse, le jone ou Marteau. Icon. Tab. 1. p. 558. perenn.

Typha palustris minor T. kleine Narren. Kolben. Petit Masse. lc. 2. Tab. p. 559. perenn.

Veronica serpens, folio rotundiore serrato, flore dilute coeruleo monopetalo rotato diviso s. *Veronica mas*, supina & vulgatiss. T. quæ officinar. Ehrenpreis Männlein in Wäldern und andern hechtichten Orten. Veronique mâle vulgaire. Icon. 1. Tab. p. 773. perenn.

Veronica spicata minor. T. s. recta minima Clusii Hist. 347. klein aufrecht stehender Ehrenpreis.

Veronica spicata pratensis serpilli folia, flore ex purpureo candido monopetalo rotato diviso s. *Veronica pratensis serpillifolia*. T. Best aller Welt / klein Ehrenpreis Weiblein / auff feuchten und andern sandigen Wiesen. Icon. 2. Tab. p. 773. perenn.

Veronica spicata minor, foliis imis rotundioribus T. s. *Chamædris spuria minor* rotundifolia. klein Samanderlein auff schattichten Wiesen und in Püſchen. lc. 3. p. 771. perenn.

Eadem flore albo.

Veronica supina Teucii folio. T. s. *Chamædri spuria* affinis rotundi folia scutellata. In Wäldern und Bergen. perenn.

Viburnum T. flore albo monopetalo rotato diviso, foliis crassioribus incanis ac sensim per ambitum serratis. Weelbaum / Schlingbaum / in Hecken und Wäldern. Viorne. lc. Tab. p. 1461. Vicia

Vicia annua minor, purpureo coerulea spicata procumbens, flore papilionaceo s. Vicia sylvestris spicata. T. Vogel, oder Feld, Wicken / in den Korn, Feldern. Vesse. Clus. Hist. sub nomm. *Vicia sylvestr.* 2d. p. CCXXXV. ann.

Vicia perennis maxima dumetorum, flore papilionaceo purpureo s. Vicia maxima dumetorum T. alias *Cracca major.* grosse wilde Wicken / in den Büschen und Hecken. Icon. 2. Tab. p. 892.

Vicia perennis multiflora sepium s. dumetorum, coeruleo spicato flore papilionaceo s. Vicia multiflora T. steigende Vogel, Wicken / mit blauen Blumen / in denen Hecken und Büschen. Ic. 1. Tab. p. 891.

Vicia segetum, cum siliquis plurimis hirsutis T. s. flosculis ex albo purpureis, semine rotundiore maculato. *Cracca minor, kleine weiß-graue wilde Wicke / unter dem Getreide.* Vesse. Sauvage ou Vesseron. Ic. 3. Tab. p. 892. ann.

Vitis Idæa T. foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Omnium minima est s. Myrtillus, flore albo monopetalo campaniformi pendulo.* Schwarze Beer, Wald, oder Heidelbeer, Staude in Bergen. Airille ou Myrtille. Ic. 1. Tab. 1487. perenn.

Vitis Idæa T. semper virens, foliis buxi, baccis rubris austeris ac amaricantibus, floribus blande rubentibus s. *Vitis Idæa foliis sub-*

192

rotundis non crenatis, fructu rubro. T. Preussels oder rothe Steinbeeren / in Bergen. Ic. 4. Tab. p. 1488. perenn.

Vitis Idæa palustris, flore rosaceo purpurascens, petalis reflexis. s. *Oxycoccus.* T. Moosbeeren / in sumpsichten Orten. Cousinet des mamis. perenn.

MENSIS

JVNIVS. & JVLIVS.

A *Cetosa rotundifolia hortensis* T. s. *Oxalis romana* repens, folio rotundiore succulento, pallide virente, floribus apetalis stamineis. Garten, Ampfer. Ozeille ronde. Ic. 3. Tab. p. 1184. perenn.

Adiantum album murarium, foliis ru-taceis saturate virentibus s. Ruta muraria T. Mauerrauten. Rue des murailles. Icon. 3. Tab. p. 1184. perenn.

Adiantum vel Polytrichum aureum s. Muscus capillaceus major, pediculo & capitulo crassioribus T. Wiedertode / Wiedertthon. Perce mouille ou Politric. In schattichten feuchten Orten. Ic. Tab. sub nomine *Adiant. aurei.* p. 1186. perenn.

Adiantum nigrum vulgare s. officinarum, foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro s. Filicula qua adiantum nigrum officii-

officinarum, pinnulis obtusioribus. T. Frauenhaar/
grosse Esels, Farn. Icon. 5. Tab. p. 1185. Ca-
pillaire noir. perenn.

Agrimonia officinarum T. flosculis rosaceis
luteis, suaveolentibus, radice nigra adstrin-
gente, fructu oblongo echinato, caule hirtu-
to, folio serrato fido. Odermennig in denen
Hecken. Aigremoine. Icon. Tab. p. 330. perenn.

Agrimonia odorata s. *Eupatorium odo-
ratum* T. s. folio speciosiore diviso, ac per
ambitum serrato, floribus luteis rosaceis
spicatum dispositis. Wohlrtechender Odermennig/
in Bergen und andern sandigen duncklen Orten. Eu-
patoire à un fumet agreable. perenn.

Alchimilla vulgaris T. folio rotundo cre-
nato, floribus subluteis aperalis, hirsutis ver-
ticillatis. Stau / unser Frauen Mantel / in
feuchten Orten / in Wäldern. Pied de Lion. Icon.
Tab. p. 249. perenn.

Alga tenuioribus filamentis s. *Tricho-
manes aquaticum* Dalechampij. in denen Was-
ser, Quellen.

Alga vulgarissima & longissima Con-
serva vulgo. aller Orten in Wasserbächen.

Allium montanum latifol. maculat. T. flore
albo liliaceo s. *Victoralis longa* Clus. Hist.
189. Allermannsharnisch / auf bergichten Wiesen.

Idem foliis angustioribus C. B. Ail de
montagne longue.

Allium sativum T. flore liliaceo multi-
fido

fido albo, folio non fistuloso radice fibrosa.
Knoblauch / auff den Gärtners Aekern. Ail. Icon.
Matth. p. 328. ann.

Allium sativum alterum sive *Allioprassum*
caulis summo circum voluto T. s. *Scorodopra-
sum*. Icon. Clus. Hist. 19. ann. Rocambole.
Welscher Knoblauch.

Allium campestre juncifolium capita-
tum purpurascens majus, alius *Porrum syl-
vestre latifolium*, floribus liliaceis rubris. s.
Cepa juncifolia minor purpurascens. T. Icon. Tab.
p. 872. Poireau sauvage. wilder Knoblauch / in Fel-
dern und Hecken. perenn.

*Allium campestre purpurascens tenui-
folium* s. *Cepa tenuifolia*, *spherocephalos purpu-
rascens* T. Petit poireau sauvage. Ray. Hist. 1118.
Kleiner wilder Knoblauch / bey vorhergehenden.
perenn.

Alfne altissima nemorum T. repens foliis
ex adverso nascentibus, parietariae similibus
floribus amplioribus rosaceis albis. groß Bo-
gelkraut in feuchten Hecken und Püschchen / gern bey
Quellen und abtauffenden Wasserleim. Morgeline.
Icon. 2. Tab. p. 1086. ann.

Alfne aquatica s. *palustris major*. T. Wasser-
Vogel-Kraut / in Wassergräben und Bächen. Ic.
9. Tab. p. 1089. ann.

Alfne aquatica media T. uliginosis locis
proveniens s. *fontana longifolia*, floribus al-
bis

bis rosaceis. Brunnen, Vogel-Kraut / in frischen Wasser. Wächlein. Ic. 8. Tab. p. 1089. ann.

Alfne minor multicaulis T. foliis serpilli similibus. Kleiner Hüner-Darm / auff sandigem Boden. Icon. 4. Tab. p. 1087. ann.

Alfne minor capitulis lini T. s. *Petræa minima*. Tab. Icon. 3. p. 1088. Klein Stein-Vogel-Kraut / auff brachliegenden Aeckern und andern Orten mehr. ann.

Alfne montana latifolia flore laciniato T. foliis latoribus & hirsutis. In schattichten Püschchen.

Angelica sylvestris minor s. *Erratica* T. repens, floribus rosaceis, umbellat. albis, foliis latoribus dissectis atro virentibus. Kleine wilde Angelique, in schattichten Orten und Zäunen. Icon. 2. Tab. p. 230. Angelique sauvage ou herbe Gerard.

Anonis spinosa T. trifolia flore purpureo simpl. papilionaceo. Stachelkraut / Hauhechel / auf dürren Orten. Icon. 1. Tab. p. 913. Arreste. boeuf ou bugraine avec d'espines, perenn.

Eadem flore albo. Ic. 2. Tab. p. 913.

Anonis non spinosa trifolia, flore purpureo s. *Anonis spinis carens*, purpurea. T. Hauhechel / ohne Stachel / an denen Rändern der Aecker. Ic. 3. Tab. p. 913. Arrestes boeuf. sans epines, perenn.

Anthyllis leguminosa, luteo pallescente flore, simplici papilionaceo, foliis subrotundis. s. *Vulneraria rustica* T. gelber Hasen-Klee.

Klee. Icon. 3. Tab. p. 909. Völnersire. ann.

Apium. s. *Sium palustre foliis oblongis* T. per ambitum serratis angustis, floribus albis rosaceis-umbellatis. Icon. 1. Tab. p. 202. Wasserpeterlein / Wasser-Eppich / in frischen stehenden Wächlein. Berle. perenn.

Asparagus sativus, folio anethi, flosculis luteis rosaceis divisis, bacis rubris, radice squamula alba s. *Asparagus sativa*. T. Spargen / in Gärtnern Feldern. Asperge. Icon. 1. Tab. p. 414. perenn.

Aster montanus luteus, foliis glabro folio. T. s. *Bubonium luteum* Tab., flore perfecto composito radiato gelb Bergstern Kraut in Höhlen / Aster. Icon. 2. Tab. p. 716 perenn.

Astragalus luteus perennis procumbens T. s. *Glycyrrhiza sylvestris*, floribus luteo pallescentibus papilionaceis C. B. p. Wilder foenum graecum, in grästlichen dürren Orten / Astragale jaune. Icon. Moris Histor. Oxon. Part. 2. 107. perenn. Fenugrec sauvage.

Avena vulgaris s. *alba* T. floribus apetalis, folio gramineo. Weiser Habern / Avoine, auff denen Aeckern. Ic. Tab. p. 642. ann.

Avena nigra. T. schwarzer Habern. Avoine noir. ann.

Balsamina lutea s. *Noli me tangere* T. flore pendulo polypetalo patulo luteo, folio oblongo latiusculo. Springkraut / an schattichten Orten

Oren der Wasserbüchlein. Balsamine jaune. Icon. Tab. p. 1254. ann.

Barba caprae, floribus compactis albis rosaceis, folio serrato ac linuato, radice capillata amara. s. *Ulmaria officinarum*. T. Geisbart / auff feuchten Wiesen. Barbe de Cheure ou Reine des prez. Icon. Tab. p. 1162. perenn.

Barba caprae floribus oblongis rosaceis T. & Drymopogon. Tab. Waldbart in Höckern. Icon. 1. Tab. p. 1163. perenn.

Beta alba s. viridis, radice fibrosa. floribus viridantibus staminibus, folio latiore costa spissa. s. *Beta alba vel pallefiens qua Cicla, officinar.* T. Mangold in Gärten und Feldern. Poirée blanche. Icon. 1. Tab. p. 814. ann.

Beta rubra radice rapa. T. rötche Ruben oder Möhren. Betterave ou Poirée rouge. Icon. 3. Tab. p. 814.

Betonica vulgaris, flore purpureo monopetalo labiato, folio laciniato hirsuto s. *Betonica purpurea*. T. braune Betonen / auff den Wiesen und in Höcken. Betoine. Icon. 1. Tab. p. 931. perenn.

Eadem flore albo. Icon. 2. Tab. p. 931.

Brassica sylvestris foliis longis, circa radicem cichoraceis asperis, floribus interdum ex albo pallefcientibus cruciform. radice alba duriore. s. *Turritis foliis inferioribus cichoraceis, coeteris perfoliatis*. T. langstielichter Waldkohl / mit Hindlauff. Blättern / auff sandigen Orten

III

und ausgestoecten Höckern. Icon. Clus. hist. sub nomin. Turritis major. Plateau, p. CXXXVI. ann.

Brunella folio laciniato T. flore albo monopetalo labiato parvo. weisse Braunellen / auff trocknen graptichen Orten. Icon. 2. Tab. p. 944. perenn. Brunelle.

Brunella major, folio non dissecto T. flore rubro monopetalo labiato s. *Brunella vulgaris*. Braunelle / auff trocknen Wiesen und Heinen. Icon. Tab. p. 943. perenn.

Eadem flore albo.

Buglossum angustifolium majus. T. s. Vulgare, flore rubro monopetalo infundibuliformi diviso. Dachsen Zung / in Gärten auch in fetten Korn-Feldern. Bagloile. Icon. 1. Tab. p. 803. perenn.

Buglossum sylvestre minus. T. asperum floribus eleganter coeruleis monopetalis infundibuliform. wilde kleine Dachsen Zung / in denen Feldern Icon. Fuchs la petite bagloile. ann.

Cacalia foliis crassis hirsutis T. foliis flosculis purpureis cruciformibus. s. *Cacalia incano folio* Clus Hist. CXV. grosse Waldroschub. *Cacalia*. perenn. in Wäldern.

Cacalia foliis curaneis acutioribus & glabris C. B. s. *Cacalia glabro folio* Clus. Hist. CXV. in bergichten Wäldern. perenn.

Campanula arvensis minor, siliqua ampliori. T. f. *Speculum veneris minus*, flore coeruleo

E 2

mono-

monopetalo campaniformi multifido. *Brauer*
Eptegel / in den Früchten Aehren. ann.

Eadem quandoque flore albo. *lc.* Tab.
 p. 683.

Campanula nemorosa angustifolia, magno flore,
 major. T. 8. *Rapunculus nemorosus*, magno
 flore, major. *Wald. Rapunzel.* *Icon.* 6.
 Tab. p. 795 perenn.

Campanula nemorosa angustifolia parvo flore, T.
 8. *Rapunculus nemorosus angustifolius*, parvo
 flore. *Icon.* 3. Tab. p. 794. kleine *Wald-*
Glöcklein. perenn.

Campanula persica folio, T. 8. *Rapunculus*
persicifolius, magno flore coeruleo mono-
 petalo campaniformi, folio angusto atque ob-
 longo, parum cretato, radice lactescente.
Wald. Glöcklein / in bergichten Orten und Wäldern.
Icon. *Clus. Hist.* CLXXI. perenn.

Campanula hortensis, rapunculi radice. T. 8.
Campanula repens, flore minore coeruleo.
Wilde Milch-Glöcklein. *Icon.* J. B. 2. 804.

Campanula minor vulgaris rotundifolia. T. 8.
Campanula minor rotundioribus imis foliis,
 floribus monopetalis coeruleis, radice fibro-
 sa repente. kleine blaue *Milch-Glöcklein* / hin
 und wieder auf den aufgeworffenen grasichten Hü-
 geln. *Icon.* 2. Tab. p. 794.

Caryophyllus sylvestris latifolius vulgaris.
 T. 1. minor, flore rubro simplici caryo-
 phyllo aliis *Tunica*. *Donnerdägelein* / auf gras-
 sichten

Orten trocknen Orten. *Icon.* 12. Tab. p. 665.
Ouillet rouge sauvage, à feuilles larges.

Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius.
 T. 8. *Caryophyllus montanus albus* *weisse*
de Stein. Dägellein / beym vorhergehenden. *Icon.* 13.
 Tab. p. 668.

Caryophyllus sylvestris humilis, flore unico T.
 8. *repens humilis minimus vulgarissimus ru-*
bellus, radice longa tenui fibrosa. *Icon.*
Clus. Hist. p. 282. *Stetn. oder Wildnägelein*
 auf trocknen sandigen Orten.

Centaureum luteum perfoliatum T. flore mo-
 nopetalo in fundibuliformi, radice alba fi-
 brosa. *Seib tausend Gulden.* *Icon.* 4. Tab. p.
 1166. *Centauree jaune.*

Cepa fissilis. T. *Schleß. Zwiebel. Ciboule.*
Icon. *Matth. epit.* p. 326.

Cepa sectilis caule, floribus & semine
vulgaris cepæ similibus, ut & bulbulis ob-
 longis minime capitatis. *Schnitt. oder St. Ja-*
cobs Zwiebeln. *Oignon de St. Jacques.* *lc.* *Matth.*
Epit. p. 325.

Cepa sectilis juncifolia perennis. T. 8. *Por-*
rum sectivum juncifolium. *Schnittlauch.* *lc.*
 Tab. 276.

Cepa vulgaris. T. rotunda, floribus & tu-
 nicis purpureiscentibus liliaceis, foliis fistu-
 losis. *Zwiebel* / in Gärten und Feldern. *Oignon.* *lc.*
 2. Tab. p. 270.

Cepa vulgaris, floribus & tunicis candi-
 dis.

dis. T. s. *Cepa alba rotunda*, weisse Zibeln.
Icon. 1. Tab. p. 870.

Cepa vulgaris oblonga. T. Winter Zibeln.

Cepa ascalonica. T. s. Sterilis, Schalotten.
Icon. Matthiol Epitom. p. 327. Eschalotte.

Chamadrys major repens. T. foliis laciniatis, flore monopetalo labiato rubello. Edel Samanderlein/ Bathengel. Germandree lc 2 & 3. Tab. p. 768.

Chamadrys minor repens T. flore purpureo monopetalo labiato. Gemem Samanderlein. lc. 1. Tab. 768. petite Chesnette.

Eadem flore albo.

Chamadrys palustris canescens T. s. *Scordium officinarum* flore purpureo monopetalo tantum labiato, folio villoso. Lachen-Knoblauch/ Wasser-Batheng. Germandree d'Eau ou Scordium lc. 1. Tab. p. 1144.

Chamamelum foetidum T. flore composito radiato live *Cotula foetida* officinar. Krotten-Eil/ stinkende Hunds Camille/ an ungesauten Orten. Camomille puante, ou Marouttes.

Chamamelum inodorum. T. s. non foetidum vel *Cotula* non foetida, Hunds-Camillen/ ohne Geruch/ hin und wieder in den Feldern. Camomille sans Odeur. lc. 1. Tab. p. 71.

Chamamelum miniatum sylvestre, flore phæniceo rosaceo, foliis tenuissime dissectis s. *Ranunculus arvensis*, foliis *Anthemidis* floribus minoribus atrorubentibus & splendentibus
T. alias

T. alias Flos Adonis. hellrothe Feld-Röslein/ Cozellen. Blumen/ in denen Frucht-Heckern. Icon. 1. Tab. p. 72.

Idem flore luteo s. *Ranunculus arvensis* foliis *chamemeli*, flore citriato. T. gelbe Feld-Röslein/ beyhm Vorhergehenden. lc. 2. Tab. p. 72.

Chamæpithys vulgaris, flore luteo odorato, monopetalo unilabiato, folio trifido oblongo s. *Chamæpithys lutea vulgaris* T. Feld-Cypressen/ Schlagträutlein. Ivette lc. Tab. p. 776.

Cichorium angustifolium T. s. *Intybus* vel *Endivia* sativa angustifolia vulgaris, flore composito semistolculoto, schmalblättriche Endivien. lc. 3. Tab. p. 477. Scariole ou Endive.

Cichorium crispum T. s. *Intybus* vel *Endivia* crispa krause Endivien/ Scariole crespée. lc. 2. Tab. p. 477.

Cichorium latifolium s. *Endivia vulgaris* T. floribus coeruleis & candidis compositis Endivien/ mit breiten Blättern/ Winter-Endivien. Endive à feuilles larges. lc. 1. Tab. p. 467.

Cichorium sylvestre T. flore coeruleo & albo composito, wilde Wegwart/ Wegwels. Chicorée lauvage, neben den Wegen und Strassen. lc. 1. Tab. p. 467.

Cichorium sativum T. flore coeruleo & albo, sahne oder Garten-Wegwart/ Eichorien/ in Gärten. Chicorée.

Cicutaria latifolia foetida T. caule geniculato, foliis myrrhidis latioribus & nigrioribus

bus rosaceis umbellatis, stinkender Schirrling/
in feuchten schattigen Orten. Cigue, lc. 2. Tab.
p. 1170.

Cicutaria palustris latifolia alba & ru-
bra, s. Myrrhis palustris latifolia alba. T. Was-
ser-Schirrling in feuchten Orten. Cigue en marais
à feuilles larges.

Eadem rubra.

Cicutaria palustris tenuifolia, flore albo
rosaceo s. *Phellandrium* T. Sumpff-Schirrling in
stillstehenden Wasser. Wäcken. Cigue en Marais à
feuilles étroites. lc. 3. Tab. p. 1170.

Consolida regalis arvensis, flore mi-
nore coerulesco polypetalo foliis tenuius di-
visis, s. *Delphinium segetum* flore coerulesco, T. Korn-
Kittersporen in Frucht-Feldern. Pied d'alouette. lc.
2. Tab. p. 131.

Conyza aquatica laciniata serratifolia
s. *Aster palustris laciniatus luteus*, T. alius *Jaco-*
bæa palustris altissima suaveolens, foliis dis-
sectis, floribus luteis compositis radiatis
Wasserwund-Kraut in feuchten Orten/ zwischen den
Köhren lc. 3. Tab. p. 946. Conise d'Eau.

Conyza coerulesca acris s. *Aster arvensis*
coerulesca acris T. flore composito radiatosub-
coeruleo, kleine Dürnwurzel/ Beruffstrauch. lc. 3.
Tab. p. 946. Aster auff den Mauern und andern
dürren Orten.

Conyza incana s. *Aster incanus verbasco-*
folio villosus T. alius *Jacobæa palustris altissi-*

ma suaveolens foliis integris. Conise musquiée
in sumpffigten Orten.

Convolvulus major albus, T. flore albo mo-
nopetal. campaniformi, grosse weisse Winde/
in denen Zäunen und Hecken. Liseron ou Cam-
panette. lc. 1. Tab. p. 1263.

Convolvulus minor arvensis T. flore candi-
do monopetalo campaniformi, kleine weisse
Winde/ in sandigen Feldern/ und an denen grasich-
ten Reimen. Petit liseron ou Liact. Icon. 3. Tab.
p. 1263.

Idem flore rosco striato, ex carneo &
albo. kleine rosche Winde/ bey der vorhergehenden.

Coriandrum majus T. s. sativum, flore al-
bo rosaceo umbellato foliis inferioribus la-
tioribus, superioribus vero tenuius dissectis.
Coriander, auff denen Gärtners Feldern. Co-
riandre. ann.

Coronopus sativus s. *horensis* T. tenuifoli-
us laciniatus, spica plantaginis, floribus mo-
nopetalis hypocrateriform. divisis alias Cor-
nu Cervinum, zahmer oder Garten Krähen-Fuss/
in Gärten und Gärtners Feldern. Corne de cerf.
lc. 1. Tab. p. 302. ann.

*Cymbalaria flosculis purpurascens*ibus
monopetalis personatis, foliis hederaceis at-
que cauliculis repentibus s. *Linaria hederaceo-*
folio, T. Cymbalstrauch. Linaire de Murailles. peren.

Doronicum folio plantaginis T. oblon-
go villosa flore aureo composito radi-
ata.

ato s. Arnica vel Damasonium 1. Dioscoridis, groß Iucianus-Kraut / Johannisblum / in Wäldern und Bergichten Orien. Plantaine des Montagnes. Ic. Tab. p. 714. & L. p. 1316. perenn.

Daucus montanus multifido folio semine selini s. *Feniculum minimum patulum*, T. Berg-Fenchel Ic. hist. Clus. sub nomine Selin. montan. pumil.

Dracunculus pratensis folio serrato longo, flore albo composito radiato s. *Parmica vulgaris*, flore albo folio longo serrato, T. wilder weißer Bertram / Dorant auff feuchten Wiesen und Wassergestaden. Ic. Tab. p. 1164. perenn. *Parmica*.

Echium scorpioides arvense repens, flore coeruleo minimo monopetalo infundibuliformi, folio integro hirsuto. s. *Lithospermum arvense minus* T. blau Waußhörlein / auf ungebauten Aeckern. Petit gremil. Icon. 1. Tab. p. 511. ann.

Echium scorpioides arvense minus, floribus luteis vel luteo coeruleis. T. beyhm vorhergehenden. ann.

Echium scorpioides palustre repens, flore coeruleo rosaceo. s. *Lithospermum palustre minus* flore coeruleo. T. Bergiß mein nicht / Je länger je lieber / in sumpfsichten feuchten Orien. Ic. 2. Tab. p. 511. perenn.

Idem flore albo quandoque & rubello.

Echium

Echium scorpioides palustre repens, flore & folio majore s. *Myosotis glabra palustris* & major Dillen. C. P. p. 83.

Equisetum foliis nudum ramosum, T. live junceum ramosum. Icon. 1. Tab. p. 568. perenn. Queu de cheval sans branche.

Equisetum palustre majus T. setis longissimis, groß Wasser-Schachtel, Halim. Icon. 4. Tab. p. 569.

Equisetum palustre minus polystachion 2. C. B. prodr. s. radice repente geniculata. auff grasichten sumpfsichten Wiesen / beyhm Rheinstrohm.

Equisetum foliis nudum minus variegatum Basileense T. radice nigra, julio brevissimo. htn und wieder in feuchten Orien des Rheins. perenn.

Equisetum palustre brevioribus setis T. in stillen stehenden Wasser-Gräben. s. Palustre. Ic. Lob. 795. perenn.

Equisetum palustre brevioribus foliis polyspermum, Wasser-Schachtel in Weyhern und Wasser-Gräben. Icon. 1. Tab. p. 1217 perenn.

Equisetum palustre longioribus setis T. s. *Equisetum majus aquaticum* J. B. 3. 728. Icon. C. B. Theatr. bot. p. 241. perenn.

Equisetum palustre tenuissimis & longissimis setis, lang fart Wald-Schachtel / in feuchten Wäldern und andern Orien bey Fisch-Weyhern. Icon. C. B. Th. p. 246. perenn.

Erica vulgaris glabra, T. flore purpureo

& albo monopetalo, foliis sabinae similib.
 Deyde. Bruyere. Ic. Tab. 1. & 2. p. 1517. perenn.

Eryngium vulgare T. flosculis rosaceis umbellatis, Manns-treu Bracken-Distel / an den Strassen. Chardon roland ou à cent tetes. Icon. Tab. p. 1072. perenn.

Faba major recentiorum T. flore picto papilionaceo. Saubohnen in denen Feldern. Grande feve. Icon. 1. Tab. p. 879. ann.

Fenum graecum sativum T. flore albo papilion, foholo ex uno petiolo terno. Buchhorn / in denen Gärtners Feldern. Fœnugrec. Icon. Matth. p. 199. ann.

Filicula fontana major. s. *Adiantum album filicis folio* T. caule tenui fragili. Braun-Farn-Kraut. Icon. J.B. 3. 741. In feuchter, feuchtnen Orten. perenn.

Filicula fontana minor T. foliis rutæ murar. similibus, zwischen den Steinen und Felsen. Tab. Icon. 3. p. 1181. perenn.

Filicula saxatilis corniculata. T. s. *Holosteum petraeum*. Tab. Icon. 3. p. 1113. Schlangwurz / in rauhen feuchtnen Orten. perenn.

Filix non ramosa dentata T. s. Mas officinar. Buchfarn / aller Orten in Wäldern. Ic. Tab. p. 1181. Fougere mâle. perenn.

Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis. T. s. foemina. Fougere femelle ou fougere comun. gemeine Farn Icon. 1. p. 1181. perenn.

Filix non ramosa, petiolis tenuissimis & tenuiss.

nissime dentatis T. s. *Filicula petraea foemina*, Steinfarn / Ic. Tab. p. 1182. perenn.

Filix ramosa minor, pinnulis dentatis T. s. *Filix querna* vel arborea, Eichfarn in Bergichten Wäldern. Ic. Tab. 4. perenn.

Filix minor non ramosa, s. *Palustris minor* Ray hist. 146. klein Steinfarn / in sumptischen Orten perenn. Ic. J. B. 3. p. 732.

Filix saxatilis ramosa, nigris maculis notata. s. *Filix saxatilis* Mas, an den Buchsen der Bäume und andern schattigten Orten und Steinfelsen. Ic. Clus. hist. CCXII. perenn.

Gallium album latifolium T. s. *Mollugo montana latifolia*, flore albo simpl. campaniformi diviso. Großstern Megerkraut / auf den Wiesen und in den Zäunen. Cailletait ou Mouquet. Ic. 1. Tab. p. 434.

Gallium album minus, floribus ex albo & purpureo mixtis s. *Rubeola* T. klein weiß Megerkraut / in trocknen grasichten Orten. Ic. 4. Tab. 433.

Gallium album palustre, floribus albis campaniform. s. *Cruciata palustris alba*. T. weiß Megerkraut / weiß Wallstroh / auf denen Wiesen und andern Orten.

Gallium luteum T. s. verum, unser Frauen Weistrau / gelb Meger-Kraut / in denen Zäunen und Reinen der Aecker. Cailletait jaune. Ic. 1. Tab. p. 432.

Gallium sylvaticum majus ramosum, flore

flore albo simplici, companiformi foliis stellatim positis f. *Gallium montanum latifolium ramosum* T. Falsch Waldmeister/ in Hölzern lc. 2. Tab. p. 434.

Genista humilis sagittalis, herbaceo flore luteo papilionceo f. *Chamaespartium* T. fleischne niedrastehende Pflühen/ Erpfrümmen/ auf trocknen graslichten Orten. Icon. 2. Tab. p. 1512.

Genista tinctoria germanica. T. folio non tereno, kleine Färber. Pflümmen/ Genster/ auff den Rändern der Wiesen / und andern trocknen Orten. lc. 6. Tab. p. 1510. Genet.

Geranium Cicutae folio minus & supinum, T. flore rubro simpl. rosaceo. Storchenschnabel/ in Feldern und an den Strassen. Bec de Gru. lc. 3. Tab. p. 123.

Idem flore lacteo, quod *Geranium arvense* alb. Tab. lc. 4. p. 173.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium T. f. *Gramen harundinaceum paniculatum* Tab. groß Wasserried. Gras/ in stilstehenden Wassern. lc. 2. Tab. p. 525.

Gramen batrachioides folio aconiti, f. 2d minus Clus. hist. XCIX. lc. 6. Tab. p. 124.

Idem flore albo lineis caeruleis variegato.

Idem flore albo.

Gramen aquaticum geniculatum spicatum f. aquat. spicatum Lobel. vel *Gramen spicatum*.

spicatum aquaticum, spica cylindracea brevi T. f. Gletsch. Wasser-Gras. Icon. Tab. 2. p. 530.

Gramen aquaticum fluitans multiplici spica vel Anatum T. ragi f. *Gramen paniculatum aquaticum fluitans* T. Endien. Gras/ in stilstehenden Wassern lc. Tab. 1. p. 530.

Gramen aquaticum junceum folio articulato f. *Juncus foliis articulatis, floribus umbellatis* T. in stilstehenden Wasserbächen. lc. 1. Tab. p. 529.

Gramen avenaceum montanum lanuginosum. T. Hafer. Gras/ in Bergichten Hölzern. lc. 17. Tab. p. 519.

Gramen avenaceum panicula sparsa locustis majoribus & cristatis. T. f. *Festuca avenacea sterilis elatior*, Hafer. Zwalch/ an denen Wegen und unter der Sommer-Saat. lc. 1. Tab. p. 544.

Gramen avenaceum locustis villosis crassioribus T. f. *Festuca graminea, glumis hirsutis*, Treff/ Zwalch/ an denen Rändern der Frucht-Aecker. lc. 2. Tab. p. 544.

Gramen Caninum arvense f. *Gramen lolium radice repente*, f. *Officinarium* T. Queckengras/ Taub. Korn/ Hunds-Gras/ Chien dent. fast aller Orten. lc. 5. Tab. p. 516.

Gramen Canin. longius radiculatum majus f. *Gramen paniculatum latifol. radice repente crassiore* T. groß Quecken-Gras.

Idem minus.

Gramen Cyperoides panicula sparsa ma-

maius f. *Cyperus vulgarior panicula sparsa* T. Groß-
Cypers. Gras / in Gräben und Teichen. Icon. 6.
Tab. p. 533.

Gramen Cyperoides latifolium, spicis tereti-
bus erectis T. longis. auf feuchten Wiesen und in
Gräben. Icon. Lob. 11. cujus nomen palustre
maius.

Gramen Cyperoides palustre majus, spi-
ca divisa, vel *Cyperinum palustre minus* Ic.
4. Tab. p. 533. Klein wasser Cyper. Gras.

Gramen Cyperoides minus panicula
sparsa nigricante. f. *Cyperus minimus panicula*
sparsa nigricante. T. Klein Ried. Gras / auf den Wie-
sen. Ic. 4. Tab. p. 533.

*Gramen Cyperoides polystachyon lanu-
ginosum* T. in Weinbergen und an den Enden der
Acker.

*Gramen hirsutum angustifolium mi-
nus paniculis albis*, f. *Juncus angustifolius villo-
sus*, floribus albis paniculatis, T. in Wäldern.

*Gramen junceum folio articulato syl-
vaticum* f. *Juncus nemorosus folio articulofo* T.
Wiesen. Gras. Ic. Tab. p. 535.

Gramen junceum spicatum. s. *Juncago*
palustris & *vulgaris*. T. auf trocknen Wiesen neben
den Wegen. Icon. 4. Tab. p. 535.

Gramen nodosum avenacea panicula T. s. bul-
bosum nodosum. Icon. Lob & C. B. Theatr.
bot. p. 1. pag. 18. Knoten. Gras / auf feuchten
Äckern.

Gra-

*Gramen pratense paniculatum majus folio la-
tiore* T. spica fere arundinacea. Neugras auf
allen Wiesen. Icon. 2. Tab. p. 515.

Gramen pratense paniculatum minus rubrum
T. potius minimum s. vulgatissimum, roth
Grassen. Gras / an allen Wegen. Icon. 15. &
16. Tab. p. 519.

Idem album, weiß Grassen. Gras.

Gramen pratense paniculatum medium T. 2.
secundum Dod. auf den Wiesen. Icon. Bauh.
Theatr. bot. p. 1. p. 30.

Gramen tremulum majus, aut *Lepo-
rinum* f. *Gramen paniculatum majus*, locustis ma-
gnis candicantibus tremulis T. Zitter- oder Hasen-
Gras / auf denen Wiesen. Amourettes tremblan-
tes. Ic. Tab. p. 541.

Gramen tremulum minus, panicula
parva, radice rufescente repente f. *Gramen pa-
niculatum locustis parvis tremulis*, T. Klein Zitter-
Gras. Icon. C. B. Prodr. p. 4.

Gratiola centauroides, floribus mo-
nopetalis dilute purpurascens f. *Digi-
talis minima*, *Gratiola dista* T. Gottes Gnade
Purgier. Kraut. wild Mart. Heide à pauvre ho-
me perenn. Moris. Hist. Oxon. p. 2. 479.

Eadem flore prorsus albo.

Helenium vulgare, flore luteo com-
posito radiato, folio integro lato incano. s.
Aster omnium maximus Helenium distus, T. Alant-
Wur-

Wurzel/ auf feuchten Wiesen. Année ou Enule Campan. perenn.

Helleborine angustifolia palustris T. flore herbaceo nonnihil candicante polypetalo. wild Nießtraut/ auf feuchten Wiesen bey Wäldern. Elleborine. Ic. 3. Clus. hist. p. 273. perenn.

Helleborine flore rotundo s. *Calceolus marianus* T. folio latiore nervolo, Marten. Schüßlein / in bergichten Orten. Icon. 1. Clus. hist. pag. 272. Sabor ou Soulier de notre Dame. perenn.

Helleborine montana angustifolia flore purpurascens T. wild schmalblättrichte Nießwurzel / in bergichten Orten. Ic. 1. Tab. p. 109. perenn.

Helleborine flore albo T. s. *montana latifolia*, flore albo. wilde weisse Nießwurzel/ bey der vorhergehenden. Ic. 2. Tab. p. 1100. perenn.

Hieracium asperum majore flore T. s. *Cichorium montanum angustifolium*, hirsutic asperum. Icon. 9. Tab. pag. 493. perenn. sub nomin. Hierac. Intybac. asper. in bergichten Orten.

Hieracium dentis leonis folio monoclonon subasperum s. *Hieracium Intybaceum* T. perenn. Icon. Tab. 6. p. 492. an denen Reinen grasichter Dertern.

Hieracium majus erectum angustifolium caule laevi T. flore luteo composito semi flosculo s. *Hieracium majus Dioscorid.* Icon. 1. Tab.

Tab. pag. 491. auff den Wiesen und brachliegenden Feldern. Grande Cichoree ou jaune. perenn.

Hyoscyamus vulgaris foetidus & *niger* T. caule folioque piloso, flosculis monopetalis infundibuliform. luteis striatis alba radice. Wilsen. Kraut / hln und wieder an denen Straßen. Jusquiame, noir. Icon. 1. Tab. p. 968. perenn.

Hypericum vulgare T. foliis glabris, caule rotundo, floribus rosaceis luteis. Sanct. Johannis-Kraut / auff ungebauten Feldern/ und in denen Hecken. Mille pertuis. Icon. 1. Tab. pag. 1249. perenn.

Hypericum bifolium glabrum non perforatum, caule quadrangulo subrubro, flosculis luteis minoribus. s. *Hypericum ascyron dictum*, caule quadrangulo. T. in Büschen und an feuchten Orten. Icon. 4. Tab. p. 1250 perenn.

Hypericum foliis latioribus atrovirentibus C. Sch. Johannis-Kraut/ mit dunkel-grünen breiten Blättern / in ausgestockten Hölzern und andern Orten. perenn.

Hypericum minus erectum T. klein Johannis-Kraut / auff den Rechen und andern grasichten Hügeln. perenn. Icon. J. B. 3. 383.

Hypericum minus repens supinum, foliis glabris s. *Hypericum minus supinum glabrum*. T. klein niedrig kriechend Sanct. Johannis. Kraut/ Clus. hist. CLXXXI perenn.

Hyssopifolia s. *Gratiola minor*, foliis polygoni, pallide virentibus, alternatim dispositis.

spostitis & pediculis carentibus, floribus elegantior coeruleis rosaceis s. *Salicaria byssopifolia folio latiore*. T. Graß. Polen / in feuchten Orten. Icon. C. B. prodr. p. 108. perenn.

Hyssopus vulgaris flore monopetalo coerulesco labiato. s. *Hyssopus officinarum coerulea spicata*. T. Hyssop / in Gärten und auf den Kirchhöfen. Hisope. Icon. 1. Tab. pag. 751. perenn.

Jacobaea vulgaris laciniata T. flore luteo radiato. Sancti Jacobi. Blum. Jacobée ou herbe de St. Jacques. Icon. Tab. p. 485. perenn. hin und wieder an den Straßen.

Jacobaea vulgaris altissima, foliis *Brucæ Artemisiæ*ve similibus & æmulis s. *Jacobaea vulgaris*, foliis instar *erucæ laciniatæ* T. in Weinbergen / und auf den Reinen der Aecker hoher Berge. Prioris est varietas.

Imperatoria major T. flore rosaceo albo umbellato, folio latiore diviso, radice crassa odorata. Meister. Wurzel / in bergichten Wäldern und in Gärten. Imperatrice ou Otryche. Ic. 1. Tab. p. 238. perenn.

Juncellus inutilis s. *Chamaeschænos* s. *Scirpus omnium minimus capitulo brevior*. T. Moosblumen / in sumpfsichten Wasserlöchern. perenn.

Juncellus minimus capitulis equiseti s. *Scirpus omnium minimus capitulo longiori* T. an den Rändern der Pfützen. perenn.

Juncus capitulis equiseti major, radice geniculata serpente s. *Scirpus Equiseti capitulo major*.

majori. T. Schachtelblumen / in sumpfsichten Orten. Junc. Icon. C. B. Theatr. bot. p. 186. perenn.

Juncus capitulis equiseti minor, & fluitans, s. *Scirpus equiseti capitulo minori*. T. beym Vorhergehenden / kleine kolbleichige Wasser- Blumen. perenn.

Juncus floridus major paludosus, floribus subpurpureis, folio gramineo triangulari. s. *Butomus flore roseo*. T. Cyper. oder Purpur-Schwertel / an den Reinen der Wasser. Junc. fleur. Icon. 6. Tab. p. 567. perenn.

Juncus vulgaris. s. *Lavis major*, panicula sparsa T. rufescente. Blumen in sumpfsichten Orten. Icon. C. B. Theatr. bot. 182. perenn.

Juncus lavis panicula non sparsa T. s. glomerato flore, caule striato. wiesen Blumen. Ic. 2. Tab. p. 565. perenn.

Juncus s. *Scirpus medius vel sylvaticus* Tab. Wald- Blumen. Icon. 3. C. B. Th. bot. p. 181. perenn.

Juniperus vulgaris arbor T. flore viridi amentaceo. Wachholderbaum / hin und wieder in denen Baurhöfen und Gärten. Icon. 2. Tab. p. 1538. Grand Genevriér.

Juniperus vulgaris fruticosa T. flore amentaceo viridi, foliis angustis acuminatis pungentibus. Wachholder. Strauch. Genevrier. in trocknen sandigen Orten. Ic. 1. Tab. p. 1557. perenn.

Lactuca montana vel sylvatica coerulea major s. *Chondrilla major sonchifolia*, flore purpurascente major T. composit. semisfloscul.

in Bergichten Wäldern. Condrille rouge. perenn.
Icon. J. B. 2. p. 1005.

Eadem minor. T. bey der vorhergehenden.

Lactuca sativa T. non capitata flore luteo composito. gemeiner Lattich. Icon. 1. Tab. p. 805. Lactue non pommée, in Gärten und Gärtners Feldern. ann.

Lactuca sativa capitata. T. s. sessilis. Kopf-Lattich / Lactue pommée, bey der vorhergehenden. Icon. 2. Tab. p. 806. ann.

Lactuca maculosa T. fusci ac veluti purpurei coloris, brauner oder Forellen-Lattich / Lactue tacheté. ann.

Lactuca crispa laciniata T. non capitata, krauser Salat. Icon. 3. Tab. p. 806. ann. Lactue frisé.

Lactuca crispa altera vel Sabaudica crispa. Ger. Endivien-Lattich. Icon. 4. Tab. p. 806. ann.

Lactuca dulcis Romana longa. T. s. Lactuca folio obscurius virente, semine nigro. brauner Sommer-Endivien / florentiner Salat. Lactue Romaine. ann.

Lactuca foliis Endivie. T. s. Intybacea. Tab. Icon. 4. p. 806. welscher Sommer-Endivien / Endivien-Lattich. ann.

Lactuca folio oblongo acuto. T. s. valde angusto oblongoque folio, spitzer Lattich / Icon. C. B. prodr. p. 60. ann.

Lactuca Italica laciniata. C. Bp. p. 60. Lactue

Lactue Royale. garter Endivien Lattich. ann. alle hin und wieder auff den Gärtners-Feldern.

Lampsana Dodonai T. Soncho affinis lampsana domestica floribus luteis compositis, folijs ut plurimum in lacinias divisjs, alias Sonchus sylvaticus. Tab. Ic. 8. p. 500. Wald-Sonchen, Kraut. perenn.

Lapathum folio acuto crispo T. floribus apetalis, Grind-Wurzel / spitziger krauser Ampfer / auff denen Wiesen. Icon. 3. Tab. p. 823. perenn.

Lapathum folio acuto plano T. flore stamineo spicato s. Lapathum officinarum. Grind oder Lenden-Wurzel / auf den Wiesen. Patience ou Parelle. Icon. 2. Tab. p. 823. perenn.

Lapathum folio acuto rubente. T. s. Lapathum sanguineum, Sanguis Draconis herba dictum, Drachen-Ampfer / hin und wieder in Feldern und Gärten. Sang. de Dragon, ou Patience rouge. Icon. Tab. p. 824. perenn.

Lapathum hortense semine non spinoso, florib. apetal. f. *Spinacia vulgaris*, capsula seminis non aculeata. T. Spinat. Epinars. Icon. 2. Tab. p. 809. ann.

Lapathum hortense, semine spinoso s. *Spinacia vulgaris*, capsula seminis aculeat. T. Spinat. Winessch. Icon. 1. Tab. p. 809. ann.

Lapathum hortense sterile s. *Spinacia vulgaris sterilis*, T. Spinat. ann.

Lathyrus sylvestris major. T. s. dumetorum, flore suave rubente papilionaceo. E 4 Wald,

Wald, Widen / in denen Hecken. Icon. 4. Tab. p. 885. perenn.

Lenticula palustris major, Commelin. folius superne viridibus interne rubentibus facile fragilibus, in denen Gräben.

Lenticula palustris quadrifolia C. B. aliàs. *Heder. palustris* T. Wasser, Riee / in stillstehenden Teichen. 4. feuilles d'eau. Ic. 2. Tab. p. 890. ann.

Lenticula trifulca C. B. s. *Hederula aquatica*. Lob Wasser, Ephen / in stießenden frischen Wasserbächeln. Lierre d'eau. ann. Ic. J. B. 3. 786.

Lenticula vulgaris C. B. s. *Muscus palustris*, *lenticula folio*. Meers Wasser / oder Endemisen. Lentille d'eau. Ic. 1. Tab. p. 890. ann.

Lilium montanum, floribus reflexis rubentibus. T. s. *Martagon sylvaticum* radice flava, floribus reflexis tetrapetalis. Goldwurz in bergichten Wäldern. Ic. 4. Tab. p. 1029. perenn.

Lilium montanum, floribus reflexis albis non punctatis. T. Goldwurz mit weissen Blumen. perenn.

Linaria annua minima, foliis hirsutis, floribus obsoleti fusci coloris, monopetalis personatis s. *Antirrhinum arvense minus* aut. *Linaria pumila vulgatiore arvensis*. T. Klein Feld, Dranc auff den Feldern. Icon. 4. Tab. pag. 1236. ann.

Linaria folioso capitulo lutea major. s. *Conyza linariae folio* T. auff sandigen bergichten Hügel. Icon. 3. Tab. p. 1209. perenn.

Linaria

Linaria vulgaris lutea flore majore T. *Linariae commune*, gemein Glachs, Kraut. Icon. J. B. 3. 456.

Linaria vulgaris flore pallido rictu aureo. T. Lein, oder Glachs, Kraut / mit bleich, gelben Blumen. auff aufgeworffenen Gräben. *Linariae*. Icon. 1. Tab. p. 1208. perenn.

Linum sativum T. s. *vulgare caeruleum* flore rosaceo. zahmer Glachs auff den Feldern. *Lin.* Icon. Tab. p. 1205. ann.

Linum sylvestre angustifolium, floribus dilute purpurascens. wilder Glachs / mit röthlichen Blumen / auff trocknen grasichten Orten. *Lin. sauvage*. Icon. 2. Tab. p. 1207. ann.

Lithospermum arvense, radice rubra, flore monopetalo albo infundibuliformi diviso. s. *Buglossum arvense annuum*, *Lithospermifolio*. T. wilder Seeln, oder Meer, Hirsen / in denen Sam, Feldern. Ic. 3. Tab. p. 233. Gremil. ann.

Lithospermum majus erectum. T. s. *Milium solis*. Wald, Hirsen / in hölzern und andern ungebauten Orten. Herbe aux perles. Icon. Tab. p. 1234. perenn.

Lunaria minor, rutaceo folio, floribus carens. s. *Osmunda foliis lunatis*. T. Mond, Kraut. *Lunariae*. Icon. Tab. p. 413. perenn.

Lupinus sylvestris flore luteo T. floribus papilionaceis, foliis digitatis & stellatis. Wicken, Bohnen / Lupinen. *Lupin.* Icon. 3. Tab. p. 881. ann.

F 5

Lych-

Lychnis segetalis major glabra, foliis perfoliatis, floribus rubris rosaceis. f. *Lychnis segetum rubra*, foliis perfoliatis. r. *Vaccaria didicta*. Rüsttraut / Eydweich / in denen Sommerfeldern. Icon. 3. Tab. p. 1253. ann.

Lychnis segetalis major hirsuta annua, pseudomelanthium dicta, flore rosaceo rubescente. f. *Lychnis segetum major*. r. Raden-Korn / Nagelblumen / in denen Frücht-Äckern. Ic. 5. Tab. p. 674. ann.

Lychnis sylvestris angustifolia, caliculis turgidis striatis. r. folio incano. wilde Himmelröslein / mit gestreiften Häußlein und schmalen Blättern. Moris. hist. 2. foliis angustioribus dignoscitur ab aliis. Passé fleur. perenn.

Lychnis sylvestris latifolia, caliculis turgidis striatis r. foliis hirsutis, breite blätterichte Himmlröslein / mit gestreiften Häußlein. Icon. Tab. p. 675. perenn.

Lychnis sylvestris noctiflora f. *Lychnis noctiflora* r. wilde Nacht-Marten-Röslein. Icon. Camer. sub nomine ocimoides nocti florum. ann.

Luteola herba salicis folio r. integro, luteo flore polypetalo anomalo. Streich-Kraut / auf dem aufgeworffenen Grund. Gande ou herbe jaune. Icon. Tab. p. 319. perenn.

Malva sylvestris, flore majore monopetalo campaniformi purpureo, venis saturate purpureis picto, folio sinuato. s. *Mal-*

Malva vulgaris folio sinuato flore majore. r. Röse oder Hasen-Papellen / mit gestreiften purpur-rothen Blumen / auf ungebauten fetten Orten. Icon. Tab. p. 1150. Mauve. Ic. Fuchs. hist. perenn.

Malva sylvestris minor repens, folio rotundo, flore albo minore. s. *Malva vulgaris flore minore folio rotundo*. r. Gänse-Papellen an denen Wegen. Petite mauve. Icon. 2. Tab. p. 1156. perenn.

Malva sylvestris perennis altissima, folio cannabino, flore purpureo amplo, monopetalo campaniformi. s. *Alcea vulgaris major*. r. Stigmars-Wurk / Feltisch / an denen Straßen. Alcée Mauve sauvage. Icon. 1. Tab. p. 1155. perenn.

Eadem foliis rotundis laciniatis. r. s. *Alcea foliis imis rotundioribus parum crenatis*, superioribus vero profunde sectis. Feltisch / untern runden Blättern. perenn.

Melampyrum cristatum, flore purpureo & albo r. monopetalo personato, rictu luteo Rüh-Watzen / in denen Frucht-Äckern. Blé noir ou de Vache. Ic. 5. J.B. 3. 440

Melampyrum coma caerulea. r. Blaugelb / Tag und Nacht in Wäldern. Ic. 1. Tab. p. 553. ann.

Melampyrum coma purpurascens, r. flore vario monopetalo personato, Wachtel oder Rüh-Watzen / in denen Frucht-Äckern. ann.

Melampyrum sylvaticum, flore luteo mono-

monopetalo personato, folio latiore s. *Melampyrum luteum latifolium* T. Wald. Hirse / in bergichten Wäldern / Ic. 1. Tab. p. 555. ann.

Melampyrum sylvaticum, luteum angustifolium. Wald. Hirse / mit schmalen Blättern / bey dem vorhergehenden. Icon. 2. Tab. p. 555. ann.

Melilotus major odorata violacea T. flore papilionaceo s. Lotus hortensis odora. Siebenzeit / mit blauen Blumen auff grasichten Orten. Lotier bleu. Ic. Tab. p. 896. perenn.

Melilotus officinar. T. flore luteo papilionaceo. Melilot. Stein. Klee. perenn. Icon. Tab. p. 895.

Eadem flore albo.

Melo rotundus parvus T. s. saccharinus Tab. Melon sucré, Zucker. Melonen. ann. Icon. 3. Tab. p. 856.

Melo vulgaris T. flore monopetalo campaniformi. Melonen. Melon. Icon. 1. Tab. p. 855. hin und wieder in Gärten und Feldern. ann.

Melo reticulatus T. Neq. Melon. Ic. J. B. 2. 244.

Mentha sylvestris rotundior folio T. s. Menthastrum folio rugoso rotundior. flore monopetalo labiato spicato, odore gravi. wilde Mönke, Menthe sauvage. Icon. Tab. 729. an feuchten Orten.

Eadem purpureo flore.

Mentha sylvestris longior folio T. s. Menthastrum

thastrum spicatum, folio longiore candicante hirsuto, floribus subpurpurei coloris spicatis. Ros. Mönke. Icon. Fuchs. H. Pl. ut & Matth. epit. p. 489. bey dem vorhergehenden. perenn.

Millefolium aquaticum s. Viola aquatica caule nudo & cavo, alias Foeniculum aquaticum 2d. Tab. flosculis rosaceis subpurpureascentibus. Wasser. Deutsen. Icon. 2. Tab. p. 186. Millefeuille d'eau. perenn.

Millefolium aquaticum flosculis albis ad foliorum nodos cruciformibus s. Potamogeton flosculis ad foliorum nodos. Wasser. Fenchel. Icon. Clus. hist. CCLII. sub nomin. Myriophyll. aquat. perenn.

Millefolium aquaticum, cornutum Casp. & Joh. B. gehörne Wasser. Garben. Kraut. Icon. Tab. 8. p. 188. perenn.

Millefolium aquaticum lenticulatum s. Lentibularia flore luteo galericulato alias, Foeniculum aquaticum galericulatum. T. Wasser. Helmkraut / in finstern stillstehenden Wasserlöchern. ann. Icon. Rivin. Introd. in rem herbar.

Millefolium aquaticum pennatum spicatum, flore purpureascente cruciformi spicato. s. Potamogeton folus pennatis. T. Feder. Fenchel / in stillstehenden Wassern. Icon. 7. Tab. p. 181. perenn.

Millefolium palustre s. Foeniculum aquaticum umbellatum capillaceo brevique folio

folio CB. p. Wasser. Fenchel. Icon. 1. Tab. p. 186, perenn.

Myagrū foetid. quod i. in prodr. CB. foliis pallide virent. flore pallide luteo cruciform. capsul. orbicular. stinckender Eetndotter / an denen aufgeworffenen Gräben. Myagrū puans. Tabul. 1. lit. a.

Myagrū monospermum caule hirsuto, foliis ad radicem asperis, siliqua rotunda, flore cruciformi s. *Rapistrum arvense folio auriculato*. T. Rübsen / in denen Frucht. Aeckern / zwischen der Saat. Ic. CB. prodr. p. 52. sub nomine myagr. simil. siliqua rot. ann.

Myagrū sativum flore cruciform. & semine majore, foliis minus cinereis s. *Alyssum segetum, foliis auriculatis acutis*. T. Lem. oder Glachs. Dotter / in Glachsflückern. Myagrū. Ic. 1. Tab. p. 1252.

Myrrhis sylvestris seminibus asperis, flosculis albis rosaceis umbellatis caule hirsuto. s. *Charophyllum sylvestre seminibus brevibus hirsutis*. T. an denen Zäunen. Cigue. ann.

Myrrhis annua nodosa, semine aspero s. *Charophyllum sylvestre alterum geniculis tumentibus*. Ic. Moris. H. R. Bles. ann.

Nasturtium hortense crispum latifolium. T. flore albo simplici cruciformi Krauser groß-blättrichter Garten. Kresse / Spanischer Kresse. Cres. son. Icon. CB. prod p. 44. ann.

Nasturtium hortense crispum angustifolium. T. krauser



trauser schmahlblättrichter Garten-Kresse. Icon. 4. Tab. p. 842. ann.

Nasturtium hortense vulgatum r. floribus albis cruciform. gemeiner Garten-Kresse. Cresson Aenois. Icon. 1. Tab. p. 841. ann.

Nasturtium siliculosum annuum, sylvestre verrucosum, foliis coronopi, flosculis albis cruciform. s. *Nasturtium sylvestre capsulis cristatis*. r. Feld-Kresse / an denen Weegen und andern ungebauten Orten. Icon. 4. Tab. p. 302. ann.

Nasturtium sylvestre tenuiter incisum, fructu minori r. s. *Nasturtium sylvestre osyridis* folio, floribus alb. cruciform. foliis dissectis vel *Thlaspi angustifol.* Fuchs. Icon. Tab. 16. p. 853. ann.

Nummularia major lutea, flore monopetalo rotato f. *Lysimachia humifusa*, folio rotundiore r. Pfennig-Kraut / Igel-Kraut / in feuchten Wiesen. Ic. 3. Tab. p. 1261. perenn. Nummulaire.

Nymphaea major, flore albo rosaceo, folio subrotundo. f. *Nymphaea alba major* r. Herk. Wurzel / weisse See- oder Wasser-Lilien. Neufar blanc, ou Lis d'Etang. Icon. 1. Tab. pag. 1117. perenn.

Nymphaea lutea major r. gelbe See-Blumen. Neufar jaune. Icon. 3. Tab. p. 1118. perenn.

Nymphaea alba minima C. B. flore albo

bo tripetalo folio asari s. Morsus ranæ Tab.
Froschbiß / in Wassern. Icon. p. 1131. perenn.

Oenanthe aquatica T. radice bulbosa; flo-
sculis albis rosaceis umbellatis s. Filipendu-
la aquatica. Wassersteinbrech / Wasser-Kraut / in
feuchten Gräben. Icon. 1. Tab. p. 421. perenn
Petite perle.

Oenanthe aquatica bulbulis carens s.
Filipendula aquatica non bulbota. Wasserstein-
brech / beyhm vorigen, in feuchten Gräben. Icon. Lob.
perenn.

Ophioglossum vulgatum T. s. officinar. flo-
ribus carens Matter Zünglein. Langue de serpent.
Icon. Tab. p. 1232. perenn.

Orchis muscam referens major T. foliis læ-
viore, flore grandiusculo. grosse Mücken præ-
sentirend. Stendel. Wurzel / in ausgestockten Höl-
zern / und anderen trocknen grasichten Orten. Icon.
2. Tab. pag. 1050. Orchis semblent une grande
mouche.

Orchis musca corpus referens minor T. galea
& alis herbidis. klein Fliegenstendel. Wurzel / in
trocknen Orten. Icon. 1. Tab. p. 1050. Orchis
semblent une petite mouche.

Orchis muscam referens lutea T. gelb Stendel.
Wurzel. Ic. 1. Tab. p. 1050. Orchis à mouche
jaune. perenn.

Orobanche radice dentata albicante
major, floribus subpurpureis hirsutis, mo-
nopetalis personatis. Anblatum flore ex rufo
can-

candicante s. Anblatum Cordi T. Ohnblatt Schup-
pen. Wurzel / St Georgen. Wurzel / in duncklen
bergichten Orten. Icon. Tab. p. 1231. Oroban-
che avec la racine dentelée. perenn.

Orobanche major caryophyllum olens T. flo-
re & caule luteo fusco. Orobanche. Erbens
Wurzel / Sommer. Wurzel. Icon. Tab. 1062.
unter denen Erbsen und anderen Orten mehr. Oro-
banche à un agreable senteur. perenn.

Orobis sylvaticus, foliis oblongis. T. & ner-
vosis, flolculis rubentib. papilionac. radice
tuberosa grosse Waldwicken. Orobe. Astraga-
loid. J. B. 2. 334.

Papaver argemone dictum, capitulo bre-
viore hirsuto ac rotundo, flore purpureo ro-
saceo. s. *Papaver erratic. capite oblongo hispido*. T.
in denen Frucht. Acker. Ic. 1. Tab. p. 83. ann.

Papaver argemone dictum, capitulo
longiore spinoso, flore purpureo rosaceo s.
Papaver erraticum capite longiore. T. Argemo-
nen. Köpfelein / in denen Sand. Feldern. Icon. 2.
Tab. p. 83. ann.

Papaver erratic. majus T. flore puniceo
rosaceo. rothe Korn. oder Klapper. Rosen. Pavor
rouge ou Coquelicoq. Icon. 1. Tab. p. 966. ann.

Papaver erraticum minus. T. fleitner wilder
Mohn / auf steinichten Aekern. Petite coquelicoq.
Icon. 2. Tab. p. 966. ann.

Idem foliis non dissectis T.

Parietaria vulgaris s. officinarum T. flore her-
baceo apetalis, folio hirsuto. Glas. Kraut / in
schat-

schattichen Orten und Mauren. Parietaire. Icon. Tab. p. 939. ann.

Pastinaca latifolia sativa T. florib. luteis Pasteney oder Pest. Nügel / in den Gärtnern. Feldern. Panais ou Pastenade. Icon. 1. Tab. p. 198. ann.

Pastinaca sylvestris latifolia T. floribus luteis rosaceis umbellatis albis, foliis latioribus dissectis. wilde Pastinacke. Pastenade ou Panais sauvage. Icon. 2. Tab. p. 198. ann.

Pastinaca sylvestris tenuifolia, puncta in medio rubra s. *Daucus officinar.* T. vel vulgaris, foliulis rosaceis albis umbellatis. Vogel-
nest / wilde Möhren / auf den Wiesen. Carotte sauvage. Icon. Tab. p. 195. perenn.

Pastinaca tenuifolia sativa, radice lutea, floribus rosaceis umbellatis s. *Daucus sativus* radice lutea. T. gelbe Möhren oder Ruben. Carotte jaune. Icon. 1. Tab. p. 192. ann.

Eadem radice alba. T. weiße Möhren oder Pest. Nügel. Carotte blanc. ann.

Pastinaca tenuifolia sativa, atro rubente radice s. *Daucus sativus* radice atrorubente. T. rothe Ruben / oder Rauen. Icon. 2. Tab. p. 192. Carotte rouge. ann.

Pepo s. Melo pepo compressus. T. sive non multo major rotunda, flore luteo campaniformi monopetalo. Pfaffen-Hütlein. Icon. 6. Tab. p. 857. ann.

Pepo oblongus T. s. major oblong. vel maximus oblong. Tab. grosse gemeine lange Kürbisen / hin und wieder auf den Gärtnern Feldern. Icon. 8. Tab. 857. *Pepo*

Pepo vulgaris. T. s. Cucurbita foliis asperis, flore luteo monopetal. campanif. grosser runder Kürbis / mit gelben Blumen und rauhen Blättern. Cource.

Peucedanum germanicum T. flore luteo rosaceo umbellato, foliis angustissimis divis. Sausendel / Haarstrang. Queue de pourceau ou Fenouil de porc. Icon. 1. Tab. p. 163. perenn.

Phaseolus vulgaris T. s. Smilax hortensis flore papilionaceo, foliis ternis ex uno pediculo caules scandente, absque capreolis. Haricot ou Fesvolles. Welsche Bohnen. Icon. Tab. p. 876. ann.

Pro coloris varietate, plures sunt species. uti ex praxi videre est. ann.

Polygala vulgaris major, flore anomalo coerulesco monopetalo personato, folio longo angusto. s. *Polygala major* T. Acker-Biole oder Kreuz-Blumen. Ic. 2. p. 1212. hin und wieder auff trockenen Wiesen. perenn.

Eadem flore albo.

Eadem flore purpureo.

Polygala vulgaris T. s. *Polygala coerulesca* Tab. gemeine blaue Kreuz-Blumen.

Eadem alba.

Eadem purpurea.

Polygonum angustissimum & acuto vel gramineo folio, minus repens s. *Alchimilla supina* gramineo folio, flore minore T. *Polygonum minus polycarpum* Tab. Ic. p. 1215. St. Johannis-Blut / auf ungebautem trockenem Erdrich. perenn. *Poly-*

Polygonum gramineo folio majus erectum f. minus alterum Tab. vel *Alchimilla erecta gramineo folio, minore flore* T. kleiner Wegst. Ic. Tab. p. 1217. perenn.

Polygonum minus f. *Herniaria glabra* T. vel officinarum repens, flosculis apetalis staminibus luteis. Bruch- oder Harn- Kraut/ in sandigen feuchten Orten. Ic. Tab. p. 1219. Herniole. ou Turquette perenn.

Polygonum minus f. *Herniaria hirsuta* T. prioris est varietas.

Potamogeton folio rotundiore lato, flore cruciformi spicato purpureo f. *Potamogeton rotundifolium* T. Sam- Kraut/ in Teichen und andern stillstehenden Wassern. Epideau. Icon. 1. Tab. 1117. perenn.

Potamogeton foliis latis splendentibus T. s. *Potamogeton aquis immerium*, folio pelucido late oblongo atque acuto. Samkraut/ mit breiten Blättern/ beyhm vorhergehenden. Ic. J. B. 3. 778. perenn.

Potamogeton foliis crispis f. *Lactuca ranarum* T. Groschlattich. Ic. Clus. hist. CCLII. perenn.

Pyrola rotundifolia major T. flore viridi rosaceo, folio rotundo crenato. Apfel- Wintergrün / Waldmangold / in feuchten Wäldern/ Pyrole. Ic. Tab. p. 1139. perenn.

Pyrola folio mucronato serrato, T. Birn- Wintergrün.

tergrün. Clus. hist. sub nomin. secund. tene-rior. CXVII. perenn.

Quinquefolium erectum flore luteo rosaceo, foliis protunde sectis, subtus argenteis, f. *Quinquefolium folio argenteo* T. groß Fünfffinger Kraut. Quinte feuille, auff durren auffgeworfenen Hügel. Ic. Tab. p. 351. perenn.

Quinquefolium palustre rubrum, foliis superne viridibus, inferne cinereis serratis, floribus purpureis rosaceis, f. *Pentaphylloides palustre rubrum* T. Wasser- Fünfffinger- Kraut. Quinte feuille rouge. Icon. 12. Tab. 354. perenn.

Quinquefolium sylvaticum procumbens, flore luteo rosaceo, folio dissecto, Tormentilla sylvestris T. Ruhr- Wurzel. Tormentille. Ic. Tab. p. 360. perenn.

Ranunculus palustris folio serrato T. vel *Ranunculus lanceatus serratus* Tab. Wasser- Dahlen- Fuß / in stehenden Wassern. perenn. Ic. 19. Tab. p. 112.

Rapa sativa oblonga T. s. *Rapa longa* flore cruciformi luteo. lange Winter- Rube/ auff denen Gärtners Feldern. Rave. Icon. Tab. p. 791. ann.

Idem & minus. kleine Stoppel- Rüben.

Rapum sativum orbiculatum majus, grosse Scheib- Rüben / beyhm vorhergehenden. Icon. Tab. 3. p. 790.

Idem & minus. kleine Scheib- oder Trüß- Rübeln. Icon. Tab. 4. p. 791. ann.

Rapa sativa rotunda radice candida T. s. Rapa-
pum vulgare. Tab. Icon. 1. p. 790. gemeine
runde Ruben. ann. Rave commune.

Rapunculus nemorosus, angustifolius
parvo flore, coerulesco monopetalo campa-
niformi. s. *Campanula nemorosa angustifolia* par-
vo flore T. Wald. Rapunzel. Icon. 7. Tab. p.
795. perenn.

Reseda vulgaris T. flore rosaceo sublu-
teo. Feld. Rauchen / an denen Wegen und Stras-
sen. Resede. Icon. Tab. p. 320. perenn.

Rosmarinus spontaneus folio latiore T. s. Fru-
ticosus coronarius ignobilior, floribus mo-
nopetalis labiatis subcoeruleis, foliis latiori-
bus oblongis atro virentibus, subtus incanis,
wilder Rosmarin, Romarin sauvage, perenn. in
Gärten.

Rosmarinus hortensis angustiore folio T. Garten.
Rosmarin. Romarin. Icon. Tab. p. 311. perenn.

Rubcola vel Rubia arvensis parva re-
pens, flore purpureo campaniformi. s. *Apa-*
rine supina pumila flore coerulesco T. In denen
Korn. Feldern. ann. Icon. J. B. 3. 719.

Rubia pratensis erecta quadrifolia la-
tifolia laevis, floribus albis monopetalis cam-
paniform. foliis acutis, caule quadrato ru-
fesciente gerficulato, semine subaspero rotun-
do. s. *Cruciata alpina latifolia laevis*. T. Groß
Stern Weger. Kraut / in Wäldern und Büschen,
perenn. Icon. J. B. 3. 716.

Rubia

Rubia Tinctorum sativa T. flore albo cam-
paniformi divito, foliis stellatis, radice ru-
bra, Färber. Röthe. Garance. Icon. 1. Tab. p.
1178. ann.

Rubia sylvestris monspessulana major T. flo-
ribus luteis, foliis asperis. Wilde Färber. Röth.
Icon. 2. Tab. p. 118. perenn.

Ruta canina s. *Scrophularia Ruta canina*
dicta vulgaris. T. flore monopetalo labiato
purpureo, folio dissecto. Rue des Chiens. Hunde-
Raute / in sandigen Orien am Rheinstrom Icon.
Tab. p. 412. perenn.

Sagitta aquatica major, folio latiore, flo-
re rosaceo albicante. 1. *Ranunculus palustris*
folio sagittato maximo T. Groß Pfeil. Kraut in stil-
len Wassern. Queue d'aronde. Icon. 1. Tab. p.
1121. perenn.

Sagitta aquatica minor latifolia s. *Ra-*
nunculus palustris, folio sagittato minore. T. Klein-
Pfeil. Kraut beym Vorhergehenden. Icon. 2. Tab.
p. 1121. perenn.

Sagitta aquatica minor, angustifolia s.
Ranunculus palustris, folio sagittato angustiore T.
gar Klein Pfeil. Kraut. Icon. 3. Tab. pag. 1121.
perenn.

Salvia major an sphacelus Theophrasti T.
flore monopet. labiat. purpur. grosse oder brei-
te Salbey. Icon. 1. Tab. 760. Grande Sauge.
perenn.

Salvia major, foliis ex luteo & viridi
varie-

G 4

variegatis H.R.P. gemahlet oder Groschen Salbey.
Sauge Franche, perenn.

Salvia minor aurita & non aurita T. Edel
oder sylter Salbey / Creutz Salbey. Icon. 2. Tab.
761. Petite Sauge. perenn.

Samolus Valerandi T. f. *Anagallis aqua-*
tica, folio rotundo non crenato, flori-
bus albis rotatis multifidis, pediculis longis
insidentibus in feuchten sumpfigen Orten.

Sambucus vulgar. fructu in umbella nigro T.
flore albo monopetalo rotato diviso, foliis
alatis. gemeiner Holderbaum. Sureau. Icon. 1.
Tab. p. 1440.

Sambucus, fructu in umbella viridi T. s. fru-
ctu albo. Holderbaum mit weissen Beeren / hin und
wieder in denen Höfen.

Saponaria major laevis, flore exalbido
purpurascente rosacco, folio glabro s. *Lych-*
nis sylvestris, quae *saponaria vulgo*. T. Seiffen-
Kraut / hin und wieder an denen Strassen. Sapo-
naire. Icon. Tab. p. 1115. perenn.

Saponaria s. *Lychnis sylvestris* purpu-
rea, staminibus violaceis nigris ac amplis,
nondum descripta. An verschiedenen Orten in Hes-
sen. perenn.

Scabiosa capitulo globosa T. foliis in minutis-
simas lacinias divisus s. *Scabiosa tenuifolia*,
flore coeruleo, composito flosculoso. Apo-
stem. Kraut / auf trocknen grasigten Orten. Sca-
biouse. Icon. 21. Tab. p. 445. perenn.

Scab-

Scabiosa folio integro hirsuto glabro T. *Succisa*
dicta, flore purpureo composito radice præ-
morsa. Teufels Abbiss. Succie Morlure, du diable.
Icon. Tab. p. 452. perenn.

Succisa folio integro glabro flore coeruleo T.

Scorzonera angustifolia, floribus com-
positis subcoeruleis. s. *Scorzonera angustifolia*
subcoerulea T. aut elatior 4. Clus. hist. schmal-
blättrichte Scorzonner / mit bläulichen Blumen / in
Gärten und Feldern. Scorzonaire. ann.

Scorzonera humilis latifolia nervosa. T. s. Pan-
nonica Tab. floribus composit. semistoscu-
los. luteis. breitblättrichte Scorzonera / in Gärten.
Icon. 2. Tab. p. 995. Scorzonaire. perenn.

Scorzonera humilis angustifolia T. s. Panoni-
ca 3. Clus. hist. schmal. blättrichte Scorzonera.
Icon. 6. Tab. p. 996. perenn.

Scorzonera laciniatis foliis T. *Tragopogon*
pratensis laciniatum, flore composito luteo
pallido majus. Boeckbart / Habermarg / mit grof-
sen gelben Blumen auf den Wiesen. Barbe de bouc.
Icon. 1. Tab. p. 994. perenn.

Scorzonera latifolia sinuata T. s. major Hi-
spanica 1. Clus. hist. gemeine Scorzonera / in
Gärten und Gärtners Feldern. Icon. 5. Tab. p.
996. Scorzonaire. perenn.

Scrophularia aquatica major T. foliis beto-
nicæ, flore monopetalo anomalo, subpur-
pureo auriculato, radice fibrosa s. *Betonica*

G 5

Tab.

Tab. Icon. p. 934. Scrophulaire, Braunwurzeln mit Betenien - Blättern / an denen feuchten Orten und Bässern. perenn.

Scrophularia palustris non fetida s. aquatica minor T. vel foemina Matth Icon. p. 867. weisse Braunwurzeln / an den Wasser - Gräben. perenn.

Scrophularia perennis radice nodosa alba foetida, flore monopetalo subpurpureo auriculato. s. *Scrophularia nodosa fetida*. T. Braunwurzeln / an feuchten Orten. Icon. Tab. p. 930. Scrophulaire, perenn.

Secale hybernum majus T. flore stamineo folio graminis. Roggen oder Korn. Seigle. Icon. Tab. 586. ann.

Secale vernum vel minus T. s. æstivum Dod. descript. Sommer - Roggen. ann.

Securidaca dumetorum major, flore vario, papilionaceo, siliquis articulatis. s. *Coronilla herbacea*, flore vario. T. Purpur - braune Peltischen / Vogelwicken. Ic. 4. Tab. p. 902. perenn.

Sedum minus teretifolium album T. flore albo rosaceo, folio longiusculo. weisse Rachen - Traublein / auff alten Dächern und Mauern. Icon. 2. Tab. p. 1226. perenn.

Sedum minimum luteum non acre, T. flosculis luteis, foliis vermiculatis insipidis s. *Sempervivum minus vermiculatum* insipidum, ungeschmackte kleine Rachen - Traublein / oder Mauer - Pfeffer / auff alten Mauern und steinichten Aeffern. perenn. J. B. 3. 695.

Sedum

Sedum minus, flore luteo folio acuto s. *Sedum minus luteum, folio acuto*. T. kleine gelbe Rachen - Traublein / auff steinichten brachliegenden Feldern. Triguemadame. Ic. 1. Tab. p. 1226.

Sedum parvum acre vel causticum, flosculis luteis, foliis vermiculatis acris. s. *Sedum parvum acre, flore luteo* T. Rachen - Traublein / auff steinichten ungebauten Aeffern. Pain de Oyseau. Ic. 3. Tab. p. 1226. perenn.

Sedum palustre, flore rubente, calice subrubro, succulento foliolo longiusculo subhirsuto s. *Sedum palustre subhirsutum*. T. Reth sumpfichte Rachen - Traublein / in feuchten Orten. Ic. Clus. Hist. LX. perenn.

Sedum parvum montan. luteum s. *Sedum minus* vj. f. *Alpinum* 1. Clus. Hist. LX. Berg-Rachen - Traublein. perenn.

Serpillum vulgare majus repens, flore purpureo T. monopetalo labiato. Feld - Quendel / oder Rummel / auff durren Hügeln. Serpolet. Icon. 4. Tab. 82 5. p. 749. perenn.

Idem flore albo.

Serpillum minus s. *Vulgare repens*, Clus. Hist. Ic. 7. p. 748. kleiner Feld - Quendel.

Solanum vesicarium s. *Alkekengi officinar.* T. repens, flore candido monopetalo rotato, diviso, bacca rubra. Juden - Kirschen / Schlitten / in Weinbergen und andern Orten mehr. Cuqueret ou Alkekenge. Ic. Tab. p. 976. perenn.

Solanum vesicarium, foliis moschum olea.

olentibus. Wohlrtechender Nachtschatten. *An nova species, vel differentia hac aut odor non à loco natali qui in dumetis umbrosus est, dependeat, ulterius considerandum relinquo.*

Sonchus asper laciniatus, folio dentis leonis, f. *Sonchus laciniatus spinosus*, folio dissecto. Sau. Distel mit eingeschnittenen Blättern. Icon. Tab. I. p. 494. ann.

Sonchus asper non laciniatus T. flosculis compositis luteis, foliis in ambitu non dissectis, caule fistuloso. Gänse- oder Sau- Distel. Laitron. in denen Gärten und Kraut-Feldern. Ic. I. Tab. p. 498. ann.

Sparganium ramosum T. flore staminea, in globulum digesto albo, fructu echinato, folio, gramineo triangulari. Juel. Knospen/ Riedegrass/ Degen-Kraut. Sparganium. Icon. I. Tab. p. 559. In sumpfigen Orten und Wehern. perenn.

Sparganium non ramosum T. beyh vorhergehenden. Icon. Job. B. 2. 541. perenn.

Sparganium minimum T. Icon. J. B. p. 2. 541. perenn.

Sphondylium vulgare, foliis hirsutis T. s. Branca urfina flosculis albis rosaceis. Wären. Tag/ auff den Wiesen. Berce. Icon. Tab. p. 280. perenn.

Idem floribus purpureis. T. perenn.

Stachys palustris foetida, flore monopetalo verticillato labiato purpureo. s. Galeopsis

leopsis palustris betonica folio, flore variegato. T. Brunnenvasser. Andorn/ in feuchten Gräben. Ic. 3. Tab. p. 767.

Stachascitrina angustifolia. T. s. *Elichrysum angustifolium*, floribus monopetalis, foliis incanis. Rhein. Blumen/ Regenpfeilem/ Immer-schön. Immorselle ou Amarante jaune. Ic. I. Tab. p. 778.

Stoechas citrina latifolia s. *Elichrysum latifolium*. Immer-schön. Immortelle à feuilles larges. Icon. 3. Tab. p. 778.

Tamarix fruticosa, folio crassiore, flore albo rosaceo s. *Tamariscus Germanica* T. Tamariscen / hin und wieder auf denen Sandbänken in dem Rhein. Icon. I. Tab. p. 1354. Tamaris.

Thalictrum majus florum staminibus purpuratcentibus. s. *Thalictrum majus siliqua angulosa aut striata*. T. Wiesen Raute / auf grasichten Heyden. Icon. I. Tab. p. 120. Rue des prez. perenn.

Thymus vulgaris folio latiore T. flore monopetalo candicante verticillato labiato. Thymian / in Gärten. Thim. ann.

Idem folio tenuiore. gemeiner Thymian / beyh vorhergehenden. Icon. Tab. p. 742.

Tithymalus characias rubens germanicus C. B. s. *Tertius austriacus* Clus. Hist. Wolfsmilch. Tithymale. perenn.

Tithymalus characias angustifolius. s. *Myrsinites tertius angustifol.* Tab. p. 988. Perenn. Tithy.

Tithymalus cyparissias capitulo rubente T. floribus monopetalis campaniform. globosis divis. Icon. 12. Tab. p. 990. perenn.

Tithymalus foliis pini, forte *Dioscoridis Pityula* s. *Cupressinus* L. Tab. p. 990. perenn.

Tithymalus foliis rotundis non crenatis T. s. *Esula rotunda* vel *Peplus* Tab. p. 993. runde Wollsmilch / in Gärten / Neben / und Gängen. ann.

Tithymalus myrsinites angustifolius T. s. secundus Tab. Myrten Wollsmilch. Icon. 8. Tab. p. 989. auff durren Wenden. perenn.

Tithymalus helioscopius T. vel solisequus, foliis majoribus, subrotundis crenatis vel *Esula* solisequa. Sonnenwendende Wollsmilch. Icon. 11. Tab. p. 990.

Tithymalus myrsinites fructu verruce simili T. s. verrucosus. Warzen Wollsmilch. Ic. J. B. 3. p. 671. perenn.

Tithymalus myrsintes latifolius T. s. legitimus Clus. breitblättriche Myrten Wollsmilch. Ic. 7. Tab. p. 989. perenn.

Tithymalus palustris fruticosus. f. *Esula palustr.* grosse Wollsmilch / in sumpfigen Orten. Ic. 1. Tab. p. 987. perenn.

Tithymalus sylvaticus, lunato flore T. toto anno folia retinens, immergrünende Wollsmilch. Ic. J. B. 3. 673. in Wäldern. perenn.

Tribuloides vulgare aquis innascens T. flore saeco articausc fructu subrotundo aculeato s. *Trib-*

Tribulus aquaticus C. B. weisse Wasser- oder Stachel-Blüße. Jesuiten-Wägen / in stillstehenden Wässern.

Tragopogon purpureo coeruleum porrifolio T. vulgo Artin. Doct. Hart oder Artisfen / mit schmalen Blättern und Purpur-blauen Blumen / in Gärten und Gärtners- Feldern. Arusi. Icon. 2. Tab. p. 994. ann.

Trifolium arvense echinatum, fructu minore, flore lut. papilion. s. *Medica echinata* *hirsuta* T. hin und wieder / an rauhen grasigten Orten. Klein-Zettlee.

Trifolium arvense humile spicatum L. *Lagopus* T. flore papilionaceo spicato. Rasen-Pfötlein / auff sandigen Feldern. Pied de Lievre. Icon. Tab. p. 908. perenn.

Trifolium falcatum aut *cornutum* L. *Trifolium siliqua cornuta* & *falcata*. T. alias *Lens* major repens, grosse kriechende Linsen / hin und wieder auff durren grasigten Orten. Icon. 3. Tab. p. 888. Luserne. perenn.

Trifolium montanum purpureum majus T. folio & spica brevior. Rother Berg-Klee / in Bergichten Wäldern. Ic. Clus. Hist. p. CCXLV. perenn.

Idem minus.

Trifolium montanum spica longissima rubente T. f. *Trifolium purpureum majus*, folio & spica longiore. J. B. 2. 375. grosser Berg-Haseln-Klee. perenn.

Trifolium spicatum, spica subrotunda rubra T. 3.

τ. s. *Lagopus maximus* spica purpurea, folio & facie tritoli pratensis, grosser Hasenflees in Hölzern. Pied de Lievre. ann.

Triticum hybernium spicis carens τ. floribus apetalis stamineis. Winter - Waizen. Froment ou Blé d'hyver. Icon. 1. p. 597. ann.

Triticum aristis longioribus, spica alba. τ. Welscher oder gepaarter Waizen. Ic. 1. Tab. p. 597. & Theatr. Bot. C. Bauh. p. 374. Blé loca. ann.

Triticum trimestre, s. *Aestivum*, spica longiore crassiore, aristis hord. similibus granis magis rotundis C. B. p. Blé de Mars. Sommer - Waizen. ann.

Triticum cyphinum, simplici folliculo τ. f. 4. Tab. p. 598. Welscher Waizen. Blé barbu. ann.

Veronica aquatica angustiore folio τ. f. Anagallis aquatica angustifolia scutellata, flore coeruleo monopetalo rotato diviso. schmalblättrichte Bachungen/ in Brunnen - Wassern. Ic. vid. Icon. J. B. 3. 791. ann.

Veronica aquatica major folio subrotundo τ. flore monopetalo coeruleo rotato, s. Beccabunga officinar., Bachung/ in feuchten Orten. Beccabunga. Ic. 4. Tab. p. 1094. perenn.

Eadem minor. Klein Bachung. Ic. 1. Tab. p. 1094.

Veronica aquatica major, folio oblongo. τ. flore coeruleo s. Beccabunga folio oblongo major grosse langblättrichte Bachung. Ic. 3. Tab. p. 1094. perenn.

Veronica

Veronica aquatica minor, folio oblongo, flore purpurascence. s. Beccabunga minor folio oblongo. Klein Bachung/ mit Polley - Blättern Ic. 2. Tab. p. 1094. perenn.

Vicia annua sylvestris major, foliulis papilionaceis purpureis, siliqua subrotunda folio rotundiore acuto s. *Vicia sepium* folio rotundiore acuto, semine nigro τ. Sommer - Saat - wicken / in denen Frucht - Feldern. Icon. 1. Clus. Hist. p. CCXXXV.

Vicia lutea foliis convolvuli minoris s. *Aphaca* Lobel. τ. florib. luteis papilionaceis. gelbe Wicken / in fetten Weizen - und Korn - Aekern. Icon. 3. Tab. p. 1092. ann.

Vicia sativa vulgaris semine nigro τ. flore papilionaceo foliis pinnatis. Feld - Wicken / Tauben - Wicken / in denen Aekern. ann.

Eadem alba

Viola lunaria major siliqua oblonga flore cruciformi purpureo s. *Lunaria major* siliqua longiore τ. Mondveil / Silber - Blatt / Bulbonac. in Bergen/ Ic. 2. Tab. p. 696. perenn.

Viola montana alba grandiflora τ. flosculo polypetalo albo, grosse weisse Berg - Viole. Violette de Montagne. perenn.

Viola montana coerulea grandiflora H. R. P. s. *Melanium montan.* Lugd. 1204. blaue Berg - Viole

Viola montana tricolor, flore variegato. τ. bunte Berg - Viole.

H

Viola

Viola montana lutea grandiflora. T. 3. *Viola montana* 3. aliud genus Clus. hist. 310. gelbe Berg-Violen.

Virga aurea angustifolia serrata flore luteo radiato, s. *Jacobaea alpina foliis longioribus serratis* T. Heydnisch Wundt Kraut. Icon. 4. Tab. p. 246. perenn.

Virga aurea angustifolia minus serrata, s. *Virga aurea vulgaris latifolia & officinar*. Steingünsel / auff steinigten ungebaueten Orten. Verge d'orée. perenn. Icon. J. B. 2. 1062.

Virga aurea latifolia serrata T. folio, hirsuto. breubläutrich gelberdt Heydnisch Wundt Kraut / in bergichten Wäldern. Ic. Tab. 1260. perenn.

MENSIS

JVLIVS & AVGVSTVS.

Abinthium ponticum s. *Romanum officinar*. T. folio latiore, floribus luteis flosculosis, s. *Abinthium vulgare majus*. Gemeiner Wermuth. Absinte ordinare. Ic., 1. Tab. p. 1. perenn.

Alsine scandens baccifera, s. *repens major* Clus. geniculata, floribus caryophyllæis herbaceo candidis, baccis nigris, radice fibrosa alba longa s. *Cucubalus*. T. in trocknen Buschichten Wäldern und Hecken / Busch-Hinerdarm. perenn. Ic. J. B. 2. 175.

Alsine palustris rotundifolia repens, folus portulacæ pinguibus, binis ex aduerso nascenti

Tab. II. lit. c. pag. 115.



lit. b.

J. G. Seupel. sc.

nascentibus, flosculis virescentibus rosaceis
f. *Portulaca aquatica* Ger. Emac. Wasser-Bur-
hel/ in sumpffichten Orten. perenn. Tabul. II. lit. b.

Alfne palustris minor serpillifolia T. cauli-
culo nodoso reflexo, foliis serpilli similibus
flosculis albis parvis coeruleis rosac. in feuch-
ten Orten. Bocc. rar. plant. 48. perenn.

Alfne palustris minor, folio oblongo
repens, flosculis parvis racemi modo junctis
albis rosaceis. Auf sandigem und tiefsichem Erd-
reich / zwischen dem Wasser. C. B. prodr. pag.
118. ann. Tabul. II. lit. c.

Alfne palustris tenuissimis foliis. f. *Sa-
xifraga palustris alfinifolia* Ger. Emac. Ray.
hist. 1032. in sandigem feuchten Boden. ann.

Angelica sativa, floribus luteis rosa-
ceis umbellatis foliis saturate viridibus dis-
sectis. s. *Imperatoria sativa* r. Angelique, oder
Engelmuth / Angelique. leon. 1. Tab. p. 230. in
Gärten und Bauren-Höfen. ann.

Angelica sylvestris major, floribus al-
bis rosaceis umbellatis, foliis latioribus dis-
sectis f. *Imperatoria pratensis major*. r. wilde An-
gelique / auff feuchten Wiesen und andern dunckel-
nassen Orten. Ic. 2. Tab. 230. Angelique sauva-
ge. ann.

Anisum semine majori, flosculis alb.
rosaceis umbellatis, folus imis integris sub-
rotundis, in ambitu nonnihil serratis, su-
perioribus vero profunde dissectis. s. *Apium*

anifum dictum semine suaveolente majore T. Anis
in Gärtners Feldern. Anis. Ic. Tab. p. 171. ann.

Idem *semine minori* T. gemeiner Anis.

Apium hortense s. *Petroselinum* T. foliis
latis dissectis, floribus rosaceis albis, Peterlein.
Perfil. Icon. 1. Tab. p. 264. ann.

Idem *crispum* s. *multifolium* Tab. Ic.
2. Tab. p. 264. ann.

*Apium aliis Sium maximum latifoli-
um*, floribus albis rosaceis umbellatis s. *Sium
latifolium*. T. Wasser. Peterlein / in Wasser. Grä-
ben. Berle. Icon. 2. Tab. p. 202. perenn.

Apium montanum, folio ampliore. T. petro-
solino simili, flosculis albis rosac. umbellat.
radice alba, succo lacteo turgente sive Oreo-
selinum Clus. hist. Berg. oder Hirschpeterlein/
Hirsch. Eppich / in bergichten Orten. Perfil de Mon-
tagne. Icon. 1. Tab. p. 276. perenn.

Apium palustre paludarium dictum s.
Apium officinar. T. flosculis albis rosaceis um-
bellatis. Wasser. Eppich / in sumpfsichten Orten. Ic.
1. Tab. p. 276.

Apium sylvestre lacteo succo turgens,
flosculis albis rosac. umbell. radice nigra s.
Thyselinum Plin. T. Officinis Olsnitium Desi-
nis. Wurzel / in feuchten und schattichten Orten.
Icon. Lobel 711. perenn.

Aristolochia longa vera T. floribus luteis
monopetalis tubulatis s. Longa 1. Clus. hist.

Aris

Aristolochie longue. lange Osterlucy. Ic. 2. Tab.
p. 1141. perenn.

Aster atticus, flore purpureo coeruleo
composito radiato. s. *Aster atticus coeruleus*. T.
Blauftern. Kraut. / in Gärten. Icon. 1. Tab. p.
716. perenn.

Aster canadensis annuus flore papposo
H. R. P. s. *Virga aurea virginiana annua* Zanon.
205. T. potius *Conyza thyrsoides* floribus mi-
nutis ramosa. hin und wieder an dörren Orten.

Aster luteus, foliolis ad florem rigi-
dis, foliis per caulem spatis, mollibus la-
nuginosis candicantibus, vel *Atticus legiti-
mus* s. 1. Clus. hist. Massilioticus Tab. 9.
Asteriscus annuus, foliolis ad florem rigidis. T.
Stern. Kraut / Icon. Tab. p. 1245. bey Wäl-
dern am Rheinstrom. perenn.

Aster luteus, hirsuto salicis folio, flore
composito. s. *Quintus Clusii* Hist. plant. in
bergichten Wäldern / und sonst hin und wieder am
Rheinstrom. Icon. 3. Tab. p. 717. perenn.

Aster luteus major foliis succitæ s. 3. Au-
striacus 1. Clus. hist. in Bergen und Wäldern.

Atriplex angustifolia laciniata minor. s.
Chenopodium angustifolium minus laciniatum. T.
Icon. Joh. B. 2. 972. ann.

Atriplex, angusto oblongo folio T. floribus
pallide virentibus staminibus s. *Atriplex vul-
garis* cum folliculis J. B. 2. 973. Melde / hin und
wieder bey Mist. Stätten und aufgeworffenen Grä-
ben. ann.

H 3

Attri-

Atriplex hortensis alba f. pallide virens, flore stamineo subluteo, foliis latis pinguibus mucronatis, weisse Melde. Arroche, Bonnes Dames. in denen Kraut-Aeckern. ann.

Atriplex hortensis rubra T. f. folio rubro rothe Garten-Melde/ hin und wieder in Gärten. Ic. 1. Tab. p. 810. Arroche rouge. ann.

Atriplex sylvestris foetida f. *Chenopodium foetidum* T. Stinkende Melde. Ic. Tab. p. 812. an denen Wegen der Mauern. ann.

Atriplex sylvestris folio sinuato saturate virente, spica rubra f. *Chenopodium folio laciniato, coma purpurascens* T. wilde Melde an denen feuchten Wasser-Gräben und mistigen Orten. Patte d'oye. Ic. 1. Tab. p. 810. ann.

Atriplex sylvestris latifolia, folio sinuato, saturate virente, spica virente f. *Chenopodium folio laciniato, coma virente*, T. wilde Melde/ bey der vorhergehenden. Ic. 2. Tab. p. 812. ann.

Atriplex sylvestris latifolia, folio acutiore & ramosiore, f. *Chenopodium Pes asserinus* 2dus Tab. T. Gänse-Fuß/ Schweins-Fodt. Ic. Tab. p. 812. ann.

Atriplex sylvestris folio sinuato candicante f. *Chenopodium folio sinuato candicante* T. hin und wieder bey Mist-Gräben und Aeckern. Ic. 2. Tab. p. 810. ann.

Atriplex sylvestris, Polyspermum dictum.

atum. f. *Chenopodium betafolio*. T. Icon. Tab. p. 1219. Bléte sauvage. ann.

Bardana major, flore composito flosculoso purpureo folio latiore integro f. *Lappa major* *Arctium Dioscoridis* T. grosse Kletten/ Erindmurg/ an denen Wegen. Bardane ou Gletteron. Ic. 1. Tab. p. 1157. perenn.

Bardana minor, floribus stamineis flosculosis foliis sinuatis f. *Xanthium* T. kleine Kletten, Weisers-Käufel/ hin und wieder an denen Straßen. Petit Gletteron. Icon. Matth. epit. p. 926. ann.

Bellis lutea arvensis, floribus compositis radiatis, foliis profunde incisissimis major, f. *Chrysanthemum folio minus secto glauco*. T. vel Scgetum Lob. Ic. 552. Gold-Blume unter dem Getraide/ Streich-Blumen. ann.

Bistorta major radice magis intorta. T. folio integro, flore stamineo incarnato spicato diviso. Nattermurg/ auff feuchten Wiesen. Bistorte. Icon. 1. Tab. p. 82. perenn.

Bistorta major, radice minus intorta T. foliis rugiosioribus. Ic. J. B. 3. 538. bey der vorhergehenden. perenn.

Blattaria folio oblongo laciniato. T. flore luteo monopetalo rotato, staminulis purpureis, in sandigen Orten. Ic. 5. Tab. p. 959. Herbe aux mites Blattaire. Schaben-Kraut. ann.

Blitum rubrum majus rectum T. f. Spontanum, flore stamineo spicato rubente, hin

und wieder in Gärten/ rother Meyer. Ic. 1. Tab. p. 827. Blete rouge. ann.

Idem minus T. vel supin. Lob le Matth. epit. p. 235. ann.

Blitum album majus T. folio subalbido. Blete blanc. weisser Meyer/ in denen Kraut Aeckern. Icon. 2. Tab. p. 817. ann.

Blitum album minus s. *sylvestre spicatum* T. weisser kleiner / oder spitziger Meyer. Icon. Fuchs. hist. plant. & Matth. epit. p. 237. Blete sauvage. fast aller Orten. ann.

Blitum sylvestre spicatum T. s. *Blitum rubrum minus* Camer Epit. 235. kleiner rother Meyer / auf feuchten sandigen Orten. ann. Icon. J. B. 2. 967.

Blitum sylvestre spicatum foliis ex albo & viridi variegatis T. subrotundis s. *Blitum album minus* J. B. 2. 967. gestrecker Meyer / hin und wieder an Mauern und Gärten. ann.

Brunella coerulea flore magno T. monopetalo labiato folio non laciniato. Braunelle/ mit grossen Blumen/ an denen Hügel und Bergen. Brunelle. Icon. 1. Tab. p. 944. perenn.

Brunella folio laciniato T. flore magno purpureo, grosse Braunelle / auf Wiesen und anderen grasichten Orten. Icon 2. Tab. p. 944. perenn.

Bulbocastanum majus, folio apij T. floribus albis rosaceis umbellatis. Erd. Nüss / Erd. Castanien / auf den Aeckern. Terre noix. Icon. 1. Tab. p. 422. perenn.

Buph-

Buphthalmum Tanacetii minoris folio T. flo-
sculis compositis luteis radiatis s. Chamæ-
melum chrysanthemum Fuchs. Hist plant.
Oegen : Aug / auff den Wiesen und andern gra-
sichten Orten. Oeil de boeuf. Icon. Matth. epit.
p. 651. perenn.

Bupleurum perenne, folio rigido. T. lato in-
tegro, flosculis luteis rosaceis umbellatis,
Nasen Dohren / mit breiten Blättern auff steinich-
ten Bergichten Orten. Icon. 1. Tab. pag. 1258.
perenn.

Bupleurum folio subrotundo s. *vulgatissimum*
T. umbella lutea. Schmalblättrichte Nasenohr-
lein/ an denen Rändern der Weinberge. Ic. 2. Tab.
p. 1258. perenn.

*Bupleurum perfoliatum rotundifolium annu-
um* T. s. *Perfoliata arvensis* annua, flosculis
subluteis umbellatis rosac. Durchwachs / in
Aeckern und Gärten. Icon. 1. Tab. p. 1140. Perce
feuille. ann.

Calamintha arvensis verticillata T. floribus
monopetalis labiatis, foliis hirtutis, an wäse-
richtigen Orten. Icon. 1. Tab. p. 737. Pouillot ou
Calamente sauvage. Ackerminz. perenn.

Calamintha pulegii odore s. *Nepeta* T. flore
minore foliis maculatis s. *Calamintha ar-
vensis* 2d. Tab. Ic. p. 736. Ackerminz. ann.

Calamintha vulgaris vel officinar. Germanic.
T. flore magno, foliis pulegi 1. *Calamintha*

H 5

vul-

vulgaris montana. Bergmünze. Ic. 1. Tab. p. 733. auff Bergen. Calamente. perenn.

Campanula vulgarior foliis Urticae, seu major & asperior r. flore monopetalo coeruleo campaniformi, quandoque & albo, radice alba nodosa. Zapfen-Kraut/ Hals-Kraut/ grosse Baum-Glocken. Icon. 2. Tab. p. 797. Campanule ou Gands nôtre Dame. perenn.

Campanula pratensis s. flore conglomerato r. monopetalo coeruleo campaniformi, klein Hals-Kraut / auff den Wiesen. Icon. 3. p. 796. perenn.

Cannabina aquatica, folio tripartito diviso, flore minus pulchro flosculoso s. *Bidens foliis tripartito divisis* r. Wasser, Dosten/ Bohnen-Jgel. Icon. 2. Tab. p. 336. Eupatoire bâlard.

Cannabina aquatica, folio non diviso, flore luteo pulchriore odorato s. *Bidens folio non dissecto*. r. Icon. 2/ Tab. p. 336. Wasser-Dosten. perenn.

Carduus arvensis, in avena proveniens repens, aut Vinearum lævicaulis, flore purpureo composito flosculoso, folio sonchi. s. *Cirsium arvense sonchi folio, radice repente flore purpurascente*. r. Haber, oder Acker-Distel in Haber-Feldern. Chardon aux asnes. Icon. Tab. p. 1079. perenn.

Carduus lanceolatus latifolius, flore purpureo r. flosculoso, capitulo majore. Spectra Distel/

Distel/ an denen Wegen und Strassen. Ic. Tab. p. 1078. ann.

Idem flore albo.

Carduus Marianus, l. *albis maculis notatus* r. vel vulgaris, folio ima parte albido lanuginoso, superne viridi, flore purpureo. Marien-Distel/ hñ und wieder auff dem ausgeworffenem Murrath der Gärten. Chardon de nôtre Dame ou Artichaut sauvage. Ic. Tab. p. 1078. ann.

Carduus nutans, r. capitulo magno singulari pendente, flore purpureo suaveolente, tota stirpe spinosus. Stechende Distel mit hangenden Köpfen/ an denen Wegen und Strassen. perenn.

Idem flore albo.

Carduus palustris, capitulo viscoso, foliis atrovirentibus crispis ac sinuosis, per margineum rarioribus spinis cinctis l. *Cirsium pratense polyccephalon vulgare*. r. auf den Wiesen/ bey Wäldern. perenn.

Carduus pratensis asphodeli radice latifolius, s. *Cirsium pratense asphodeli radice latifolium* T. Auf feuchten Wiesen Ic. 4. Tab. p. 436. perenn.

Carduus pratensis latifolius flore ex luteo pallente, foliis tenuibus laciniatis s. *Cnicus pratensis Acanthi folio, flore flavescente* T. Wiesen, Kohl/ Wiesen-Distel perenn. auf feuchten Wiesen.

Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris,

garis, caule crispo, capitulis minoribus purpureis, quandoque & albis s. *Carduus caule crispo* T. Weg-Distel lc. 1. Tab. p. 1080. an denen Wegen und aufgeworffnen Gräben. ann.

Carduus Stellatus T. foliis papaveris erratici, flore intense purpureo & albo. Stein-Distel auf trocknen Orten. Chardon étoilé, lc. 2. Tab. p. 1080. perenn.

Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris T. flore purpureo s. *Acanthium vulgare* flore purpureo & albo. Weg-Distel/ mit Purpurfarbenen Blumen an dürren Orten und an den Straffen. Chardon commun ou Epine rouge, Icon. 1. Tab. p. 1063. ann.

Carlina acaulos magno flore T. f. radiato sessili. Weiße Ebers-Wurzel. Carline ou Caméleon blanc. Icon. 1. Tab. 1068. auff den Gebürgen. perenn.

Carlina aculos, minore purpureo flore f. *Cirsium acaulos flore purpureo*. T. Kleine Ebers-Wurzel/ auff dürren grasichten Orten Icon. Clus. Hist. CLVI. perenn.

Carlina caulescens, magno flore purpureo T. f. *Chamaeleon albus vulgaris*, Clus. hist. gemeine Ebers-Wurzel/ auff den Gebürgen. lc. 2. Tab. p. 1068. Carlite noir. perenn.

Carthamus f. *Cnicus sativus* T. flore luteo composito. Safflor/ wilder Saffran/ Safran hâtard ou Graine de perroquet. in denen Feldern. lc. Clus. Hist. CLII. sub nomin. *Cnicus vulgaris*. Caryo-

Caryophyllus minimus muralis f. *Lych-nis annua minima flore caryophylleo carneo lineis purpureis distincto*. T. zwischen den Steinlein auff sandigen Boden/ bey fließenden Wassern. lc. Joh. Bauh. 3. 338. ann.

Caucalis arvensis echinata magno flore T. albo rosaceo umbellato; foliis profundius incis vel dissectis. Kletten-Körbel/ auf brachliegenden sandigen Aeckern. *Caucalis*. lc. 1. Tab 290. ann.

Caucalis vulgaris semine aspero, flo-sculis rubentibus f. *Daucus annuus minor floribus rubentibus* T. an den Gärten. ann. lc. J. B. 3. part. 2. 83. sub nomin. Anthrisc.

Eadem flore albo.

Centaurium minus T. flore purpureo monopetalo infundibuliformi diviso. Tausend-gülde-Kraut/ auf trocknen Wiesen. Petite Centaurée. ann. lc. 1. Tab. p. 1166.

Idem flore albo T.

Centaurium luteum perfoliatum T. parvum flore flavo Clus. hist. Gelb Tausendgülden. ann. lc. 4. Tab. p. 1166.

Cicuta major T. f. vulgaris. flore albo rosaceo umbellato. caule maculoso & non maculoso Schüring/Doll-Kraut in denen Hecken und Gärten. Cigue lc. 1. Tab. p. 1170. ann.

Cicuta minor Petroselino similis T. flore albo rosac. umbell. Hundss- oder Bleich-Peterstein. lc. Tab. p. 273. ann.

Cireca

Circaea solanifolia dicta major, flore dipetalo, petalis bifidis s. *Circaea Lutetiana* T. Cicee in feuchten schattichten Büschen / Wald. Kleiten Lob. lc. p. 266. perenn.

Circaea solanifolia alpina minor T. *Circaea minima*. T. Bey der vorhergehenden. perenn.

Clematitis sylvestris latifolia dentata, flore rosaceo albo, s. *Clematitis sylvestris latifolia* T. Breit, blättrichter Gänse, Werd / Wald, Neben oder Ketten in Zäunen und Hecken. Herbe aux gueux. lc. 2. Tab. p. 1289. perenn.

Clematitis sylvestris latifolia, foliis non incis T. s. folio integro. Wald, Neben. lc. J. B. 2. 226.

Clematis, s. *flamula repens* T. s. *Clematis* vel *Flamula scandens tenuifolia*, flore albo rosaceo. Ketten in denen Zäunen / lc. 1. Tab. p. 1273. perenn.

Clinopodium arvense ozymi facie T. acinos multis, flore monopetalo purpureo verticillato labiato. lc. 2. Tab. p. 737. Getra. Polen auf sandigen Aekern. Basilic sauvage. ann.

Clinopodium majus origano simile, flore monopetalo purpureo labiato. s. *Clinopodium origano simile elatius majore folio* T. Wirbel-Weiß / plante de bonne odeur. lc. 1. Tab. p. 736.

Cnicus sylvestris hirsutior seu Carduus Benedictus T. flore composito flosculoso luteo Cardebenedicten. Chardon beut. Auf denen Gärtners Feldern. ann. Idem

Idem flore albo, perenn.

Cnicus sylvestris spinosior, flore composito luteo s. *Carlina sylvestris vulgaris* T. Drei-Distel / auf dürrem Erdrich lc. Tab. p. 1076. ann.

Convolvulus minor hederulae folio scandens, flore apetalo, semine triangulo s. *Tagopyrum vulgare scandens* T. Buch- oder Schwarzwinde / auf ungebauten Feldern / Blé noir lc. Tab. p. 1264. ann.

Cuminum pratense, s. *Carum vulgare*, flosculis albis rosaceis umbellatis, foliis profunde dissectis ac tenuioribus. s. *Carvi* T. Wiesen-Kümmel auf dünnen Wiesen. Carvi lc. Tab. p. 142. ann.

Cuscuta major T. flore monopetalo campaniformi, ex rubro pallescente, Seiden- oder Glachs-Kraut / an trocknen Orten in den Hecken. lc. Tab. p. 1302. ann.

Cuscuta minor T. Klein Glachs-Kraut / Thim-Seiden. lc. Tab. 743. ann.

Daucus alsaticus, floribus subluteis rosaceis, umbella parva s. *Oreoselinum pratense cicutae folio* T. radice oblonga gelber Vogels-Nest / auf feuchten Wiesen. lc. C. B. prod. 77.

Daucus montanus apii folio major, floribus alb. rosac. umbellat. alias Cervaria nigra s. *Oreoselinum apii folio majus* T. schwarze Dirsch-Wurzel auf den Bergen Persil de montagne lc. 3. Tab. p. 313.

Dictamnus

Dictamnus albus, flore purpureo polypetalo, foliis pinnatis subrotundis. s. *Franklinella* Ic. Tab. p. 1159. perenn. weißer Dittam auf Bergen.

Digitalis folio virescente latiore, flore monopetal. anomalo tubulato magno luteo patulo, radice incurva fibrosa s. *Digitalis lutea magno flore* T. groß Finger Hütlein. Kraut in bergichten Wäldern. Digitale jaune. Ic. T. 960. perenn.

Digitalis purpurea T. folio aspero. Große rothe Finger. Hütlein. Digitale rouge. Ic. Tab. p. 960. perenn.

Dipsacus folio laciniato T. floribus compositis albis, weiße Weber. Disteln. Ic. 3. Tab. p. 1071. perenn.

Dipsacus sativus T. s. *Carduus fullonum*, flore albo composito flosculoto, Weber. Kerk. Kanten. Distel in denen Feldern / Charaon de foulon. Ic. 1. Tab. p. 1070. perenn.

Dipsacus sylvestris capitulo minore T. s. *Virga pastoris minor*, floribus composit. albis flosculos. Wilde Kanten. Distel. Ic. Tab. p. 1071. Petite verge à berger. An denen Wegen. perenn.

Dipsacus sylvestris aut virga pastoris major T. s. *Labrum Veneris*, floribus compositis flosculosis rubris, große Weber. Distel an denen Straßen. Ic. 2. Tab. p. 1070. Chardon à foulon rouge. perenn.

Dracunculus hortensis, floribus compositis flosculosis, foliis oblongis acrioribus
s. *Abrota-*

s. *Abrotanum lini folio acriori & odorato* T. *Elstragon* Ic. Tab. 855. perenn. auff Gärtens. Feldern und in Gärten.

Dracunculus palustris sive radice arundinacea Plin. c. 13. vel *Arum aquatic.* flore monopetal. aurito, folio non diviso. Wasser. Aron in stüßstehenden Wassern. perenn. Ic. Tab. 1122.

Equiletrum foetidum majus sub aqua repens, foliis latioribus. Icon. C B prodr. p. 25. stinkender Pferde. Schwanz in schleimichten Wassern. perenn.

Eryngium arvense, foliis serræ similibus, radice reptatrice, flosculis albis rosaceis umbellatis s. *Ammi perenne umbellatum* T. Baussen auff steinichten Aekern. Icon. 4. Tab. p. 300. perenn.

Erysimum vulgare T. flosculis luteis cruciform. Wegens. auff dürrer Drien. Velar. Ic. 1. Tab. p. 840. ann.

Eupatorium Cannabinum T. folio trifido, flore composito nudo flosculoso rubello. Rungendentraut. Eupatoires. Icon. 1. T. p. 336. perenn.

Euphrasia pratensis lutea flosculis monopetalis personatis s. *Pedicularis serotina lutea* T. gelber Augen. Trost. ann.

Euphrasia pratensis rubra s. *Pedicularis serotina purpurascens*. flore T. monopetal. personato. Drauner Augen. Trost. auff feuchten Wiesen. Ic. Tab. p. 646. perenn.

Faba rotunda oblonga minor s. Equina alba T. weiße Bohnen.

Eadem nigra schwarze Bohnen.

Fagopyrum vulgare erectum T. folio hæd-raceo, floribus purpurascensibus apetalis. Heide-Korn in denen Feldern. Blé noir. Icon. Tab. p. 646. ann.

Filix rhætica tenuissime dentata. T. s. *Filix palustris maxima* C. B. pr. 150. in dunkeln feuchten Wäldern. perenn.

Filix ramosa non dentata florida. s. *Os-munda vulgaris* & *palustris*. T. *Filix florida* Parckins. theatr. 1038. in feuchten dunkeln felsich-ten Dertern. perenn.

Feniculum vulgare germanicum T. foliis ca-pillaceis, floribus rosaceis umbellatis luteis. Fenchel in Gärten. Fenouil. Icon. 2. Tab. p. 147. perenn.

Fru mentum Indicum Mays dictum, flo-ribus apetalis granis luteis, folio lato gra-minco s. *Mays* T. Türkisch Korn. Blé de Turquie. Ic. Tab. p. 617. ann.

Idem granis rubentibus, nigricantibus, coerulescentibus, ex rubro & luteo variegatis. vid. Theatr. Botan. Bauh. P. I. p. 500.

Fumaria officinar. flore purpureo T. papilio-naceo polypetalo. Erdrrauch / Taubentropf / Fume-terre. ann. Ic. 1. Tab. p. 82.

Galeopsis procerior caliculis aculeatis, flore pur-purascens. s. *Urtica aculeata* folus ferratis. Diefel-

Diesel-Hanf / in feuchten Gräben an den Zäunen. Ic. 2. Tab. p. 936. perenn.

Eadem flore albo.

Gentiana cruciata T. radice pertusa & non pertusa alba longa & amara, floribus purpu-reis monopetal. campanulatis, erectis & cru-ciatim luggestis. Modelgeer-Creus / oder Bitter-burg / auf grasigten Boden. Icon. Tab. p. 1105. *Gentiane croisée*. perenn.

Gentiana palustris angustifolia Pneu-monanthe dicta, flore violaceo, radice lon-ga fibrosa amara s. *Gentiana autumnalis major angustifolia*. T. Lungenblumen / beyh vorhergehenden. perenn. Ic. Tab. p. 1176.

Gnaphalium majus angustifolium s. fo-lio oblongo incano, floribus compositis flo-sculosis, juxta caulis longitudinem prodeun-tibus minimis. s. *Elichrysum spicat.* T. groß schmal-blättricht Ruhrkraut. Ic. 3. Tab. p. 780. ann.

Gnaphalium majus vulgare, floribus co-agmentatis compositis, nudis s. *Filago* & *Im-pia* T. Feldkaken / Ruhrkraut / auf ungebauten Feldern. Herbe à Cotton. Ic. 2. Tab. p. 781. ann.

Gnaphalium minus repens (rectius ere-ctum) s. *Filago minor*. T. Kleine fieschende Feld-Kaken / auf ungebauten Feldern. Ic. 5. Tab. p. 781.

Gnaphalium medium s. *Elichrysum aqua-ticum ramosum minus*, capitulis foliaceis nigris. T. Klein Wasserruhrkraut. Icon. Joh. J. B. 3. 159.

Gnaphalium supinum longitol. humile
I 2 ramo-

ramosum, capitulis nigris multis simul congestis s. *Filago palustris*, capitulis nigricantibus *supina*, in ausgetrockneten sumpfsichten Orten. ann.

Gnaphalium vulgare tenuifolium s. *Filago vulgaris tenuissimo folio erecta*. r. Acker-Ruhrkraut/ auf denen Aekern/ nach vollendter Erndte. lc. 3. J. B. 3. 159.

Gramen aquaticum paniculat. miliaceum T. s. *Gramen miliaceum*, Ray, Synops. 255. Hirse-Rohr in Gräben. perenn.

Gramen Cyperoides angustifol. spicis sessilibus in folior. alis s. *Cyperoides angustifol. spicis sessilibus in folior. alis* T. in feuchten Wäldern. perenn.

Gramen Parnassi, flore albo simplici rosaceo, folio subrotundo s. *Parnassia palustris* & *vulgaris* T. Leberblumen auf grasichten feuchten Orten. lc. 2. Tab. p. 527. perenn.

Helleborus albus, flore ex viridi albescente s. *Veratrum flore subviridi* T. Hellebore blanc, á fleur verd pâle. lc. J. B. 3. 634.

Hesperis petræa vel saxatilis, foliis imis per humum sparsis hirsutis, asperis & sinuatis acriusculis, é principio radice, angustis, ad extremum autem sensim sensimque latioribus, reliquis vero per ramulos oblongis, flosculis cruciformibus ex pallide cæruleo albicantibus, siliquis longis, radice alba lignosa, Stein- oder Mauer-Leucosjen/ an Hesperis muralis minor repens J. B. 2. 880. Tabul. III. lit. d.

Variat



Variat hæc plantula ætatis ratione nec non loci, è solo enim primum surgens, folia habet subrotunda ad extremum lata sinuata hirsuta ac aspera, asplenio fere similia, quæ vero cum sit adulta immutat, hancque ad nostram delineationem repræsentat figuram.

Hieracium arvense majus chondrillæ folio latiore & minus profunde dissecto. *Habichttraut* C. Sch. auf den Feldern perenn.

Hieracium arvense Chondrilla folio dissecto hirsuto, flore luteo strobiloso s. *Hieracium Chondrilla folio hirsutum* T. Icon. 11. Tab. 494. *Habichttraut* beym Vorhergehenden.

Hieracium foliis coronopi T. atro virentibus. s. *Nigrum* Tab. Ic. 3. p. 491. *Buchstohl* perenn. auf sandigen Boden.

Hieracium fruticosum hirsutum angustifolium majus T. s. *Hieracium angustifolium montanum* Berg. *Habichttraut* mit schmalen wenig gefebten Blättern / an denen Reben der Weinberge und andern bergichten Orten. Ic. 15. Tab. p. 495. perenn.

Hieracium fruticosum latifolium hirsutum T. parumper dentatum s. *Erinus* Matthiol. in bergichten Wäldern. Icon. J. B. 2. 1030.

Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo glabro T. s. *Hyoseris angustifolia* Tab. p. 490. *klein Zerkleintraut* auf durren grasichten Orten. perenn.

Hieracium minus, dentis leonis folio subaspero

T. f. Hypochoeris porcellia Tab. p. 489. gar klein
Jerckleintraut auf den Wiesen. perenn.

Hieracium montan. angustifolium foliis
cichoraceis incanis lanuginosis. s. *Dens Leo-*
nia foliis canescentibus villosis T. Berg-Habichttraut/
mit schmalen Wegwart-Blättern/ an sonnen-rei-
chen dürren Orten. Ic. 17. Tab. p. 496. perenn.

Hieracium montanum majus latifolium gla-
brum T. groß Berg-Habichttraut mit breiten Blät-
tern/ beym vorhergehenden. Icon. 14. Tab. p. 495.
perenn.

Hieracium murorum. folio pilosissimo T. ma-
culato s. *Pulmonaria gallica mas.* Buchfohl/
hin und wieder auf alten Wäuren und in Wäldern.
Ic. 1. Tab. p. 504. perenn.

Hieracium murorum folio minus piloso non ma-
culoso T. laciniato. s. *Pulmonaria gallica fæ-*
mina, schmalblättrichter Buchfohl/ beym vorher-
gehenden. Ic. 2. p. 504. perenn.

Hieracium murorum laciniatum minus pilo-
sum folio angustiore T. s. *Pulmonaria gallica re-*
nuiifolia Tab. Buchfohl/ mit schmalen Blättern.
Ic. p. 505. perenn.

Hordeum distichum. T. Futter- oder kleine Gerst.
Ic. 2. Tab. p. 621.

Hordeum distichum spica brevior & latiora
grans confertia. T. s. *Oryza germanica.* Reiff.
Ris. Ic. Tab. p. 653.

Hordeum distichum spica nitida Zea sen *Briza*
nuncupatum. T. s. *Briza monococcus.* Entorn.
Ic. Tab. p. 698. Espeautre, Hor-

Hordeum distichum Zea dicoccos vel
major dictum. Speiß Ic. 1. Tab. p. 608.

Hordeum polystichum hybern. T. Winters
Gerste. Ic. 1. Tab. p. 621. Escourgeon.

Hordeum polystichum vernum. T. Sommer-
Gerste. Ic. 3. Tab. p. 621.

Jacea nigra angustifol. vel Lithospermi arven-
sis foliis, caule levi T. Glockenblum. perenn.

Jacea nigra pratensis latifolia T. non laci-
niata, capitulo squamato piloso, flore com-
posito, stotculoto purpureo. Glockenblum/ Wie-
sen-Scabiosen/ Jacée. Ic. 1. Tab. p. 436. perenn.

Jacea nigra pratensis vulgaris laciniata
capitulo squamato, ciliis instar piloto. s. *Ja-*
cea cum squamis, ciliis instar pilosis. T. Glockblum/ auf
den Wiesen. Jacée noir. Ic. J.B. 3. 28.

Jacea vulgaris laciniata flore purpureo. T. s.
Scabiosa major capitulis squamatis, flore
purpureo. Grosse braune Glockenblum. Ic. Tab. 3.
p. 435. auf grasigten Orten bey den Hecken. perenn.

Juncus acutus panicula sparsa T. floribus ro-
saccis. s. *Juncus foliaceus.* Weyher-Blasen/ an
feuchten Orten. Ic. 3. Tab. p. 566. Junc. perenn.

Lactuca Sylvestris odore viroso. T. flore luteo
composito semistotculoto, caule lactescen-
te. Wilder Lattich/ an denen Zäunen. Ic. 6. Tab.
p. 807. Laitue sauvage. perenn.

Lactuca sylvestris costa spinosa T. folio laci-
niato. Leber Distel/ Gänse-Zung/ auf ungebauten
Orten. Ic. Matth. Epit. p. 300. perenn.

Lamium maximum sylvatic. foetid. flore monopetalo labiato. s. Galeopsis procerior fetida spicata. T. stinkende Wald-Diesfel / in Hölzern. Galeopsis. Ic. 5. Tab. p. 921. perenn.

Lapathum acutum minimum. T. floribus apetalis, gar kleine Grindwurzeln / auffechten Frucht-Äckern und Feldern / plus petite patience. Ic. Tab. 4. p. 824. perenn.

Lapathum aquatic. longifolium s. maximum s. Lapathum aquaticum folio cubitali. T. floribus stamineis, grosser Wasser-Ampfer / Bitterkraut / in Wassergräben / plus grande patience aquatique. Ic. 5. Tab. p. 824. perenn.

Lapathum aquaticum minus. T. s. Hydrolapathum minus Tab. kleiner Wasser- oder Weyher-Ampfer / petite patience aquatique. Icon. 6. p. 824. perenn.

Laserpitium foliis latioribus lobatis, T. flosculis rosaceis umbellatis s. Libanotis latifolia altera vel vulgatio. Weisse Hirschwurzeln / officinis dicitur Gentiana alba, weisser Enzian. Ic. 1. Tab. p. 986. Libanotis, perenn.

Lathyrus major s. Tithymalus latifolius Cataputia dictus T. floribus monopetalis campaniform. Springkraut / hin und wieder in Feldern und Gärten. Ic. Tab. p. 986. Epurge. ann.

Lavandula angustifolia T. flore monopetalo coeruleo labiato. Lavendel. Lavande, aller Orten in Gärten. Ic. 3. Tab. p. 755.

Eadem quandoque, flore albo.

Lavan-

Lavandula latifolia T. s. Spica officinar. Spitz / Alpic. Beym Vorhergehenden. Ic. 2. Tab. p. 755.

Lepidium latifolium T. flosculis subalbicantibus cruciformibus, foliis oblongis, gustus acerrimi, radice alba. Pfeffer- oder Fleischkraut / Passerage. Ic. Tab. p. 847.

Lens major T. flore papilionac. grosse Linsen / auf denen Äckern. ann. Lentille. Ic. J. B. 2. 317.

Lens vulgaris semine ex luteo pallido T. weisse Linsen.

Lens vulgaris semine subrufo T. s. minor, gemeine Koch-Linsen. Ic. J. B. 2. 317.

Ligusticum s. Levisticum vulgare apii folio odorato, floribus luteis rosaceis s. Angelica montana perennis paludarii folio T. Liebstöckel / in Gärten. Leveche. Icon. Tab. p. 206. perenn.

Ligustrum T. flore albo monopetalo infundibuliformi. Hartriegel / Wein-Holz / Troëne, in Hecken und Zäunen. Ic. Tab. p. 1454.

Linaria arvensis minor coerulea erecta, floribus monopetalis personatis. s. Linaria arvensis coerulea T. klein Blaustrauch / hin und wieder in den Saam-Feldern. petite linare. Icon. Tab. p. 766. ann.

Linum sylvestre angustifolium flore magno coeruleo T. wild Blaustrauch / auf dürren grasigten Orten. Ic. 3. Tab. p. 214.

Lingua cervina officinar. T. s. Phyllitis vulgaris

garis floribus in foliorum averſa parte pro-
venientibus. Hirtſchung. Langue de Cerf. ou Sco-
lopendre. Ic. Tab. p. 1192. perenn.

*Lithospermum linariae folio germani-
cum*, floribus monopet. intundibul. s. *Thy-
metaea linariae folio vulgaris*. T. Spangnung / auf
ſtemmichen Feldern. Ic. 2. Tab. p. 1212. ann.

Lychnis Sylvestris quae Behen album vulgo T.
s. Been album officinarum J. B. 3. 356. Ic.
Tab. 9. p. 675. Spielſpelten / auf Wiefen.

Lychnis Sylvestris quae Behen vulgo album, foliis
angustioribus & acutioribus. T.

*Lyfimachia caerulea palustris Tertiana-
ria dicta*, flore monopetalo caeruleo labia-
to s. *Cassida palustris vulgatio*, flore caeruleo T.
Weidrich / bitter Fiebertraut / in denen Hecken und
Zäunen / an feuchten Waſſergräben. Toque. Icon.
Tab. p. 766. perenn.

*Lyfimachia latifolia Chamenerion di-
cta*, flore purpureo monopetalo rotato s. *Cha-
menerion latifolium vulgare* T. groſſe Weiderich.
Röſl.

Lyfimachia lutea major quae Dioscorid. t. fo-
liis oblongis, florib. monopet. rotat. diviſis,
gelber Weidrich / an denen Waſſergeſtaden. Cornu-
cille jaune; Ic. 2. Tab. p. 1237.

Lyfimachia lutea corniculata, flore mo-
nopetalo diviſo rotato s. *Onagra latifolia* t. gel-
ber gehörnter Weidrich / hin und wieder an Rheim-
ſtrom. perenn.

Lyſi-

Lyfimachia purpurea spicata, flore
monopetalo rotato diviſo. s. *Salicaria vul-
garis purpurea*, foliis oblongis. T. brauner Weidrich /
auf feuchten Wiefen. Salcaire. Icon. 1. Tab. p.
1236.

Lyfimachia filiquosa glabra major, flo-
re purpureo. s. *Chamenerion glabrum latifolium
majus*. T. Herbe St. Antoinas. Weidrich. Icon. 6.
Tab. p. 1238. perenn.

Eadem minor. T. kleine Weidrich. Röſlein /
beym Vorhergehenden. Ic. 3. Tab. p. 1237. perenn.

Lyfimachia filiquosa hirsuta, magno
flore purpureo rotato. s. *Chamenerion villosum
magno flore*. T. Icon. 4. Tab. p. 1237. perenn.

Lyfimachia filiquosa hirsuta, parvo flo-
re, s. *secunda* Tab. vel *Chamenerion villosum
minus*, parvo flore. T. Icon. 5. Tab. p. 1237. an
friſchen Waſſerbächen. perenn.

Malva palustris, folio molli incano, flo-
re albo monopetalo campaniformi. s. *Althaea
Dioscor.* t. Eibſch / an feuchten Orten und aufge-
worfenen Waſſergräben. Guimauc ordinaire. Ic.
Tab. p. 1152. perenn.

Marrubium album vulgare T. floribus mo-
nopetalis verticillatis labiatis, folio incano
rugoso, weißer Andorn / an denen Wegen und
Straſſen. Marrube blanc. Icon. Tab. p. 925. pe-
renn.

Marrubium aquaticum vel palustre glabrum T.
florib. monopetal. verticillatis labiatis, s. *Ly-*
copus

Corpus palustris glaber r. foliis hirsutis & in profundas lacinias divisis, caule quadrangulo, Wasser-Andorn / in denen Wassergräben. Marrube aquatique. Ic. Matth. Epit. sub nomine Siderit. I. p. 746. perenn.

Marrubium Cardiacum dictum r. flore purpureo labiato, Hergespan / Hergstraut / an denen Mauren und Wegen. Agripaunic. Icon. I. Tab. p. 935. perenn.

Idem flore albo.

Marrubium nigrum fatidum s. Ballotè r. flore monopetalo verticillato labiato purpureo, stinkender oder schwarzer Andorn. Marrube noir ou pûant. Icon. Tab. sub nomine Marrubiastr. p. 926. perenn.

Mentha palustris fol. oblongo r. Icon. J. B. 3. part. 2. 220. sub nomine Mentastri hirsut. wilde Wassermünz / an feuchten Orten. Menthe Sauvage. Ic. Lob. 510.

Mentha rotundifolia palustris s. *aquatica major* r. officinis mentha rubra, flore monopetalo labiato, pallide purpurascente, rothe Bach- oder Wassermünz. Icon. 3. Tab. p. 736. Menthe aquatique rouge. perenn.

Mentha rotundifolia spicata crispata r. floribus verticillatis labiatis. Krausmünz / krauser Balsam / Menthe ou Beume crespée, in Gärten. Ic. Fuchs. hist. plant. perenn.

Muscus terrestris clavatus repens, *Lycopodium officinar. dictus* s. *Muscus squamosus vulgaris*.

vulgaris repens clavatus r. Bärlapp / Truttenfuß / Moule terrestre, ou Pied de Loup. in Wäldern. Ic. 3. Tab. p. 1197. perenn.

Myagrum siliqua longa, folio integro, flore luteo minore cruciformi s. *Turritis Lencoy* folio r. grosse wilde Kr. ffe / Cameline, in denen Saam-Feldern. Ic. 2. Tab. p. 1252. perenn.

Nasturtium sylvestre capsulis cristatis r. s. *Coronopus repens*, floribus albis cruciformibus, capsulis verucosis, treckender Wegresse oder Röhrenfuß. Icon. 4. Tab. p. 302. perenn.

Nicotiana major latifolia r. flore monopet. infundibuliforme diviso, folio molli integro ac unctuos. Taback / auf denen Gärtner's-Feldern. Herbe de la Reine ou Nicotiane. Ic. Tab. p. 971.

Nigella arvensis cornuta r. flore subcorul. leo rosaceo, foliis foeniculaceis, Sanct Catharinen-Blumen / wild Rardentrant / auf Saam-Feldern nach vollender Erndte. Nielle. Ic. Matth. Epit. p. 552. ann.

Onobrychis foliis vicia fructu echinato major r. flore eleganter rubente papilionaceo. Dahnentamm / auf verschiedenen grasichten Orten. Saint foin. Ic. Tab. p. 900. perenn.

Origanum sylvestre, flore purpureo monopetalo labiato. s. *Origanum vulgare spontaneum* r. Wohlgemuth / Dosten / an den Hecken. Origane. Ic. 4. Tab. p. 726. perenn.

Idem flore albo, Ic. 1. Tab. p. 725.

Orui.

Ornithopodium majus T. flore flavescente papilionaceo, radice nodosa folio pinnato. Vogelpfeife / auf den Aekern / nach verrichteter Erndt. Pied d'oiseau. ann.

Idem minus.

Orobanche ramosa floribus caeruleis T. monopetalis personatis. Hanfsinännlein / in den Hanfsäckern. Ic. Clus. hist. 271.

Eadem floribus subalbidis & purpureiscentibus. perenn.

Persicaria angustifolia T. caule rubente laevi ac geniculato, spicis oblongis, floribus pallide purpureiscentibus, auf feuchten sandigen Orten. perenn. C. B. prodr. 43.

Persicaria minor T. s. pusilla repens. Lob. Ic. 316. klein kriechend Blöthraut.

Persicaria mitis maculata, flore purpureo apetalis diviso spicato s. *Persicaria mitis maculosa* T. Blöthraut / mit gestreckten Blättern. Persicaire. Ic. 2. Tab. p. 1240.

Persicaria mitis non maculata. Blöthraut mit Blättern ohne Flecken. Ic. Tab. p. 1240. perenn.

Persicaria mitis minor T. s. pusilla procumbens, flore rubro, klein Wald-Blöthraut. Icon. 3.

Eadem flore albo.

Persicaria falicis folio, Potamogeton angustifolium dicta. s. *Persicaria falicis folio perennis*. T. Saamtraut / in Teichen / Wassern und Fischgräben. Ic. 2. Tab. p. 1117. perenn.

Persicaria urens s. *Hydropiper* T. floribus ruben-

rubentibus in spicam congestis, folio longo, Wasser-Pfeffer / in feuchten Orten. Courage. Ic. 1. Tab. p. 1240. perenn.

Pilosella major repens, folio angustiore minus piloso, floribus compos. semistoliculos. luteis s. *Dens leonis qui pilosella folio minus villosa* T. an bergichten sonnenreichen Orten. perenn.

Plantago aquatica angustifolia, flore simpl. rosaceo albo. s. *Ranunculus palustris*, folio angustiore plantaginis T. schmalblättrichter Wasser-meerich. Icon. 2. Tab. p. 1112. Plantain d'eau à feuilles étroites, in feuchten Gräben. perenn.

Plantago aquatica latifolia. s. *Ranunculus palustris*, plantaginis folio ampliore. T. Wasser-meerich / beyhm vorhergehenden. Ic. 1. Tab. p. 1111. Plantain d'eau à feuilles larges. perenn.

Polium Lavendula folio T. flore monopetal. labiato albo. s. *Polium recentior*. farnina Lavendula folio Lob. Ic. 488. Polium. Weible. Polium.

Polypodium vulgare T. flosculis subluteis, dorso foliorum exeuntibus, foliis dissectis. Engelsfuss. Ic. 1. Tab. p. 1188. Polipode, an den Felsen / bergen / und an den alten Eichen-Bäumen. perenn.

Polygonum vulgare latifolium, flore stamineo rubro & albo. s. *Polygonum latifolium* T. Bluttraut / Weggras. Renonce ou Centinode. Ic. 1. Tab. p. 1214. perenn.

Polygonum brevi angustifolium T. gar klein Blut-

Bluttraut/ auf sandigen Boden/ an denen Wegen. Ic. 2. Tab. p. 1215. perenn.

Polygonum oblongo angustoque folio r. schmahlblättricht Weggras / beyhm vorigen. Ic. 3. Tab. p. 1215. perenn.

Porrum sylvestre capite gemino r. flore purpureo liliaceo, wilderlauch. Poireau sauvage. Ic. 1. Tab. p. 872. perenn.

Portulaca latifolia sativa vel domestica r. foliis subluteis rosaceis. Zahnerpurgel/ in Gärten. Pourpier domestique. Ic. 1. Tab. p. 829. ann.

Portulaca sylvestris s. *angustifolia* r. Sauoder Ackermittel. Pourpier sauvage. Ic. 2. Tab. 830. ann.

Potamogeton caule compresso, folio graminis canini Ray. hist. p. 189. in stehenden Wasserpfaden. perenn.

Potamogeton foliis angustis & undulatis s. *Tribulus aquaticus minor muscatellæ floribus*. Ger. emac. 824. in Wasserbächen. perenn.

Potamogeton ramosum angustifolium r. foliis pusillis cruciform. uvæ in modum congestis, in frischen Wasserbächen. perenn.

Raphanus major orbicularis s. *rotundus* r. flore cruciform. purpur. & alb. Rettich / in Gärten und Gärtners. Feldern Rarfort. Ic. 1. Tab. p. 797. ann.

Raphanus niger r. schwarzer Rettich. Lob. Ic. 202. Winter. Rettich. ann.

Rapunculus hortensis lactescens pyramidalis,

midalis, folio latiore, flore monopetalo campaniformi albo & cœruleo radice lactescente s. *Campanula pyramidata altissima* r. weißse Pyramiden Glockenblumen / in Gärten und Hökern. Campanule ou Pyramidale. Clus. hist. CLXXII. perenn.

Rapunculus persicifolius, flore monopetalo magno cœruleo campanulato s. *Campanula angustifolia cœrulea*. r. Witschglockstein mit Pfirsichblättern / in denen Hecken. Icon. Tab. 699. perenn.

Rorella flore monopetalo rosaceo albo, radice pilosa, folio rotundo, in ambitu piloso s. *Ros solis folio subrotundo* r. Sonnenhan / in feuchten moßigten Orten. Ros solis. Icon. 1. Tab. p. 1202. perenn.

Eadem folio oblongo. Lob. Ic. 811.

Scordium foliis Salviæ florib. subluteis monopet. labiat. s. *Chamadrys fruticosa sylvestris melisse folio* r. wilde Salbey / an Bergen. Ic. Tab. p. 761.

Serratula tinctoria, foliis ferratis ad radicem integris, reliquis profunde incisis, flore compos. purpureo flosculos. s. *Jacea nemorensis que serratula vulgo*. r. Scharrenkraut / Jarber. Scharren / in Wäldern. Serratia. Icon. 3. Tab. p. 439. perenn.

Eadem flore albo sed rarius.

Variat serratula ratione folior. quandoque enim integra quandoque incisa profert. uti videre est C.B. p. 235. K So.

Sedum majus vulgare T. s. Barba Jovis, flo-
rerofaceo, folio succulento crassiore. Don-
nerbart / grosse Haufwurk / in Gärten und auf den
Dächern der Bauern. Joubarbe. Ic. Tab. p. 1224.
perenn.

Seseli pratense tenuifolium, flore lu-
teolo rosaceo umbellato. s. *Angelica praten-
sis apii folio*. T. Rosi-Bengel / auf feuchten Wiesen.
Ic. Tab. 160. perenn.

Solanum tuberosum esculentum. T. s. Papas A-
merican. flore albo monopetalo rotato divi-
so. Kartoffeln / Grund-Birn / auf den Feldern. Icon.
Tab. d. 869. perenn.

Idem flore purpureo.

Utrumque & flores quandoque fert ple-

num.

Solanum vulgare, foliophaseoli floscu-
lis subalbidis racemosis, fibrosa radice, bac-
cis nigris. s. *Solanum officinarum*, vel *vulgare ni-
grum*, acinis nigricantibus. T. Nachtschatten / an al-
len feuchten Orten und Wuchsen. Morelle. Ic. 1.
Tab. p. 973. ann.

Solanum vulgare s. *officin.* acinis luteis
T. folio minori pallide virente. Beym vore-
hergehenden. Sed rarius. ann. Morelle à fruit jau-
nâtre.

Sonchus laevis laciniatus latifolius T. s. minus
spinofus. Daser-Kohl. Ic. 3. Tab. p. 499. ann.

Sonchus laevis latifolius, sive *sonchus laevis mi-
nor*, paucioribus lacinis, T. wilder Daser-Kohl / auf
den

den brachliegenden Feldern. Icon. 3. p. 499. Lai-
tron doux. ann.

Sonchus laevis laciniatus, flore sulphureo T. s. *ter-
tius* Tab. In Kraut-Grütern. ann.

Sonchus laevis laciniatus muralis, par-
vis floribus, s. *Chondrilla fenchifolio*, flore inter-
palescente T. an denen Wigen und Strassen. Con-
dille. Ic. II. Tab. p. 501. ann.

Thalicttrum majus flavum, flaminibus luteis,
folio glauco. T. s. Ruta pratensis. 4. Tab. gebe
Wiesen-Kraut. Rue des prez. p. 501. perenn.

*Tithymalus characias amygdaloides angustifo-
lius*. T. s. *Tithymalo maritimo* affinis lina-
riæfolio, auf den Feldern und Rändern der Aecker /
Wolfs-Milch / mit schmalen Mandelblättern. Titi-
malc. Ic. 6. Tab. p. 988. perenn.

Idem *latifolius* T. Icon. Tab. 5. p. 988. pe-
renn.

Tithymalus arvensis latifolius germanicus T.
s. *Tithymalus platyphyllos*. Fuchs. potius
Esula arvensis latifolia.

*Tithymalus minimus angustifolius an-
nuus*, foliis acutis oblongis s. *Esula exigua*
T. vel *Leptophyllos* Matth. Epit. p. 966. klei-
neste Wolfs Milch / in denen Korn-Feldern und an-
dern ungebauten Orten. Icon. 15. Tab. p. 991. pe-
renn.

Verbascum maximum album, s. *Fæmina*
flore subpallido monopetalo rotato diviso s.
Verbascum flore albo T. weisse Königs-Kerzen. Ic.
K. 2 Tab.

Tab. 2. & 3. p. 956. Bouillon blanc. hin und wieder an denen Wegen. ann.

Verbena communis s. officinar. flore caeruleo T. monopetalo labiato, Eisenkraut. perenn. Ic. 1. Tab. p. 380. Verveine mäl.

Veronica angustifolia spicata T. vel 2. erectior angustifol. Clus. hist. caulibus viridibus, flore monopetalo caeruleo rotato multifido, aufrecht stehender Ehrenpreis / auf dürren grasigten Orten. Ic. Tab. 4. & 5. p. 773. perenn.

Veronica angustifolia recta minor s. *Veronica spicata minor* T. gar kleiner aufrecht stehender Ehrenpreis / beyhm vorhergehenden. Icon. Tab. 6. p. 773. perenn.

Veronica spicata longifolia T. 3. *Lyfimachia spicata major recta caerulea*, foliusprofunde ferratis. Ic. Tab. 773. perenn.

Urtica urens maxima T. flore stamineo folio serrato, grosse brennende Nesseln / hin und wieder an denen Bäumen. Grande Ortie. Ic. 2. & 4. Tab. p. 921.

Urtica urens maxima, caule rubente, grosse brennende Nessel mit röthlichen Stengeln. ann.

Urtica urens minor T. klein brennende oder Eiter-Nessel / an denen Wegen und Wänden. Orue griessche ou petite Ortie. Icon. 3. Tab. p. 921. ann.

MEN-

MENSIS

AVGVSTVS & SEPTEMBER.

Abrotanum campestre cauliculis rubentibus T. 2. *Abrotanum tenuifolium inodorum* cauliculo rubro, flosculis compositis luteis flosculolis multitudinis inodoris, wilde Stabwurz / Auronne Sauvage, Ic. Tab. 3. p. 51. perenn. auf ungebauten Orten.

Idem cauliculis albicantibus T.

Abrotan. mas angustifol. majus T. s. vulgare, Stab oder Schofwurz / in Gärten und Gärtners-Geldeen. perenn. Ic. 1. Tab. p. 50.

Absinthium ponticum tenuifolium incanum T. s. vulgare romanum Camer. folio inferius albo, flore compos. flosculoso subluteo, Pontischer oder Römischer Wermuth. Ic. Matth. Epit. p. 454. perenn.

Aconitum flore saturate caeruleo poly-petalo anomalo galeato, folio dissecto atro virentes. *Aconitum caeruleum vel Napellus* T. Rappenblum / in Bergen und Gärten. Cappe de moine ou Tue Loup. Ic. Tab. p. 983. perenn.

Aconitum Lycoctonum luteum T. folio plantani, flore luteo pallescente, gelbe Eisen-Hutlein / beyhm vorhergehenden. Ic. 4. Tab. p. 982. perenn. *Aconit à fleur jaune*.

Alfne spargula facie minor s. *Spergula minor flosculo subcaeruleo* T. vel *Spergula purpurea*, flosculis rosaceis purpurascens, foliis tenuibus

nuibus acutis, in cauliculo circa geniculum
positis, zwischen den Stielen auf sandigen feuch-
ten Orten. ann. Tabul. IV. lit. c.

Artemisia vulgaris major T. caule ex viri-
di albente, floribus minimis flocculosis, to-
ho dissecto, Bensch auf ungebauten Orten. Ar-
moise. lc. 2. Tab. p. 27. perenn.

Eadem purpurascens lc. 1. Tab. p. 27.

Arundo vulgaris T. s. palustris, folio ob-
longo acuminato, flore stamineo, gemein
Schiff-Rohr / in Wassergräben, Canne ou Roseau.
lc. 2. Tab. p. 57. 2. perenn.

Atriplex sylvestris latifolia, folio acu-
tiori, lore stamineo diviso s. *Chenopodium* T.
Pes asperinus II. Tab. p. 812. Gänse-Fuß / mit spär-
lichen Blättern / Patte d'Oye, bey den Wist. Stä-
ten und andern aufgeworffenen Grund. ann.

Atriplex sylvestris latifolia s. *Pes aspe-
rinus* T. 1. Tab. p. 812. Gänse-Fuß / Sau-Eddi /
mit breiten feilen Blättern / bey dem vorbergehenden.
ann.

Cannabis erratica, T. s. sterilis femina florib.
apetal. foliis multitudinis digitatis. Fruchtbrin-
gender Hanff. Chanvre femelle. ann.

Cannabis sativa T. s. facunda vel mas. gemeiner
Hanff. Icon. 1. Tab. p. 936. Chanvre mâle. ann.

Caryophyllus sylvestris profunde laci-
niatus plumarius, flore inodoro rubro po-
lypetalo s. *Caryophyllus* flore tenuissime dissecto T.
Fede r. Nieschen / auf den Wiesen. Oeillet sauvage des
prez



prez. 1c. Tab. 10. & 11. p. 667. & seq. perenn.
idem flore albo.

Conyza major, flore globoso vix radiato. s. *Aster palustris*, parvo flore globoso, 1. kleine Stern-Blumen/ Dürrenwurz/ Conise des marais, Icon. 2. Tab. p. 1243. an feuchten Orten. perenn.

Conyza media, asteris flore luteo magno radiato s. *Aster pratensis autumnalis Conyza folio* 1. gelbe grosse Stern-Blumen/ Dürrenwurz/ an feuchten Orten. Aster des prez. 1c. 1. Tab. p. 1243. perenn.

Gentiana alpina pumila folio brevi 1. flore dilute purpurascens & coeruleo elegantissimo, monopetalo campaniformi, kleiner Himmlstengel/ auf grasigten sonnenreichen Bergen/ vel *Gentianella fugax* 4. Clus.

Gentiana alpina pumila, *centaurii minoris folio* 1. flore elegantissimo coeruleo s. *Gentianella fugax* 5. Clus. kleiner blauer Himmlstengel.

Gramen dactylon radice repente 1. s. folio arundinaceo majus aculeatum. s. *Legitimum* Clus. CCXVII. in denen Kraut-und Kohl-Gärten.

Gramen dactylon angustifolium spicis villosis 1. s. *Ischaemon* fl. Tab. p. 534. Blut-Gras/ an rauhen ungebauten Orten.

Gramen dactylon folio latiore 1. s. *Ischaemon* *gramen sanguinarium* 1. Tab. p. 534. Blut-Gras/ in fettem Erdreich.

Gramen junceum s. *bufoninum* caliculis paleaceis repens s. *Juncus palustris humilior repens* T. Knoten-Graß / auf feuchten Wiesen. Ic. 6. Tab. p. 536.

Gramen nemorosum panicula rufescente molli T. s. *Gramen sylvaticum* vel *nemorosum* l. Tab. p. 537. Wald-Graß.

Gramen palustre aculeatum f. *echinatum* vel minus *germanicum* s. *Cyperodes palustre aculeatum, capitulo brevior* T. Wasser-Graß / mit stehenden Ähren / in sumpffichten Orten. Lob. Icon. 15.

Gramen paniceum spica aristis longis armata s. *Panicum vulgare spica multiplici longis aristis circumvallata* T. Jenich-Graß / an denen Wassergräben. Ic. 2. Tab. p. 538.

Gramen paniceum spica simplici s. *Gramen geniculatum* Tab. s. *Panicum vulgare spica simplici & aspera* T. Knoten-Graß. Icon. 3. Tab. p. 516.

Gramen typhoides asperum s. *Gramen spicatum spica cylindracea tenuiore longa* T. s. *Typhynum* l. Tab. Fisch-Graß. p. 531.

Gramen typhoides maximum spica longissima, radice quasi bulbosa s. *Gramen spicatum, spica cylindracea longissima* T. Ic. C. B. prodr. p. 10. gar groß Fuchschwanz-Graß.

Gramen typhoides molle aut alopecurinum l. Tab. s. *Gramen spicatum spica cylindracea molli & densa* T. folio lanuginoso. Fuchschwanz

schwanz-Graß / an denen Wegen und Straßen. Ic. Tab. p. 520.

Gramen typhoides, spica angustiore longiore rufescente s. *Gramen spicatum spica cylindracea tenuissima longiore* T. Klein Fuchschwanz-Graß. Ic. 9. Lob.

Lenticula palustris bifolia, fructu tetragono C. B. p. s. *Callitriche Plani* F. Column. ann.

Linaria annua, folio hirsuto bederaceo flore ex albido flavescente labiato s. *Elatine folio subrotundo vel Linaria segetum nummularia folio villoso* T. Icon. 1. Tab. p. 1091. *Elatine*, auf denen Frucht-Nectern / nach vollbrachter Erndt. ann.

Lupulus mas T. floribus stamineis herbaceis. Hopfen in Gärten und Feldern. Icon. Tab. p. 1293. Houblon mâle. perenn.

Lupulus femina T. s. *Sylvestris minor sterilis*, wider Hopfen / in denen Hecken. Houblon femelle. perenn.

Majorana vulgaris T. folio majore flore monopetalo labiato. Majoran / Icon. 1. Tab. p. 718. Mariolaine, auf den Gärtners-Feldern und in Gärten. perenn.

Majorana tenuifolia T. s. nobilis, Winter- oder edler Majoran / beyrn vorhergehenden. perenn.

Milium semine luteo & albo, T. graminifolium, flore staminco, Hirse / Millet. Icon. 1. Tab. p. 656. auf den Nectern. ann.

Pimpinella sanguisorba major T. florib. monopetal. rotatis divis. rubr. spadiceis, foliis pinnatis serratis, groß Eyerben-Kraut / auf den Wiesen / Grande pimprenelle, lc. 1. Tab. p. 316. perenn.

Polium montanum repens T. flore purpur. & albo monopetalo labiato, klein Berg-Poley / Polium de montagne. lc. 4. p. 950. perenn.

Saxifraga graminifolia, flosculis tetrapetalis herbidis & mucosis. Pluck. 74. 2. f. *Alfne pusilla graminea flore tetrapetalo* T. locis humidis ac arenosis lapidosis.

Sideritis arvensis angustifolia rubra s. *Galeopsis patula segetum flore purpurascente* T. aliàs *Alyssum* Galen. Tab. lc. 2 p. 928. Korn-Wur / Purpur-roth Alyssen, auf den Feldern. ann.

Eadem flore albo.

Sideritis arvensis latifolia glabra s. *Be-tonica arvensis annua flore ex albo flavescente* T. lc. 3. Tab. p. 929. groß Feld-Alyssen. ann.

Sium palustre album foliis serratis T. s. *Cicuta aquatica* Gesneri vel Wepferi, floribus subluteis umbellatis rosaceis, foliis angustis serratis, longis pediculis appensis, caule striato ac geniculato, radice crassa fibrosa. Giffu Kraut / böß Wassermerck / Icon. 4. Tab. p. 203. in sumpffichten Orten.

Stachys major germanica T. s. Fuchsi, flore purpurascente monopetal verticillato labiato, riechender Andorn / hin und wieder in denen Hecken / Stachys. Icon. 1. Tab. p. 767. perenn.

Tanacetum.

Tanacetum vulgare luteum v. flore composito flosculoso, Rheinfarn / Wurm-Kraut / hin und wieder in grasichten Orten. Tanacee. Tab. lc. 6. p. 28. perenn.

Telephium vulgare s. *Anacampteros vulgo Faba Crassa*, v. flore albo rosaceo, foliis succulent. Setze Henne / Orpin, auf denen Aedern und andern grasichten Orten. lc. 1. Tab. p. 1227. perenn.

Thalictrum majus non Ariatum T. s. *Ruta pratensis major*, 2. Tab. große Wiesen-Kraut / auf durren grasichten Wiesen / Rue des prez. Icon. 2. Tab. p. 120. perenn.

Tormentilla radice repente T. s. *Pentaphyllum viride minus*, flore aureo rosaceo, radículas in terram é geniculis demittens, trielohende Tormentil / in Wäldern. perenn.

Verbascum mas s. officinarum latifolium luteum T. foliis incanis latioribus flore monopetalo luteo rotato divis. Bull-Kraut / Kö-nigs-Kerzen / auf sandigen erhabenen Orten. Bouillon blanc ou Bon Homme. lc. 1. Tab. p. 955. ann.

MENSIS

SEPTEMBER & OCTOBER.

Colchicum autumnale latifolium flore purpurascente monopetalo liliaceo s. *Colchicum commune* T. Herbst-Biumen / saule Futen / nachende Huren. Colchique ou mort au Chien. Icon. 8. & 9. Tab. p. 1011. perenn.

Idem

Idem flore albo.

Gentianella angustifolia autumnalis minor flore coeruleo campaniform. quadripartito ad latera pilosos. s. *Gentiana coerulea ovris pilosis* T. Blauer Herbsthimmel-Stengel.

Helianthemum Indicum Tuberosum flore luteo compos. radiato foliis latioribus s. *Corona solis parva flore, radice tuberosa* T. Erdo-Aepffel / Canadas, pomme de terre ou Taupinambours, an eintgen Drien auf Jeldern.

Limosella annua, flore albo monopetalo infundibuliformi multifido, fructu ovato unicapsulari, semine foeto exiguo oblongo, in duas partes dehiscence, foliis oblongis planis, longis pediculis insidentibus, radice fibrosa albicante. *Sumpff-Blümlein* in *leutichen feuchten Grunde* / quam aqua quandoque inundare solet. *Ob locum quem amat limosum à nobis Limosella appellata est.* Tab. V. lit. f.

Pyxidaria repens annua, flosculis monopetalis anomalis unilabiat ex albo purpurascentibus, inferna parte amplis, superna vero angustis ac clausis longis pediculis insidentibus, facile deciduis, foliis anagallidi similibus, capsula oblonga seminibus copiose referta. *Sumpff-Gauchheil* in *leutichen feuchten Boden.* Tab. V. lit. g.

Hujus plantulae genus nondum ut opinor est descriptum, hinc ob Cyathi inversi analogiam pyxidariam nuncupavimus, quae
vero



lit. g.



vero figura auxilio vitri armati atque scalpelli scriptorii, florem galeatum bipartitum atque unilabiatum clauium exhibet, superficietenus autem exacte canis penem repræsentat.

Sium umbellatum repens, t. floribus albicantibus rosaceis umbelliferis Ger. Emac. 258. *klein triechend Wassermerck / in feuchten grasichten Orien.*

Orchis spiralis alba odorata t. s. *Triorchis alba odorata minor*, auf dürren grasichten Orien. lc. J.B. 2. 769.

MENSIS NOVEMBER atque DECEMBER.

A Pud nos in producendis Plantis quiescunt, nec ulla his in mensibus rite viget ac floret, exceptis Fungis atque Muscis, quos jam adeo exacte descripsit Vir egregiæ Fruditionis Joh. Jac. Dillenius in suo Catalogo Plantarum sponte circa Gissam nascentium, ut aliquid addere non liceat.

OMISSA.

Carpinus t. s. *Fagus sepium*, floribus subalbicantibus stamineis, fructu in umbilico foliaceis, tohus serratis. *Hagebuchen / Zaunbuchen / Charme*, Icon. Tab. 1387. in denen Zäunen und Wäldern. Conyz.

Conyza major vulgaris L. floribus subluteis
flosculosis foliis pinguibus hirsutis, grosse
Dürrwurz / Icon. 2. Tab. p. 1243. Jul. an rau-
hen dicken Orten. Conit.

Cruciata hirsuta T. flore luteo cruciformi,
foliis quaternis hirsutis. Guldni Waldmeister/
Croisette jaune, Icon. Joh. B. 3. 717. an denen
Bäumen. Maj.

Fraxinus excelsior T. s. Vulgaris ligno can-
dido, floribus subluteo purpureis apetalis, fo-
lius atrovirentibus pinnatis ac crenatis, se-
mine avis linguam exprimente. Eschenbaum.
Icon. Tab. p. 1428. Frêne. April.

Salix alba vulgaris arborescens T. quæ fragi-
lis, floribus luteis amentaceis spicatis, molli-
bus in pappum abeuntibus, foliis superne
virentibus, inferne candescentibus, utrinque
hirsutis vix serratis cortice cineraceo, Saux,
Pfahl oder Baum-Weiden / auf feuchten Wiesen und
an den Straßen. Icon. J. B. 1. 212. April.

Salix aurita & non aurita, folio amygdalino
utrinque virente T. cortice purpureo, quæ lati-
folia sylvestris Tab. Breusblättriche Seil- oder
Korb-Weiden / Icon. 1. Tab. p. 1452. an frischen
fließenden Wasser-Bächen. April.

Salix aquatica vel Caprea latifolia Tab.
five *Salix folio ex rotunditate acuminato* T. breit-
blättriche Dohle- oder Kägel-Weiden. Mart. Icon.
4. Tab. p. 1452.

Salix humilis capitulo squamoso T. & fragilis
folio

folio minore utrinque glabro subcœruleo
crenato. Kleine Sumpff- oder Rhein-Weiden. Ic.
J. B. 1. 213. April.

In hujus salicis foliis, ut plurimum Ve-
siculæ conspiciuntur subrubentes, quales fer-
me Ulmus producere solet, ut & in ramu-
lorum capitulis lanuginosis candidis.

Salix fragilis T. s. spontanea folio lato
splendente auriculato, cortice candido.
Bruch- oder Glas-Weiden / hin und wieder an den
Wässern. C. B. prodr. 198.

Salix latifolia repens T. vel pumila. Kleine
niedrige Erd-Weiden / an feuchten Orten. Icon. 5.
Tab. p. 1453.

Salix oblongo incano acuto folio. T. *Salix* fo-
liis angustis & longissimis crispis subtus al-
bicantibus, cortice atro rubente. Spitz-Wei-
den / an den Wässern. Icon. J. B. 1. 212.

Salix vulgaris nigricans, folio non serrato T. quæ
& rubra flexilis, folio longo angusto, subtus
nonnihil candicante argutis denticulis undi-
que crenato, rothe Band-Weiden / (seynd nebst den
gelben die besten.) Ic. J. B. 1. 215.

Salix sativa lutea, folio crenato. T. s. Vitelli-
na aut Viminæa angustifolia sylvestris, cor-
tice luteo, nostratibus *Salix vulgarissima*, gel-
be Band- oder Kiefer-Weiden / Ic. 2. Tab. p. 1452.
werden hieyon ganze Dörfer besetzt und gepflanzt.

Stellaria aquatica f. *Alfina aquis inna-
tans*, flosculis subviridibus, foliis longin-
gulis


Feulis J. B. 3. 777. Ic. 6. Tab. p. 187. Wasser-
Genschel/ in stülstehenden Wasser-Bächlein.

Viola tricolor hortensis repens r. flore poly-
petalo anomalo s. Jacea tricolor vel Flos tri-
niratis, Dreyfaltigste-Blum/ Freysam-Blum/ in
Gärten und auf den Feldern. Pro soli diversita-
te coloris ratione, multum variat. pertotam
æstatem. Icon. Tab. 690. Pensées.

Et hæc est Plantarum Divino sub Auspicio
provenientium ac florentium, brevis ac genuina de-
lineatio, quasque Herbarium meum, ut ita lo-
quar Vivum, manu propria decerptas atque colle-
ctas, Exoticis exceptis, in se continet. Fateor
quidem multas superesse species, qua addi potuissent,
sed cum non curvis adire contingat Corinthum, ita
et mihi tempus non concessit omnes telluris late-
bras pervadendi, eandem in finem non potui nec
volui circumscribere in Allatia exactam plan-
tarum hrtoriam, quam forsitan ex honora-
tioribus Collega quidam, si Diis placebit, For-
tunaque optatis respondebit in omnium admiratio-
nem ac gaudium, brevi erudito Orbi sit editurus.
Interim venia erit Lectori, si qua addenda vel
corrigenenda sint, æquanimo iudicio emendet mihi-
que ubi hallucinatus fuerim, pro sua Benevolentia
viam in posterum monstrat exactiorem, Deo interim
Botanicorum summo Botanico pro viribus concessis
sit Laus Honor & Gloria.

FINIS.

INDEX



INDEX MENSTRVVS.

I Anuarius.	1	Julius.	114
Februarius.	2	Augustus.	149
Martius.	4	September.	155
Aprilis.	12	October.	155
Majus.	24	November.	157
Junius.	61	December.	157

INDEX ALPHABETICVS.

A	A.	Acer campestre	12
Bies alba	24	Acer montan.	11
famina	ibid.	Acetosa crispa	12
mas	ibid.	lanceolat.	25
picea rubr.	ibid.	pratensis	12
Abrotan. campestre	149	rotundifol.	61
linifol.	129	vulgaris	12
mas	149	Acetosella	23
vulgare	ib.	Aconitum cærul.	150
Abfinth. pontic.	114	lycocton. luteum	150
pontic. tenuifol.	149	racemosum	25
roman.	114	unifolium	2
vulgare	ibid.	Acorus	25
Acaciagermanic.	19	Adiantum album	61
Acanthium vulgare	124	aureum	ibid.
		L	Adian-

INDEX

Adiantum filicis fol. 76	Alfene aquatica media 63
nigrum 61	chamædryfol. 12
Agrarium 57	fontana ibid.
Agrimonia officin 62	hederul. fol. ib.
odorata ibid.	hirsuta 13
Alcea vulgaris 91	media ibid. & 26
rotundifol. ibid.	minor capitul. lini 64
Alchimilla erecta 100	multicaul. ib.
linar. fol. 40	montana ibid.
montana minim. 19	palustris major 63
supina 99	min. longifol. 115
vulgaris 61	rotundifol. 114
Alga filamentosa 62	serpillifol. 115
vulgatissim. ibid.	tenuiss. fol. ib.
Alliaria 17	uliginos. locis.
Allioprasmum 63	proveniens 25
Allium campestre junci-	petra 64
fol. ibid.	portulacæ fol. 26
tenuifol. ibid.	pratensis lgrami-
juncifol. 63	nifol. amplior. 14
montan. angusti-	angust. ibid.
fol. 62	scandens baccifer. 114
latifol. ibid.	serpillifol. 26
lativum 62	spergula maj. ibid.
sylvestre 25	minor 150
Alkekengi 107	triphyllus 13
Alnus nigra 25	verna glabra ibid.
rotundifol. 12	Alfene
Alfene altissim. nemor. 63	
aquatica major ib.	

ALPHABETICVS.

Alfene veronicæ fol. ibid.	Anonis spinosa 64
vulgaris ibid.	non spinosa ibid.
Althæa 139	Anserina 47
Alyssum luteum maj. 57	Anthyllis leguminos. 64
min. ib.	Antirrhin. arvens. maj. 27
polygon. fol. 2	min. 88
segetum 94	Aparine montana latifol.
vulgare 2	27
Ammi perenn. 129	angustifol. 54
Amygdal. amar. 14	supina pumila 102
dulc. 13	vulgaris 27
Anacampteros 155	Aphaca 113
Anagallis alba 26	Apium hortense 116
aquatic. 112	crispum ibid.
carneo flore 26	latifol. ibid.
cærulea ibid.	maximum ibid.
lutea ibid.	montan. 116
phænicea ibid.	officinar. ib.
rotundifol. 104	palustre longif. 65
Anblatum Cordi 97	officinar. 116
Anemone sylvestr. alb. 26	suaveoleus 115
Anethum vulgare ibid.	sylvestre 116
Angelica montana 137	Aquifolium 38
pratens. apii fol. 146	Aquilegia sylvestris 27
fativa 115	Arctium Dioscorid. 65
sylvestr. major ib.	Argemone 34
minor 64	Aristolochia longa 11
Anisum majus 115	Arnica 74
minus 116	Artemisia vulgar. 150
	Artifi. 111
	L 2
	Arum

INDEX

Arum aquatic.	129	Attriplex angustifol. lacini-	
maculat.	ibid.		117
non maculat.	ibid.	angusto oblongo	
vulgare	ibid.	fol. ibid.	
Arundo vulgar.	150	foetida	118
Asarum	14	hortensis alba	ib.
Asclepias	27	rubra	ib.
Asparagus	65	sylvestris latifolia	
Aster arvens. cœrul.	72	folio acuto	ib.
atticus cœrul.	117	latifol.	150
austriac.	ibid.	sinuat. spica rubr.	
autumnal.	151	ibid.	
canadensis	117	virid. ib.	
incanus verbasc. fol.		folio sinuat. cand.	
	72	ibid.	
luteus foliis ad flor.		polyspermum	ib.
rigid.	117	vulgaris	117
major	ibid.	Avena vulgar. alba	65
succisæ	ibid.	nigra	ibid.
salicisfol.	65	B.	
hirsut.	117	Ballote Matthiol	140
maximus	81	Balsamina lutea	65
montan. lut.	65	Barba caprin. florib. com-	
palustris flore glo-		paet.	66
bos	151	oblongis	ib.
laciniatus	72	Jovis	146
Asteriscus annuus	117	Barbarca	33
Astragalus luteus pro-		Bardana major	119
cumb.	65	minor	ibid.
Atractylis	127	Beccabunga	112
		Becc-	

ALPHABETICVS.

Beccabunga longifol. ib.		Brassica alba crispa	28
Been album	138	f. viridis	29
Bellis cœrulea	28	arvensis	ib.
lutea	119	campestris per fol.	
sylvestris major	28		4
min. alb.	4	capitata alba	29
purpur.	ib.	rubra	ib.
Berberis	28	cauliflora	ib.
Beta alba	66	finibriata	ib.
rubra	ibid.	gongylodes	ib.
Betonica alba	ibid.	fativa	29
aquatica	ibid.	sylvestris.	66
arvensis ann.	155	vulgar.	29
purpurea	66	Briza monococc.	135
Betula	28	Brunella cœrulea magno	
Bidens fol. divis.	122	flore	120
non divis.	ib.	flore purpur.	ibid.
Bistorta major	119	folio lacinar.	pur-
minus intorta	ib.	pur.	122
Blattaria lutea	ibid.	alb.	67
Blitum alb. majus	220	major alb.	ib.
minus	ibid.	rubr.	ib.
polysperm.	65	vulgaris	ib.
rubr. majus	119	Bryonia alba	30
minus	120	aspera	29
spinach. facie	28	lævis	29
sylvestre spic.	120	nigra	29
variegat. ib.		Bubonium luteum	65
Bonus henricus	28	Buglossum angustifolium	
Branca ursina	108	majus	67
		L. 3	Bu-

INDEX

Buglossum arvense ann.	Calaminth. humilior.	17
89	montan.	122
sylvestre minus 67	puleg. odor.	121
vulgare ibid.	vulgar.	ib.
Bugula alba 31	Calceolus mar.	82
cinerea ib.	Caltha palustris	14
cœrul. ib.	Campanula angustifol.	
sylvestris villosa 31	cœrul.	145
Bulbocastan. maj.	arvens. min.	67
120	esculent.	53
Bupleurum latifol.	hortens.	68
121	minor rotun-	
rotundifol. ib.	difol.	ibid.
vulgariss. ib.	nemoros. an-	
Buphthalmum tanac. mi-	gustifol. flore magn.	ib.
nor. fol. ibid.	parvo ibid.	
Bursa pastor capsul cord.	persicafol. ib.	
4	pratens. flore	
maj. fol. sin. 4	conglomer.	122
non sin. 5	pyramidal.	145
media 5	repens	68
minima 2	urticæ fol.	122
minor 5	vulgar.	ib.
filiquos. 23	Cannabina aquatic. folio	
Butomus 85	divis.	122
Buxus arborese.	folio non divis. ib.	
5	Cannabis femin.	151
foliis pict.	mas	ibid.
vulgariss. ib.	Caprifol. german.	48
C.	Cardamine flore maj.	43
Cacalia fol. glabr.	Car-	
67		
hirsut. ib.		
Calaminth. arvens.		121

ALPHABETCVS:

Cardamine flore plen.	Caryophyllus arvens. gla-
ibid.	ber flore minore ibid.
pratens. ib.	umbellatus 13
Cardiaca 140	holosteus ibid.
Carduus avenar.	montan. alb. 68
121	muralis 125
benedict.	plumarius 150
126	pratensis laci-
caule crisp.	124
fulion.	128
lanceat. alb.	122
purpur. ib.	
marian.	123
nutans ibid.	
palustris ibid.	
pratens. ibid.	
latifol. ibid.	
spinoliss. ibid.	
stellatus 124	
tomentos. ibid.	
vinear.	122
Carlina acaulos flor. ma-	
gno ibid.	
minor ibid.	
caulescens ibid.	
sylvestr.	127
Carpinus 158	
Carthamus officin.	124
Carvi 127	
Caryophyllata aquat.	14
vulgar. ib.	
Caryophyllus arvens. gla-	
ber flore majore 14	
	L 4
	Carya

INDEX

<i>Cepa vulgar.</i> alb.	69	<i>Chamaener.</i> latifol.	138
oblonga	70	villosum flo-	
rotunda	69	re magn.	139
rubra	ibid.	parv.	ib.
<i>Cerasus major</i>	15	<i>Chamaerpyth.</i> vulgar.	71
pumila	ib.	<i>Chamaeschænos</i>	84
sylvestris	ib.	<i>Chamaespartium</i>	78
<i>Ceræfolium fativ.</i>	31	<i>Chelidon.</i> maj.	31
<i>Cervaria nigra</i>	127	minus	5
<i>Chærophyll.</i> sylvestr.	ci-	<i>Chenopod.</i> angustif.	117
cutæ folio	43	betæfol.	119
genicular.	94	foetid.	118
<i>Chamaebalanus</i>	39	fol. sinuat. can-	
<i>Chamaecerasus</i>	15	dicant.	115
dumetor.	30	laciniat. purp. ib.	
<i>Chamaedrys frutescens</i>	15	virefc. ib.	
maj. repens	70	latifol.	ib.
minor repens	ib.	pes anserin. ib.	
palustris	ib.	triangul. fol.	28
spuria major	15	<i>Chondrilla</i> fontifolia	
minor	30	major	85
<i>Chamaelæon vulgar.</i>	124	minor	86
<i>Chamaemel foetid.</i>	70	<i>Chrysanthem.</i> seget.	119
inodor.	ib.	<i>Christophoriana.</i>	2
luteum	ib.	<i>Chrysosplenium</i>	9
miniât.	ib.	<i>Cicla</i>	66
vulgare	50	<i>Cichorium angustifol.</i>	71
<i>Chamaener.</i> glabr. latifol.		crispum	ibid.
maj.	139	latifol.	ibid.
min.	ibid.	montan.	82
		<i>Cicho-</i>	

ALPHABETICVS.

<i>Cichorium pumilum.</i> ib.		<i>Cnicus fativus</i>	124
fativum	71	sylvestr. hirsut.	126
sylvestre	ibid.	spinofior	
<i>Cicuta aquatica</i>	155	luteus	127
major vulgar.	125	<i>Colchicum commune</i>	155
minor	ibid.	<i>Consolida major</i>	56
<i>Cicutaria foetid.</i>	71	media	Gene-
palustr. latifol.		venfis cœrul.	31
alb.	72	rubra	ibid.
rubr.	ib.	pratensis	ibid.
tenuifol.	ib.	alba	regalis 72
<i>Circæa luterian.</i>	126	<i>Convolvul. hæderul.</i> fol.	
minima	ib.		127
<i>Cirsium acaulos</i>	124	maj. alb.	73
arvense fontif-		min. arvens.	ibid.
fol.	122		
montan.	31	<i>Conyza aquatic.</i> serrat.	72
pratens. aspho-		cœrul. acris	ibid.
del. rad.	123	incano fol.	ibid.
polyceph.	ib.	linar. fol.	88
singul. cap.	ib.	major globos.	151
<i>Clematis daphnoid.</i>	15	vulgar.	158
repens	126	media	151
<i>Clematitis latifol.</i>	126	thyrsoides	117
folio		<i>Coriandr. maj.</i>	73
integro	ibid.	<i>Cornu cervin.</i>	ibid.
<i>Clinopodium ocymi fa-</i>		<i>Cornus hortens.</i> mas	3
cic	ibid.	sylvestr. mas	ibid.
		famin.	32
cic	origani fa-		Core-
	ibid.		

INDEX

Corona folis parvo flore	156	Cupressus mas	6
Coronilla	106	Cuscuta major	127
Coronopus repens	141	minor	ibid.
fativus	73	Cyanus seget.	32
Corylus fativ. fructu alb.		Cydonia fructu oblong.	
		rotund. ib.	
		vulgaris	ibid.
oblong.		Cymbalaria	73
go albicante	ibid.	Cynoglossum majus	32
rubente	ibid.	Cyperoides angustifol.	132
rotundo		latifol.	36
maximo	3	spica rufa ib.	
vulgaris	4	tereti	80
sylvestris ib.		lilifolium	37
Cotonea sylvestris	32	nemorens.	16
Cotula foetida	70	nigr. lut. maj.	15
inodora	ibid.	minus ib.	
Cracca major	60	panicula	sparsa
minor	ibid.	major	80
Crataegus	42	minor	ibid.
Crista galli	47	palustre	aculeat.
Cruciata alpina	102		152
hirsuta	158	spica di-	
palustris	77	vifa	80
Cucubalus	114	polystachion	ib.
Cuculi flos	40	D.	
Cucumis fativ.	32	Damafonium	74
Cucurbita vulgar.	99	Daucus alsatic.	127
Cuminum	127	annuus	125
Cupressus samina	5	montan. apii fol.	127
		Dau-	

ALPHABETICVS.

Daucus montan. multi-		Echium scorpioid. arvens.	
fid. fol.	74		74
officinar.	98	palustre	ibid.
fativus	ibid.	majus	ibid.
vulgaris	ibid.	minus	75
Delphinium seget.	72	Elatine	153
Dens leonis fol. angust.	33	Elychrisum	angustifol.
latior	16		109
minim.	33	latifol.	ibid.
minor	ibid.	montan. alb.	36
pilosella dict.	48	purpur.	ib.
villosus	ibid.	spicat.	131
min. villosus	143	Endivia angustifol.	71
Dentaria heptaphyll.	33	crispa	ibid.
Dictamnus albus	128	latifol.	ibid.
Digitalis lutea major ib.		fativa	ibid.
minima	81	Equisetum aquat. maj.	75
purpurea	128	arvense	6
Dipsacus laciniat. fol. ib.		basileense min.	75
fativus	ibid.	foetidum	129
sylvestr. major ib.		juncum ramos.	75
minor ib.		non ra-	
Doronicum plantag. fol.		mos.	33
	73	nudum ramos.	76
Dracunculus hortens.	128	non ra-	
palustris	129	mos.	33
pratensis	74	palustre brev. set.	
Drymopogon	66		75
E.		longior. set. ib.	
Ebulus	55	longiss. set. ib.	
		Equi-	

INDEX

Equisetum palustre ma- jus	75	Fagopyr. vulg. erect.	130
minus	ibid.	scand.	127
polysperm. ib.		Fagus	34
sylvatic.	33	sepium	158
Erica	75	Ferrum equin.	34
Eruca palustr. latifol.	33	Festuca avenac.	79
minor	34	gramin.	ib.
Eryngium arvens.	129	Filago major	131
vulgare	76	minor	ibid.
Erysimum vulgare	129	palustris	132
Elula arvens. latifol.	147	vulgar.	ibid.
exigua	ibid.	Filicula fontan. maj.	76
officinar.	22	min.	ib.
palustris	110	petra	77
rotundifol.	ibid.	saxatil.	76
scabiosa	23	Filipendula aquat.	96
folisecta	110	vulgar.	34
Euonymus vulgar.	34	Filix femina	76
Eupatorium castabin.	129	florida	130
odorat.	62	min.	76
Euphrasia lutea	121	palustr.	130
rubra	ib.	minor	77
vulgar.	ib.	querna	ibid.
F.		ramosa maj.	76
Faba crassa	155	min.	77
major	76	non ramos. dent.	76
nigra	130	min.	77
rotunda alb.	ibid.	rhætica	130
		saxatilis	77
		Flammula repens	126
		Flos	

ALPHABETICVS.

Flos trinitat.	160	Genista spartium min. ib.	
Foenicul. aquat. galeric.	93	spinosa maj. ib.	
umbellat. ib.		minor. ib.	
Foenum græcum	76	tinctoria	78
Fragaria steril.	16	vulgaris	35
vulgaris	34	Gentiana Alpina	151
Frangula	25	autumnal.	131
Fraxinella	128	cærol. oris pilos.	156
Fraxinus	158	cruciata	131
Fruent. Indic.	130	Palustris	ibid.
Fumaria bulbos. cava	6	Geranium batrachioide.	78
non cava ib.		cicutæ fol. alb. ib.	
officinar.	130	purpu- reum	ibid.
G.		columbin.	ib.
Galeopsis aculeata	130	malvaceum	35
foetida	136	robertian.	ib.
iners	17	Gladiolus minor	ib.
lutea	ibid.	Globular. vulgar.	28
palustris	108	Glycyrrhiza sylvestr.	65
patula seget.	154	Gnaphalium majus angu- folium	131
Callium alb. latifol.	77	vulgar. ib.	
minus	ibid.	medium	ib.
luteum	ib.	minus repens	ib.
montan.	78	montan. alb.	36
palustre	77	longifol. ib.	
sylvatic.	ib.	rubr.	ib.
Genista angulosa	35	Gna-	
sagittalis	78		
scoparia	35		
spartium maj.	ib.		

INDEX

Gnaphalium supin.	131	Gramen spica parv.	ibid.
Gramen Alopecurin.	152	sylv.	ibid.
aquatic.	fluitans	dactylon angustifol.	152
genicul.	79	latif.	ib.
lat. spicat.	75	repens	ib.
junceum	79	echinat.	151
latifol.	75	hirsut. angustif.	80
panicul.	132	Ischazmum	152
spicatum	ib.	Junceum articul.	80
avenac. mont.	79	spicat.	ib.
cristatum	ib.	sylvat.	ib.
bufonin.	151	loliaceum	79
caninum	79	miliaceum	132
maj.	ib.	montan. caryoph.	16
cyperoid. hirsut.	16	nemorosum	132
latifol.		nodos. avenac.	80
spica rufa	36	palustre aculeat	152
lilifol.	37	echinat.	ib.
min.	80	paniculat. aquatic.	
renf.	16	latifol.	178
spica pen-		fluitans	79
dul.	36	majus	81
palustre maj.	36	mediu	81
minus	80	min.	ib.
polystach.	80	panicum spica	
spicis te-		multiplici	151
serib. erect.	80	simplici	ibid.
		Gramen	

ALPHABETICVS.

Gramen Parnass.	132	Hedera terrestr. min.	ib.
prat. tomentos	37	Hederula aquatic.	88
spicat. spica long.		Hedypnois	33
ibid.		Hedysar. min.	34
longiss. ib.		Helenium vulgare	81
moll. ibid.		Helleboraster maximus	3
tenuiss. ib.		Helleborine latifol.	81
sylvatic.	150	montan. angustifol.	82
pilosum	6	latifol. ib.	
tremul. maj.	81	palustr. angustifol.	
min. ib.		ibid.	
typhoid. asper	153	rotund. flore	ib.
maxim. ib.		Helleborus hippocrac.	7
molle ibid.		Helianthem Indic. rub-	
spic. rub. ib.		ros.	156
vulgatissim.	81	vulgare	38
Gratiola centaur.	ibid.	Hepatica alba	10
min.	83	caerulea	ibid.
Grossular. hortens.	non	purpur.	ibid.
spinosa fruct. maj. alb.		Herba paris	9
37		Herniaria glabra.	100
rubr. ib.		hirsuta	ibid.
nigro ibid.		Hesperis leucojifol.	18
hortens. spinos.	16	petra	132
vulgatiss.	ibid.	sepiaria	17
H.		Hieracium asper.	82
Hedera arborea	37	chondrill. fol.	133
helix	ibid.	coronopi fol.	ib.
palustris	88	dentis leon. fol.	82
terrestr. maj.	16	Hiera	

INDEX

Hieracium hirsut. fruti-	Hyperic. minus erect. ib.
cos. angustifol. 133	repens ib.
latifol. ibid.	supin. glabr. ib.
Intybac. 82	vulgare ibid.
maj. erect. ib.	Hypochoeris 134
minus dent. leon.	Hyssopifolia 83
fol. oblong. 133	Hyssopus vulgaris 84
sub asper. ibid.	I.
montan. angust. 134	Jacea nigra angustifol. 135
latifol. ib.	latifol. ibid.
majus ib.	squamos. ib.
minus ib.	vulgar. ib.
muror. laciniat. ib.	tricolor. 160
pilos. ib.	Jacobza palustris 72
non pilos. ib.	suaveolens ib.
Hippocastan. 30	vulgaris altiss. 84
Hippuris arvens. maj. 6	vulgaris ib.
Hirundinaria 27	Ilex aculeata 38
Holosteum petraeum 76	Imperatoria major 84
Hordeum 134	pratens. 115
Hormin. pratens. alb. 38	fativ. ib.
cœrul. ib.	Intybus 71
rubr. ib.	Iris palustr. latifol. 38
Hyacinthus stellar. 7	pratens. angustifol.
Hydropiper 142	ibid.
Hyoscyam. vulgar. 83	ibid.
Hyoseris angustifol. 133	ibatis fativ. ibid.
Hyperic. ascyr. dict. 83	sylvestr. 39
bifol. glabr. ibid.	Juncago palustr. 84
latifol. ibid.	Juncellus inutil. 84
	minim. ib.
	Juncus

ALPHABETCVS.

Juncus acut. panicul.	Lactuca fol. oblong. ib.
sparsa 135	maculos. ib.
angustifol. villos. 80	Italica 86
aquat. maxim. 39	montan. maj. 85
capitul. equis ma-	min. ib.
jor. 84	ranar. 100
minor. 85	sativa 86
floridas ibid.	capitat. ib.
lavis panic. spars. 84	sessilis ibid.
ibid.	sylvestr. 135
spars. ibid.	costa spi-
medius ibid.	ibid.
nemoros fol. arti-	noxa ibid.
culato 8	Lagopus 111
lati-	maxim. 112
fol. 6	Lamium alb. lin. not. 17
Juncus palustris 151	vulgare 18
sylvatic. 85	foliis caulem am-
vulgaris ibid.	bient. 17
Juniperus arborese. ibid.	luteum ibid.
vulgar. ibid.	montan. 39
K.	rubr. longifol. 17
Keiri officin. 18	sylvatic. 136
L.	Lampisana Dodon. 87
Labrum veneris 128	Lappa major 119
Lactuca agnina 23	Lapathum acut. crisp. 87
crispa 86	minim. 136
sabaudic. ib.	planum 87
fol. endiv. ibid.	aquat. max. 136
	min. ib.
	hortense. 87
	M Lapa.

INDEX

Lapathum officinar.	87	Leucoj. sylvestre angustifol.	18
sanguineum	ib.	fol.	18
sterile	ibid.	Levisticum	137
Laferpitium	136	Libanotis latifol.	136
Lathyris maj.	ibid.	Ligustrum	137
Lathyrus arvens. latifol.		Lilac	56
luteus	39	Lilium convall. alb.	40
tuberos. ib.		min. ibid.	
sylvestr.	ibid.	montan. alb.	88
Laureola	7	rubr. ib.	
Lavandula angustifol.	137	Limodorum austriac.	44
latifol.	ibid.	Limofella	156
Lens major	ibid.	Linagrostis	37
repens	111	Linaria adulterina	40
vulgar.	137	annua hirsut.	159
Lentibularia	93	minim.	88
Lenticula palustris bifolia	153	arvens. coerul.	137
palustris maj. ibid.		capitul. folios.	88
quadrifol. ib.		hederul. fol.	73
trifolca ibid.		montan.	40
vulgaris	ibid.	pumila	88
Lepidium	137	seget.	153
Leucanthemum vulgar.	3	vulgar.	89
Leucoj. bulbos. vulgare		Lingua cervina	137
ibid.		Linum sativ.	89
trifol.		sylvestr. angustifol.	ibid.
majus	40	Lithosperm. arvens.	ib.
minus	4	linar. fol.	138
luteum vulgar.	18	maj. erect.	89
		Lotus	

ALPHABETICVS.

Lotus hortens. odora	92	Lysimachia humifus. fol.	
pentaphyll.	40	lio acuminar.	26
pratens. siliquos.	58	lut. cornicul.	138
Lunaria minor	89	major ibid.	
Lupinus sylvestr.	ibid.	spicat purpur	139
Lupulus fæmina	154	siliquos. glabra.	ibid.
mas	153	major	ibid.
Luteola	90	minor	ibid.
Lychnis annua minim.	125	hirsuta major	ibid.
aquat. purp.	41	ibid.	
montan. viscos.	40	minor	ibid.
noctiflora	99	M.	
pratens.	40	Majorana tenuifol.	154
seget. maj.	90	vulgaris	ib.
rubra	ibid.	Mala cotonea major.	32
sylvestr. alb. hirs.		minor.	ib.
ibid.		Malus sylvestr.	41
angusti-		Malva altissima	91
fol.		rotundif. ib.	
ibid.		palustris	139
becc. dict.	138	sylvestr. maj.	90
latifol.	90	min.	91
purpur.	104	vulgar. maj.	90
viscosa rubr.		min.	ib.
41		Martagon sylvatic.	88
Lycopodium	18	Marrubium alb.	133
Lycopus	139	cardiac. dict.	140
Lysimachia chamæ-		nigrum	ibid.
uer.	138	palustre	139
coerulea	ibid.	Matricaria vulgar.	41
spicat.	148	M 2	Matri-

INDEX

Matrisylva	27	Mespilus sylvestr.	non
Mays.	130	spinof.	ibid.
Medica echinat.	111	Meum vulgare	p. ult.
Melampyr. cœrul.	91	Millefol. aquatic.	93
flore var.	ibid.	cornut.	ibid.
lut. angustifol.	92	flosculos	ibid.
latifol.	ibid.	lenticulat.	ibid.
purpur.	91	pennat.	ibid.
Melanium montan.	112	palustre	ib.
Melilotus alb.	92	vulgare alb.	42
cœrul.	ibid.	purpur. ib.	
vulgar.	ibid.	Milium alb.	154
Melissa humil. latifol.	39	luteum	ibid.
Melo reticulat.	92	folis	89
rotund.	ibid.	Mollugo mont. latif.	77
saccharin	ibid.	Morus fruct. alb.	18
vulgar.	ibid.	nigr.	ib.
Mentha aquatic. maj.	140	Morus ranz	95
palustr. longif. ib.		Moschatellin.	9
rotundif. ib.		Muscus capillac. maj.	61
sylvestr. longif.	92	palustr.	88
rotundif. ib.		squamos.	18
Menthastr. fol. rugos	92	terrestr.	clavat.
spicat.	93		140
Menyanthes	38	Myagrurn foetid.	94
Mercurial. fœmin.	41	monosperm.	ibid.
mas p. ult.		fativ.	ibid.
montan. fœmin.	18	filiq. long.	141
mas ib.		sylvestre	42
Mespilus sylvestr.	42	Myosotis arvens. hirs.	13
spinof. ib.		Myr-	

ALPHABETICVS.

Myrrhis ann. nodos.	94	Nymphaea alb. min.	94
palustr. latifol.		major alb. ib.	
semen. nigr.	42	lutea ib.	
sylvestr.	94	O.	
Myrtillus	60	Ocimum	41
N.		Ocimoides alb.	ibid.
Napellus	150	purpur.	ib.
Napus sativa	19	Oenanthe aquatic.	96
sylvestr.	ibid.	Olsnitium	116
Narcisso leucoj. maj.	4	Onagra	138
min. ib.		Onobrychis	141
vulgare	3	Ophioglossum	95
Nasturtium aquat.	43	Ophris bifolia	44
hortens. crisp.	94	Opulus	35
petraeum	19	Orchis abortiv. fusca	43
pratense	25	violac.	44
Nasturt. filiculof. ann.	95	alba bifol.	ibid.
filiquof.	43	bifolia alter.	ib.
pratens. ib.		herbac.	ib.
sylvestr. osyr. fol.	95	latissim.	ib.
tenuifol.	43	cimic. referens.	44
verrucos.	141	dolphin.	46
vulgare	ibid.	fucum refer.	44
Nepeta	121	hircina maj.	ibid.
Nicotiana maj.	141	min.	ib.
Nidus avis	43	latifol. maj.	49
Nigella arvens.	141	militar. maj.	ibid.
Noli me tangere	65	min.	ibid.
Numularia	95	montan. ib.	
Nux juglans	43	minor maculat.	ib.
		Orchis	
		M 3	

INDEX

Orchis minor repens	45.	Orobanchæ cœrul.	44
morio fœmin.	46	ramos.	142
mas	45	dentata	96
musc. refer. lut.		Orobis sylvat. vern.	19
maj.	96	foliis oblong.	97
min.	ibid.	purpur.	19
palmata maxima	46	Oryza	134
montan. ib.		Osmunda	89
palustr.	47	palustr.	130
angusti-		Oxalis romana	61
fol.	ibid.	Oxyacantha	42
latifol.	46	Oxycoccus	61
rubr.	47	Oxys	23
pratens. angustif.	46		P.
latifol. ibid.		Palma Christ. macul.	46
maculat. ib.		non macul. ib.	
non macul. ib.		palustr.	47
spiralis	157	Panicum vulgare	152
suaveolens	45	Papas american.	146
trifol. maj.	44	Papaver errat. capit. long.	
Oreoselin.	127	oblong.	97
Origan. alb.	141	hispid.	ibid.
vulgare	ibid.	majus	ib.
Ornithogal. cœrul.	7	minus	ib.
luteum.	7	Parietaria	97
minus ib.		Paris herba	9
ramos. ib.		Pastinaca sativa latifol.	98
Ornithopodium maj.	142	tenuifol. ib.	
min. ib.		sylvestr. latifol. ib.	
Orobanchæ caryophyll.		Passi-	
olens	97		

ALPHABETICVS.

Pastinaca sylvestr. tenui-	98	Peucedan. vulgare	99
fol.	98	Phalangium ramos.	48
Pedicularis lutea	47	minus ramos.	ib.
palustris	ibid.	Phaseolus vulgar.	99
pratens.	ib.	Phellandrium	72
purpur.	ib.	Phyllitis	137
serotin. lut.	ib.	Pilosella major repens an-	
purpur. ib.		gustifol.	143
Pentaphylloid. alat. ibid.		hirsut.	48
palustre	101	officinæ.	ibid.
Pentaphyllum viride	155	Pimpinella maj. alb.	ib.
Pepo	98	rubr. ib.	
oblongus	ib.	sanguisorb. maj.	154
vulgaris	ibid.	min. ib.	
Peplus	110	saxifrag. maj. alb.	49
Perchepier	19	rubr. ib.	
Perfoliat. arvens.	121	min. ib.	
Periclymen. perfol.	48	Pinus sylvestr.	49
rectum	30	Pistacia sylvestr.	ib.
Persica vulgaris	19	Pisum arvense	ib.
Petficaria angustifol.	142	hortens.	ibid.
minor	ib.	vulgar.	ibid.
mitis maculos.	ib.	Plantago angustif. mas	49
non macul. ib.		latifol. glabr.	50
falicis fol.	ib.	incan.	ib.
urens	ib.	aquat. angustif.	143
Pervinca	15	latifol.	ib.
Petalitis	10	Pneumonanthe	137
Petroselin. crisp.	116	Pœonia fœmin.	50
vulgare	ib.	mas	ib.

INDEX

Polium lavendul. fol. 143	Porrum sectiv. 39
montan. repens 154	sylvatic. 63
Polygala vulg. maj. alb. 99	sylvestre 144
caesul. ib.	Potamogeton angustif. ib.
purpur. ib.	crispum 100
alba ibid.	fl. sculos 93
caesul. ibid.	fol. lat. 100
purpur. ibid.	graminifol. 144
vulgar. ibid.	pellucid. fol. 100
Polygonat. latifol. 50	pennat. 93
maj. ib.	ramos. 144
Polygonum angustifol. 99	rotundifol. 100
brevifol. 143	salicis fol.
latifol. ibid.	undulat. 144
graminifol. 100	Primula ver. pratens. 8
minus glabr. ib.	sylvat. ib.
hirsut. ibid.	Prunus damascen. 50
polycarp. 99	sativ. ibid.
oblong. angustifol. 144	sylvestr. 19
vulgare 143	Pulmonar. gallic. femin. 134
Polypodium vulgare. ibid.	mas ibid.
Populago 14	tenuif. ib.
Populus alba maj. 8	Itolor. 9
min. ib.	maculor. ib.
nigra ibid.	non maculor. 10
tremula ibid.	Pulsatilla flore alb. 20
Portulaca aquatic. 115	rubr. 19
sativ. latifol. 144	fol. crass. ibid.
sylvest. angustif. ib.	Pyrola fol. mucron. 100
	Pyro-

ALPHABETICVS.

Pyrola rotundifol. 100	Ranuncul. nemoros. ro-
Pyrus sativa 51	tundifol. 20
sylvestr. ibid.	palustis 103
fruct. maj. ib.	plantag. fol. 143
Pyxidaria 157	saginat. 103
Q.	angustif. ib.
Quercus mas 51	latifol. ib.
vulgar. ibid.	maxim. ib.
Quinquefol. erect. lut. 101	min. ib.
maj. repens 20	phragmit. alb. 20
minus repens ib.	purpur. ib.
palustr. rubr. 101	pratens. erect. 2
sylvatic. ibid.	cris 21
R.	dulc. 51
Ranuncul. aquat. capillac. 51	minor. 52
circinat. ib.	repens ib.
rotundif. ib.	tuberos. ib.
arvens. echin.	tridentat. vern.
anthemid.	alb. 10
fol. 70	caesul. ib.
chamæmel. 71	purpur. ib.
foeniculac. 7	vernus rotundif. 5
lanceolat. ferrat. 111	Raphanistrum alb. 52
montan. hirsut. 51	luteum 53
nemoros. alb. 20	Raphanus aquat. alter. 52
baccifer. 9	lut. ib.
luteus 21	major oblong. ib.
purpur. ib.	min. oblong. ib.
	niger oblong. 144
	rotund. ib.
	M 5 Rapi-

INDEX

Rapistrum aquat.	52	Rubeola arvens.	repens	ibid.
arvens. alb.	ib.			
lut.	ibid.	montan.	31	
auricul.	94	spontan.	102	
Rapum orbic. maj.	101	Rubia angustifol.	54	
min.	ib.	latifol. lav.	102	
sativ. oblong.	ib.	pratens.	ibid.	
rotund.	102	sylvestr.	103	
sylvestre	21	tinctor.	ibid.	
vulgare	102	Rubus Idæus spinos.	54	
Rapuncul. alopecur.	53	minor	ibid.	
cornicul.	ib.	repens	ibid.	
esculent.	ib.	vulgar.	ibid.	
longifol.	ib.	Ruta canin.	103	
nemoros. magn.		hortens.	54	
flor.	68	murar.	61	
	poir.	pratens.	147. 155	
flor.	ib.	S.		
perficifol.	ib.	Sagitta aquat. maj.	103	
pyramidal.	144	min.	ib.	
spicatus	53	Salicaria hyssopi fol.	84	
Reseda vulgar.	102	Salix alb. vulg.	158	
Rhamnus cathart.	53	aquatic.	ibid.	
Ribes nigrum	37	aurita	ibid.	
officinar.	ib.	caprea	ib.	
Rorella fol. oblong.	145	folio acuto	159	
rotund.	ib.	fragilis	159	
Rosa sylvestr.	53	humilis	158	
Rosmarin. hortens.	102	latifolia repens	159	
	ib.	rotunda	21	
		Salix		

ALPHABETICVS.

Salix lutea	159	Saxifraga verna ann.	22
nigra	159	Scabiosa glabr.	105
viminea	ibid.	globosa	104
vitellina	ibid.	hirsut.	105
vulgatissima	ib.	maj. squamos.	135
Salvia major	103	pratens. hirsut.	54
minor	104	tenuifol.	104
variegat. fol.	103	Scandix	55
Sambuc. aquat. flor. simpl.		Scirpus capit. equis. maj.	
	54		84
	pleno ib.	min.	85
humilis	55	medius	ibid.
montan.	21	omnium minim.	ib.
racemosa	ib.	palustr. altiss.	39
vulgar. fruct. alb.		sylvatic.	85
	104	Sclarea pratens. alb.	38
nigr. ib.		cœrul. ib.	
ibid.		rubr. ib.	
Samolus		Scordium	70
Sanguisorba maj.	154	salvifol.	145
minor	48	Scorodopras.	63
Sanguis dracon.	87	Scorzonera angustif. ibid.	
Sanicula officin.	55	humil. angustif. ib.	
Saponaria maj.	104	latifol.	105
violac.	ib.	laciniat.	ib.
Satureja	55	Scrophularia aquat. ma-	
Satyrium	45	jor	105
Saxifraga alb.	21	minor	106
aurea	9	nodos.	ibid.
graminifol.	154	Secale hybern. maj.	ib.
palustris	115	Seca-	

INDEX

<i>Secale hybern. min.</i>	106	<i>Sisymb. aquat. raphani-</i>	
<i>vernum</i>	ib.	<i>fol.</i>	ibid.
<i>Securidaca dumet.</i>	106	<i>erucafol.</i>	33
<i>Sedum maj. vulg.</i>	146	<i>palustre repens</i>	34
<i>minim.</i>	106	<i>Sium palustre alb.</i>	154
<i>minus lut. acuti-</i>		<i>latifol.</i>	116
<i>fol.</i>	107	<i>oblong.</i>	
<i>teretif. alb.</i>	106	<i>fol.</i>	65
<i>palustre rubr.</i>	107	<i>umbellat. re-</i>	
<i>parv. lut. acr. ib.</i>		<i>pens</i>	157
<i>mont.</i>	ib.	<i>Smilax hortens.</i>	99
<i>tridactylit</i>	22	<i>unifol.</i>	40
<i>Semperviv. minus vermi-</i>		<i>Solan. officin.</i>	146
<i>cul.</i>	106	<i>quadrifol.</i>	9
<i>Senecio vulgar.</i>	55	<i>scandens.</i>	56
<i>Serpill. vulgar. alb.</i>	107	<i>tuberos.</i>	146
<i>maj. purp. ib.</i>		<i>vesicar.</i>	107
<i>min. rep. ibid.</i>		<i>moschum</i>	
<i>Serratula tinctor.</i>	145	<i>olens</i>	ibid.
<i>Seseli pratens.</i>	146	<i>vulgare</i>	146
<i>Siderit. arvens. angustifol.</i>	154	<i>acin. lut. ib.</i>	
<i>latifol.</i>	155	<i>Sonchus asper. lacin. spi-</i>	
<i>vulgar.</i>	55	<i>nos</i>	108
<i>Sigill. Salomon.</i>	50	<i>non lacin. ib.</i>	
<i>Sinapi Eruc. fol.</i>	22	<i>lavis lacin. latif.</i>	146
<i>rapifol.</i>	55	<i>minor</i>	147
<i>fativ.</i>	ib.	<i>mural.</i>	ibid.
<i>Sisymb. annuum</i>	43	<i>sulphur.</i>	ibid.
<i>aquat. lacin.</i>	52	<i>sylvatic.</i>	ibid.
		<i>Sophia Chirurgor.</i>	43
		<i>Sorbus</i>	

ALPHABETICVS.

<i>Sorbus aucupar.</i>	35	<i>Thlaspi arvense</i>	57
<i>sylvestr.</i>	ibid.	<i>fol. maj. vaccaria-</i>	
<i>tormental.</i>	42	<i>fol.</i>	36
<i>Spargan. non ramof.</i>	108	<i>drabzfol.</i>	57
<i>ramof.</i>	ib.	<i>in can. maj.</i>	ib.
<i>minim.</i>	ib.	<i>minus</i>	ib.
<i>Speculum Vener.</i>	67	<i>perfoliat. maj.</i>	22
<i>Spergula</i>	26	<i>min. ibid.</i>	
<i>Sphondyl. vulgare</i>	108	<i>vulgatus</i>	56
<i>Spina Cervin.</i>	33	<i>Thymelæa laurifol.</i>	7
<i>Spinacia sterilis</i>	87	<i>linar. fol.</i>	138
<i>vulgar.</i>	ibid.	<i>Thymus vulgar. latifol.</i>	109
		<i>tenuifol. ib.</i>	
<i>Stachys Fuch.</i>	155	<i>Thyselinum</i>	116
<i>palustris</i>	108	<i>Tilia femina</i>	57
<i>Staphylo dendron</i>	49	<i>mas</i>	ibid.
<i>Stellaria aquatica</i>	pag. ult.	<i>Tithymal. arvens. latifol.</i>	147
<i>Stachas citrina angustifol.</i>	109	<i>charac. amygdal. ib.</i>	
<i>latifol. ib.</i>		<i>angustif.</i>	109
<i>Succisa</i>	105	<i>latifol.</i>	147
<i>Symphyt. maj. vulgar.</i>	56	<i>rubens</i>	109
<i>maculos. latif.</i>	9	<i>cupressinus</i>	110
<i>non maculos.</i>	10	<i>cyparissias</i>	22
<i>Syringua alb.</i>	56	<i>punctat. 23</i>	
<i>purpur.</i>	ibid.	<i>rubens</i>	110
<i>T.</i>		<i>germanic.</i>	109
<i>Tamarix</i>	109	<i>helioscop.</i>	ib.
<i>Tamariscus</i>	ib.	<i>latifol.</i>	ibid.
<i>Tanaetum vulgare</i>	155	<i>minimus</i>	147
<i>Taraxac. officin.</i>	16	<i>myrsinit.</i>	angusti-
<i>Taxus</i>	22	<i>fol.</i>	ibid.
<i>Telephium vulgare</i>	155	<i>latif. ib.</i>	
<i>Testiculus hircin.</i>	44	<i>palustris</i>	110
<i>Teucrium</i>	15	<i>pinifol.</i>	ibid.
<i>officin.</i>	30	<i>rotundifol.</i>	ibid.
<i>Thalictrum maj.</i>	109	<i>platyphyll.</i>	147
<i>flav.</i>	147	<i>solidequus</i>	110
<i>800 striat.</i>	155	<i>sylvatic.</i>	ib.
		<i>Tithy.</i>	

INDEX

<i>Tithymalus verrucos.</i>	147	<i>Turritis vulgar.</i>	23
<i>Tormentilla repens</i>	155	<i>Tussilago maj.</i>	70
<i>sylvestr.</i>	101	<i>vulgar.</i>	ibid.
<i>Tragopogon cœruleum</i>	11	<i>Typha palustr. maj.</i>	38
<i>luteum</i>	105	<i>min.</i>	39
<i>Tragofelin. alb. maj.</i>	48		
<i>min.</i>	49	<i>Vaccaria</i>	90
<i>rubr.</i>	ib.	<i>Valeriana palustris maj.</i>	23
<i>Tribuloides vulgar.</i>	110	<i>min.</i>	ib.
<i>Tribulus aquat.</i>	ibid.	<i>Valerianella arvensis</i>	24
<i>Trichoman. aquat.</i>	62	<i>præcox</i>	23
<i>Trifol. acetos</i>	23	<i>ferratifol.</i>	24
<i>arvense ecchinat.</i>	111	<i>serotina</i>	ib.
<i>humile spic. ib.</i>		<i>Veratrum</i>	132
<i>cornut.</i>	ibid.	<i>Verbascum alb.</i>	148
<i>falcat.</i>	ibid.	<i>fæmin.</i>	ibid.
<i>fibrin.</i>	98	<i>lut. magn.</i>	ib.
<i>hepatic. alb.</i>	70	<i>mas</i>	156
<i>cœrul. ibid.</i>		<i>Verbena</i>	148
<i>purpur. ibid.</i>		<i>Veronica angustif. spic.</i>	148
<i>lupulin. maj.</i>	57	<i>spicata min. ibid.</i>	
<i>min. ibid.</i>		<i>longifol. ib.</i>	
<i>montan. 58</i>		<i>Veronic. aquat. angustif.</i>	112
<i>spicat. ib.</i>		<i>latif.</i>	148
<i>pratens. alb. 58</i>		<i>maj. fol. long.</i>	
<i>inodor. ib.</i>		<i>ibid.</i>	
<i>maculat. ib.</i>		<i>subro-</i>	
<i>purpur. ib.</i>		<i>ibid.</i>	
<i>siliquos. ib.</i>		<i>tund.</i>	
		<i>min.</i>	
<i>Triorchis alba</i>	157	<i>min. fol. oblong.</i>	113
<i>Triticum aristatum</i>	112	<i>chamædryfol.</i>	12
<i>æstivum</i>	ibid.	<i>cymbalar. fol.</i>	ib.
<i>hybernum</i>	ibid.	<i>floscul. caulic. ad-</i>	
<i>trimestre</i>	ibid.	<i>hærent.</i>	13
<i>typhin.</i>	ibid.	<i>pedicul. in-</i>	
<i>Tunica</i>	68	<i>fidet.</i>	12
<i>Turritis</i>	46	<i>hæderul. fol.</i>	ib.
<i>leucocy fol.</i>	141	<i>mas f. officinar.</i>	59
		<i>Veronic.</i>	

ALPHABETICVS.

<i>Veronic. aquat. min. rotun-</i>		<i>Viola mont. cœrul.</i>	113
<i>disfol.</i>	30	<i>lutea</i>	ib.
<i>Veronica pratens. serpillif.</i>	59	<i>tricolor</i>	ibid.
<i>spicata maj.</i>	ib.	<i>tricolor</i>	160
<i>min.</i>	ib.	<i>Virga aurea angustifol. ser-</i>	
<i>rotund. ib.</i>		<i>rat.</i>	114
<i>teuerii fac.</i>	ibid.	<i>min. ferrat. ib.</i>	
<i>verna fol. trifid.</i>	ib.	<i>latif. ferrat. ib.</i>	
<i>Viburnum</i>	59	<i>pastor. maj.</i>	128
<i>Vicia annua maj.</i>	113	<i>min. ib.</i>	
<i>min.</i>	60	<i>vulgar.</i>	141
<i>lutea</i>	113	<i>sanguin.</i>	32
<i>maxima dumet.</i>	60	<i>Vitis alb.</i>	29
<i>multiflora</i>	ib.	<i>Idæa</i>	60
<i>fativa f. vulgar.</i>	113	<i>palustr.</i>	ibid.
<i>segetum</i>	60	<i>rotundifol.</i>	ibid.
<i>sepium</i>	113	<i>Vulneraria rustica</i>	64
<i>sylvestr. spicat.</i>	60	<i>Ulmaria</i>	66
<i>Victorial. longa</i>	62	<i>Ulmus</i>	11
<i>Vinea per vinea</i>	35	<i>Urtica aculeat. alb.</i>	130
<i>Vincetoxicum</i>	28	<i>ib.</i>	
<i>Viola aquatic.</i>	93	<i>purpur.</i>	17
<i>arvenf. bicol.</i>	24	<i>inens</i>	
<i>longifol.</i>	11	<i>urens caule rubr.</i>	149
<i>Viola lunar.</i>	113	<i>maxima</i>	ibid.
<i>maet. alb.</i>	11	<i>minor</i>	ibid.
<i>purpur.</i>	ib.	<i>X.</i>	
<i>sylvestr.</i>	ib.	<i>Xanthium</i>	110
<i>mont. alb.</i>	113	<i>Z.</i>	
		<i>Zea</i>	126

Omissis addend.

Membræ aquatica Polegium Mas dist. T. floribus monoperatis verticill. subpurpur. foliis origani æmul. graveolent. Poleg. in seuchien Osten. [Pulege] lc. 3. Tab. 730. august. præcenn.

Eadem flore albo.

Membræ foliis Anethi T. a. vulgare, flore resaceo umbellato



bellato albo. Bärnburg / Icon. 1. Tab. p. 139. perenn. auf
Diesen hohen Berge. [Meum] Jun.

Mercurialis testiculata mas. T. Bingelkrantz / aller Dre-
ten. Maj. Ic. Tab. I. p. 42.

Ranunculus arvensis echinatus. T. vel arborum flore
luteo. rosaceo, foliis dissectis. Ackerhahnen-Fuß. Ic. 13. & 14.
Tab. p. 110. Mas ann. Jun.

Stellaria aquatica s. Alfine aquis innatans. foliis lon-
gipetiolis. Ic. J. B. 3. 777. In fließenden Wasser. Bächlein.
perenn.

Errata pro lubitu corrigenda.

Lin. 1. pag. 3. leg. Ornithogal. lin. 22. p. 10. leg. crassa
lin. 10. p. 12. leg. pratensis lin. 13. p. 13. leg. glabra lin. 22.
p. 18. leg. squamosa lin. 3. p. 20. leg. coquelourde lin. 13. p. 24.
leg. mucronat. lin. 23. p. 30. leg. chamadryz lin. 26. p. 34. leg.
Icon. lin. 12. p. 44. leg. archis lin. 23. p. 48. leg. Oreille lin.
18. p. 55. leg. Ranuncul. lin. ultim. p. 53. add. Ic. Tab. 10.
pag. 1495. lin. 21. p. 60. in fine add. omnium minima est.
lin. 23. p. 60. deleatur omnium minima est. lin. 23. p. 78.
leg. geranium lin. 7. p. 109. leg. Immoitelle lin. ultim. p.
110. leg. rosaceo albicans. lin. 19. p. 124. leg. acaules lin.
ultim. p. 126. add. Ic. Tab. 1065. lin. 3. p. 127. post. lute.
add. Aserathylas dict.



Stavodruk XVIII 15.

o fresci medicano-
farmakologopisnej

Stuttgart 1727

- 1/1
1781/18

